

痰飲門 (附論)

諸方論痰飲為病有因氣脉閉塞津液不通水飲停留結成痰者有胃氣虛弱不能運行水穀成痰者有因酒後飲水停滯於脾胃成痰者有風寒濕入脾相搏成痰者此證之始所感不同難以類舉且人之脾胃為倉廩以納穀因脾弱不能運行致氣血失於滋養故不周流氣道壅滯中焦不能腐穀遂其停滯或有喜怒哀樂之過情飲食起居之不節濕熱肉蘊風寒外搏皆為痰飲變則為寒為熱為喘為嗽為嘔吐為反胃為腫滿為眩暈為風痼為噎氣為吞酸為嘈雜為痞膈為疼痛為怔忡此皆痰之為病內經有云從脾胃濕土太過為積飲痞膈與飲發於中者數條未有痰之名也自張仲景分飲名有四痰飲懸飲溢飲支飲後人遂增留飲謂一五飲一曰懸飲者飲水流於脇下

咳嗽引痛二曰溢飲者飲水流於四肢當汗不汗身體疼重三曰支飲者飲水逆倚息短氣不得卧其形如腫四曰痰飲者其人素虛腸間漚漚有聲五曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引缺盆咳嗽轉甚龐安常云人身無倒上之痰天下無逆流之水誠哉斯言且如頭風眉稜角疼累以風藥不効投以痰藥收功如患眼赤羞明而痛與之涼藥勿廖用之痰劑獲愈凡此證以脉理推之至朱丹溪各分其因以施吐利燥潤溫散升降消導動達開軟提補之方法而治之最得其當劉張又論痰飲其文詳一也東垣云脾土上應於天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲也是以五痰之分言其濕熱相乘如濕在心經為之熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為之風痰其色青如沫濕在脾經為之濕痰濕久而熱其色黃濕在肺經為之氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為之寒痰其

色黑如唾由此言之歲氣淫邪乘於脾胃津液不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣蒸化而為五痰也且如人之氣道貴乎順也則津液流通決無痰飲之患診其脉偏弦為飲浮而滑亦為痰治法或下或汗或溫或利莫若順氣為先分導次之氣順流通痰飲自下臨病診視在乎詳審

痰飲通治方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏已上各半 旋覆花

青皮

桔梗

枳殼薑製

細辛

人參已上各 甘草一

右作一服用水二鍾生姜五片煎至一鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡

半夏薑製

茯苓已上各 陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草已上各

右作一服用水二鍾生姜三片烏梅一箇煎一鍾食遠服
蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛
方見氣門

人參飲 治痰嗽

方見咳嗽門

俞山人降氣湯 治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽乾不利

并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡去蘆

黃芪

厚朴薑製

五加皮薑製

當歸去蘆

桔梗

羌活

半夏麴

人參去蘆

陳皮已上各 乾薑

附子炮去

官桂已上各 紫蘇子一升

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

除痰丸 治頑痰壅盛

南星三升

半夏二升各 水浸一宿 焙乾 用濃 皂

白附子

五靈脂

僵蠶炒去

白礬枯

細辛已上各 全蝎三升

右為細末用皂角研碎投水煮麩糊和丸如梧桐子大每
服三十丸食後用生薑湯送下

辰砂化痰丸 治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂飛研

白礬已上各

天南星炮 半夏麴 三升

右為細末生薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大用辰砂為衣
每服三十丸食後生薑湯送下

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗炒

半夏姜製

陳皮去白

枳實一升半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

一陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或因食生冷或飲食過度脾胃不和並皆治之

方見脾胃門

四七湯 治七情之氣鬱聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞痛痰涎壅盛上氣喘急

方見氣門

參蘇飲 治痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者

方見傷寒門

導痰湯 治一切痰涎壅盛胃膈留飲痞塞不通

半夏湯泡 天南星泡 枳實去棗炒 赤茯苓去皮

橘紅二斤 甘草一斤

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服

大人參半夏丸 墜化痰涎止咳定喘治諸痰不可盡述

人參去蘆 茯苓去皮 天南星 薄荷葉托上各

白礬生用 乾生薑 寒水石 半夏一斤上各

蛤粉二斤 藿香葉一斤

右為細末麪糊和丸如菡豆大每服五十九食後用生薑湯送下白湯亦可一方加黃連半兩黃柏二兩取効愈妙又治酒病調和臟腑尤宜服之

海藏五飲湯 一留飲心下二澼飲脇下三痰飲胃中四溢飲

膈上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多故有此疾

旋覆花去梗 人參去蘆 陳皮去白 枳實麸炒

茯苓去皮 白朮 厚朴薑製 半夏湯泡

猪苓 澤瀉 前胡 桂心

芍藥 甘草各一斤

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服或因

飲酒多加乾葛砂仁

丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澁不能宣行水穀故為痰

飲結聚胸膈之間嘔吐惡心腹滿不食

丁香

木香不見

陳皮去白

青皮已上各

白木

乾薑炮

茯苓去皮

良薑已上各

半夏

天南星各二刀同半夏浸三日

右為細末用神麴一兩大麥蘖二兩同研取麴煮糊和丸

如梧桐子大每服二十九不拘時用熱水送下此藥常服

溫脾順氣

半夏利膈丸

治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并

治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏湯洗三刀

白附子生用

白茯苓去皮

白礬生用

人參去蘆

白木

滑石

貝母已上各

天南星一刃半生用

右為細末麴糊和丸如梧桐子大每服二十九食後用生

薑湯送下

茯苓半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於

脾胃之間當先實於脾胃

茯苓

白木

半夏

炒麴已上各

大麥蘖半斤

天麻各三

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

菝胡半夏湯

治風證不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑惡心

兀欲吐風來竟皮肉緊手足重難舉君暖處有微汗便減

如見風即復作一名補肝湯

菝胡

蒼木各半

半夏半斤

白茯苓二斤

炒麴

薑本各一斤

升麻半斤

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯 治頭目眩暈惡心煩悶氣短促上喘無力

心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰厥頭痛如

裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

黑錫丹 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭下虛之

證及治婦人血海久冷無子赤白帶下

方見頭痛門

破痰消飲丸 治一切停痰留飲

陳皮 去白

川薑 炮

京三稜 炮

草菓 炮

良薑 炮

蓬朮 炮

青皮 炮

半夏 湯 炮 七

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大陰乾每服五十九

食遠用生薑湯送下

控涎丹

治痰飲停積胸膈或結為塊喘滿不安痛連胸脇走

注不定決不可誤作風痛癱瘓等證治之

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大曬乾每服三十九

臨睡用淡生薑湯或熱水送下以下痰飲為愈

化痰鐵刷丸 治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰

逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之

白附子 炮

南星 炮

半夏 洗

白礬 生 用 已 上

寒水石 煨

乾生薑 半 七 末 碾 碎

輕粉 各 一

右為細末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食

後用淡生薑湯送下此藥墜痰止咳定喘

沉香墜痰丸 治宿飲不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏運嘔

遊惡心胸膈不快

沉香

木香各二

半夏麴

二刀

青皮法拍二

損御麴大者二枚

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十九不拘時用生薑湯送下

快活丸 常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼半炒

官桂 一刀

半夏 湯洗

桔槩各二

右為細末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服二十丸不拘時用生薑湯送下日進一二服

茯苓丸 一名指迷茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有人臂痛

不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人為以此臂痛乃痰證也但治痰而

臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏 二刀

茯苓 一刀

枳殼去穢

風化朴硝 一分

右為細末生薑汁煮麴糊和丸如梧桐子大每服三十九生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者者有如此神効

人之氣脉常欲周流以衛護榮養其身也凡一日一夜呼吸出入計一萬三千五百息血行於身八百一十丈管周不息五十而復大會如環無端焉是以習禪者跌坐究竟觀想空仙者吐納引導暗摩其知道者不為血氣所使反所以運其血氣也其或喜怒哀樂不中節起居飲食失其

常皆令榮衛否齟氣血敗濁為痰為涎為飲諸證生焉結
伏於胸膈則眩運嘈忪忡悸癢閉痞喘嗽氣急停滯於
關節則筋脉牽急肢節疼痛手足躄曳寒熱往來三者同
源而異治痰則伏於包絡隨氣上滯客於肺經因嗽而發
涎則伏於脾源隨氣上溢口角流出唯飲則生胃腑為嘔
為吐宜詳斟酌也

神仙墜痰丸 治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角

無虫蛀者刮去皮弦酥炙
黃色去子淨一兩六分

白礬一斤二
生用

黑牽牛

一斤取頭
末四分

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三十九丸漸加至百
丸空心用溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半
月一月愈久服永無癰瘕之疾

搜飲丸 治證同前

右用木瓜一箇切下頂作罐兒去穢用生白礬半夏麴等
分為細末填在木瓜內却用原頂蓋定用麻縷扎縛於飯
甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如梧桐子大每服三五
十丸不拘時用生薑湯送下

二賢湯 治痰

橘皮

用真洞庭陳者溫水
浸去穢白取紅一斤甘草四分

鹽四分

右用水五椀慢火煮焙乾搗為細末白湯點服

一方用橘紅四兩甘草灸一兩為細末湯點服治痰極有
驗世醫但知用半夏南星枳實茯苓之類何足語此王璆
史均外舅莫強中服之腹痛利下物數塊如鐵彈子臭不
可聞胸滿之疾豁然頓愈

半星丸 治痰

右用半夏南星各四兩生薑半斤共搗作餅以楮葉包縛

却於草中如菴翹法候乾入去皮香附子四兩同為細末以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服四十九食後用生薑湯送下

烏巴丸 治胸膈間久年頑痰為害積成痰氣面目青白色無時浮腫全不進食遍身疼痛夜間上壅不得睡卧寒熱往來手足疼痛不能轉側用南星半夏黑錫靈砂不計服數墜之則不下則之則不出此是痰母堅滯宜服此藥須更利下頑痰如魚凍如未利再服決然洞利可除終身之疾

大烏梅 取肉三刀巴豆五枚去殼皮膜

右用水二椀於瓦石器內將烏梅慢火煮爛候水稍乾入巴豆在內將竹篾撻乾直候如乾糊方位火攤冷研爛就丸如菴豆大每服七丸九九十五丸二十一丸不拘時用生薑湯送下

醉鄉寶膏 寬中化痰止嘔解醉後雅宜隨意服之

陳皮 縮砂 各四 紅豆 六 甘草 四 生薑 一斤 丁香 一糸 檳榔 一刃 白芷 菝仁 半

右為麤末每用少許細嚼嚥下

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏 二刃 皂角 六 三刃 去黑皮酥灸令黃搗為末去滓煎成膏將半夏末以膏和作餅以酒一升接取汁膏為蓋出青衣如造麴法搗羅為細末旋覆花 一刃 木香 檳榔 各二

右為細末酒煮麴糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用生薑湯送下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿氣促胸腹結為癥癖支滿胸脇傍及兩脇搶心疼痛飲食不下及胃吐逆九種心疼積年宿食不消久瘡久痢瘧尸疰忤顛

癩厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之
服尤妙且不傷臟氣

華撥

丁香不見火

縮砂仁

蝎梢

胡椒

木香不見火

烏梅肉

青皮

巴豆去皮膜各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日瀝出同炒青皮焦
去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸
如菘豆大每服五七丸臨睡生姜湯送下

九寶丸

治留飲宿食腹脇脹滿吞酸嘔逆

桂心 三分

木香

肉荳蔻

厚朴去粗皮

丹砂研

麝香半斤上各乳香一另研

檳榔 二刃

半夏一兩半生薑汁搗作餅曝乾

右為細末和勻生薑汁和丸如菘豆大每服七丸食後用

橘皮煎湯送下

溫胃散

治留飲順氣消宿食

生薑

半斤洗切曝乾用鹽二兩同炒令乾

陳橘皮湯浸去

半夏

同搗作餅曝乾

草荳蔻

大者三枚不去皮已上各一兩

丁香 一分

甘草 二

右為細末每服二錢如茶點服覺脾胃寒加附子半兩炮
去皮臍半夏一兩湯泡去滑切片焙

枇杷葉散

治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮去白

草荳蔻各半

枇杷葉拭去毛

半夏湯炮

茯苓去皮

人參

大腹皮

白木

厚朴去粗皮薑汁炙已上各一刃

右以咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不
拘時熱服

檳榔散 治胸中痰壅嘔逆不納飲食四肢乏力腹鳴

檳榔 桂心各三 杏仁一分湯浸去皮尖

半夏湯泡 赤茯苓 陳皮去白 人參已上各

白木二刃

右咬咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不

拘時溫服

御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香半刃 砂仁 葛花 檀香

茯苓 官桂 藿香已上各 陳皮

乾葛 良薑 丁香 甘草各二刃

右咬咀每服四錢水一盞煎至八分去滓不拘時服

驅痰飲子 治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲之證

天南星切作十片 半夏湯浸 青皮去白

陳皮去白各 赤茯苓 草薹仁 甘草半兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑七片紅棗一枚煎至七分

去滓不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再一服或次

日夜醒又一服永無痰飲

八珍丸 治膈痰結實胸膈不利喘嗽嘔逆

丹砂研半 犀角鎊 羚羊角鎊 茯神去木

牛黃研 龍腦研各一分 牛膽南星 鵬砂研各

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸食後嚼

細用人參荊芥湯送下

銀粉丸 治膈痰結實胸膈喘逆

鉛白霜 白礬煨令 水銀 鉛結水銀

粉霜已上各 天南星炮 半夏湯泡 丹砂研各

右各研為細末和勻麪糊和丸如梧桐子大每服三丸食

後用薄荷送下小兒丸如麻子大

鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鵝梨二十枚去皮核用淨布絞取汁 皂角不盤者十挺去黑皮子漿水二升接取濃汁

薄荷研汁半斤 蜜半斤 生地黃半斤研取汁同上五味慢火熬膏和後藥

人參 白茯苓去皮 白蒺藜炒去刺 肉蓯蓉酒浸切

牛膝酒浸 半夏湯泡 木香已上各兩 檳榔煨二兩

防風去叉 青橘皮去白 桔梗炒 羌活

白木 山芋已上各三分 甘草炙半兩

右除前五味熬膏餘藥搗為細末同前膏拌和杵令得所

丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食後用荆芥湯

送下日二服

麝香丹砂丸 治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香另研一分 丹砂另研一兩 龍腦另研一分 麥門冬去心三分

木香 丁香 犀角 甘草炙已上各一分

人參 藿香去梗 天南星牛膽 防風去叉

黃芪已上各半兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼破用

荆芥湯送下

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花 甘草炙各半兩 枳殼去穢炒 石膏細研各二兩

赤茯苓 麥門冬去心 羌胡去苗 人參已上各一兩

犀角屑 防風去叉 黃芩已上各三分

右以咀每服五錢一大盞生薑半分煎至五分 去滓食

後良久溫服

化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石煨研一月 鉛白霜另研 馬牙硝另研 雄黃各一兩已上

白礬 枯研 甘草 炙已上 龍腦 少許

右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用砂糖水調下半錢此藥大涼不可多服

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩

悶涕垂稠粘咳嗽咽噎不利

皂角子仁 炒 天竺黃 另研 半夏 湯浸先七次生薑二兩去皮同搗作餅炙微黃

白礬 明者枯過另研 龍腦 另研 辰砂 水飛研

右將皂角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁煮麩糊和丸

如梧桐子大金箔二十片為衣每服十五丸加至二十五

丸食後用生薑湯送下

法製紅半夏 治風熱止咳嗽清頭目利咽膈消痰降氣

每用半夏一兩以龍腦半錢研極細展在半夏上仍用水

飛珠砂研末於半夏再為衣先鋪長燈草一重約厚一指

通搗半夏在燈草上再以燈草蓋約厚一指以煮豆培之

候乾取出於器內收貯每服一二粒細嚼食後用溫水或

冷水送下

高良薑散 治胸膈痰飲冷氣口中清水自出脇急脹滿不欲

飲食此由胃氣虛冷

高良薑 赤茯苓 半夏 湯泡 橘皮 湯浸

桂心 三分 各 訶梨勒 用皮 厚朴 去粗皮 薑汁

細辛 三分 人參 桔梗 各半 甘草 一分

右以咀每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至五分

去滓不拘時服

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫或有酸

水不思飲食

丁香 茯苓 去皮 木香 二兩上各 乾薑 炮半

附子泡去皮臍 半夏湯泡 內桂去粗皮 陳皮去白已上

縮砂半兩

右咬咀每服四錢水二盞生薑柴片棗一枚煎至七分去

滓不拘時服一方無肉桂

奇效湯 治冷痰壅盛胸膈不利胃寒脾氣弱嘔吐痰涎

木香半兩 附子炮去皮臍 半夏湯泡七次

右咬咀每服三錢水一盞半生薑半分紅棗二枚煎至一

盞去滓空心服

二生湯 治胃冷有痰

附子生去皮臍 半夏生用名

右咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓空心

溫服加水香少許煎无佳一方去半夏用南星名南附湯

省風湯 治痰厥

半夏八兩 防風四兩 甘草二兩

右為細末每服三錢水一大盞生薑二十片煎至七分去

滓不拘時服一方用南星代半夏

水玉湯 治肩痠骨痛不可忍者此痰厥也

半夏不拘多火湯洗七次切作片子

右每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓食後溫

服

奇效良方卷之三十一終

奇効良方卷之三十二

喘門

附論

諸喘為熱夫火熱為陽主乎急數而火動於上喘急乃作若夏
熱甚則息數氣發喘之屬熱無疑矣經云諸逆衝上皆屬相火
者此也蓋肺主氣為陽上氣流行通榮臟腑故肺為五臟之華
蓋喜清盛不欲窒礙若陰氣在下陽氣在上與氣之有餘者則
發咳嘔而喘急也聖濟方云呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣
於下降一升一降陰陽乃和苟有乖和則氣上不行升而不降
否塞膈中氣道奔迫喘息有聲也又風寒暑濕邪氣相干肺脹
滿而喘者或喜怒之氣傷於五氣鬱而生痰作喘者或脾胃俱
虛由體弱不能攝養一身之痰而喘者或脾濕腫滿水氣乘肺
而喘者或本臟虛風和所干於肺葉氣壅遏而上衝者豈可一
槩而論之內經靈樞諸篇所論諸喘而名不同所感各異若言

喘喝与言喘息言喘迫言喘致言喘嘔言上氣者雖名不同而病之皆出於肺內經又云卧則喘者水氣之容經脉篇云夜行則喘出於腎淫氣傷心度水跌仆喘出於腎与骨痺論篇云腸恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎与骨痺論篇云腸痺者中氣喘爭火奇篇云肺之喘而刃脉滿至真大要篇論太陰司天為客勝則首面肘腫呼吸喘氣陽明篇云謂邪入六腑身熱喘呼不得卧也此各藏所感之異乎仲景云髮汗如油汗出如珠不流喘而不休者此為不治其脉滑而手足温者生脉濇四肢厥者死而又婦人喘急為病尤亟因產後所下過多榮氣暴竭衛氣天依独聚於肺故發喘也此名孤陽絕陰為難治上法外感者以祛散之氣之內鬱者以調順為先腎虛者宜以温補痰盛者當以疎導有陰血虛而上喘者宜以滋陰養榮之劑所論前證臨期用藥在手消息治之無不愈矣

喘急通治方

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有声坐卧不安胸膈緊痛及

治肺感寒邪咳嗽声重

人參 去芦

麻黄 去節

阿膠 炒粉

半夏

五味子

罌粟殼 去蒂

甘草 已上各一錢

桑白皮 二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

紫苑 茸

欬冬花 二錢

右作一服用水二鍾烏梅一枚煎至一鍾食後服

蘇子降氣湯 治虛陽上攻喘促咳嗽

方見氣門

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

方見氣門

杏參散 治墜墮散恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁皮炒去尖 人參去芦 橘紅 大腹皮

檳榔 白木 訶子超煨用肉 半夏湯泡

桂心不見火 紫苑洗 桑白皮 甘草炙各錢

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇七葉煎至一鍾去滓不拘時服

四磨湯 治七情鬱結三氣喘急

沉香 檳榔 人參 天台烏藥

右各濃磨水共取七分盞煎三五沸不拘時服

紫蘇子湯 治憂思過度和傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

氣定瀉匕 有聲大小便不利脉虛緊而瀉

紫蘇子 半夏湯泡 木通 大腹皮

木香不見火 陳皮 人參 草薺仁

枳實炒 白木 厚朴姜製 甘草炙已上

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾去滓

不拘時服

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子二升 人參去芦 麥門冬去心 杏仁去尖

橘皮去白已半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾去滓

不拘時服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已及治傷寒頭疼

寒壯熱四肢疼痛

方見咳嗽門

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已甚者寒熱往來

杏仁去皮 半夏 桔梗 陳皮去白

茯苓 去皮 漢防已 各半 薄荷 七分 猪牙皂角 二米

白礬 甘草 各一

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

葶藶散 治過食煎燔或飲食過度致肺壅喘不得卧及肺癰

咽燥不渴唾腥臭

甜葶藶 炒 桔梗 去芦 瓜蒌仁 川升麻

薏苡仁 桑白皮 炙 葶根 已上各 甘草 各一

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

華蓋散 治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡卧或

聲音不出者

方見咳嗽門

葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽睡卧不寧不思飲食

方見咳嗽門

肺湯 治上氣喘嗽

紫苑 橘紅 去白 杏仁 去皮 五味子

枳殼 炙 半夏 姜製 桑白皮 炒 紫蘇子 炒

甘草 炙 已上各

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇五葉煎至一鍾食後

服

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫

杏仁 去皮尖 炒 紫蘇葉 二升 五味子

大腹皮 烏梅 去核 紫苑 甘草 炙 已上

陳皮 去白 麻黃 去節 桑皮 炒 阿膠 炒

桔梗 已上各 七分半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

五華散 治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安神氣

甜葶藶

焙

桑白皮

半夏

貝母

天門冬

去心

馬兜零

杏仁

紫苑

合蒸

人參

百部

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後

服

人參理肺散 治喘不止

人參

杏仁

栗殼

麻黃

木香

當歸

右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

麻黃散 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅盛涕唾稠粘手足冷

碎者

麻黃

去節

款冬花

三升

肉桂

四分

杏仁

去皮尖炒

訶子肉

二升

甘草

一升

右作二貼每貼用水二盞好茶一錢食前煎服

九寶湯

治經年喘嗽通用

麻黃

去節

陳皮

肉桂

桑皮

炒

杏仁

去皮

大腹皮

薄荷

甘草

炙各一分

右作二貼每貼用水二盞生薑五片烏梅一箇食遠煎服

神秘湯 治上氣喘急不得卧者

陳皮

桔梗

紫蘇

五味子

人參

右作二貼每貼用水二鍾煎至一鍾食遠服卧則喘者水

氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味有桑白皮木香茯苓

生薑煎服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

栗殼蜜炒

人參

陳皮已上各

甘草各半

右為細末每服一二錢食後烏梅湯調服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四肢浮

腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即効

大戟

芫花醋炒

甘遂

苦葶藶各三升

巴豆去油

牽牛頭末炒

右為細末滴水和丸如粟米大每服三九茶清下湯亦可

千縵湯 治痰喘

半夏七片泡七次每

皂角去皮去子

甘草節一寸

右作一服用水二盞生薑如指大一塊煎至半盞去滓頓

服數貼瘥

陳皮湯 治痰喘

陳皮湯浸去明礬二兩半鮑內飛

甘草二升

大半夏五刀湯煮每箇切四片用明礬湯

右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

清氣散 專治喘急

栗殼去殼

五味子

桑白皮

紫蘇

青皮

欵冬花

枳殼麩炒

陳皮各等

甘草減半

右用慢火炒焦色急傾水中煎服加半夏生薑煎尤妙

五味子湯 治肺癰

五味子

紫蘇

麻黃

細辛

赤茯苓

紫苑

黃芩

陳皮

桑白皮

官桂

葶藶

半夏

甘草各等

右咬咀每服五錢水二盞生薑半分煎至一盞食後服
消膿飲 治肺癰有膿腥氣上衝嘔而咳嗽

南星 半夏 知母 生地黄

川芎 防風 貝母 桑白皮

阿膠 射干 桔梗 天門冬

薄荷 杏仁去尖 紫蘇 白芷

烏梅 白芨各等分 甘草減半

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎一盞食後服

五味子散 治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀即中姊忽發喘

嗽服諸藥皆不効得此三服遂愈

五味子 官桂去粗皮 茯苓已上各 陳皮去白

乾姜炮 甘草炙各半

右咬咀每服五錢水一大盞煎至六分食遠熱服

神秘方 治喘

右以猪爪甲二枚燒灰研細入麝香當門子一枚同研細

用臘茶清調下

皴肺丸 治喘

欵冬花 知母 秦艽 百部去心

紫苑茸 貝母 阿膠 糯米炒已上

杏仁去尖別

右為末將羊肺一介先以水灌洗看容得水多少即以許

水更添些煖杏仁令沸瀝過灌入肺中繫定以糯米泔煮

熟研細成膏搜和前藥末杵數千下如梧桐子大每服

五十丸食前用桑白皮煎湯送下

定喘化痰方

右用猪蹄甲四十元介淨洗控乾每个指甲內半夏白礬

各一字入罐子內封閉勿令烟出火煨赤去火細研入麝香一丸人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒服半丸

平氣散 治盛則為喘已未歲初秋三日奉召至六盤山至八

月中霖雨時承

上命治不憐吉吳元帥夫人年踰五十身體肥盛因過飲酒及
澶乳腹脹喘滿声文舍外不得安卧大小便澁滯氣口脉
大为倍於人迎関脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之
熱濕熱太盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則实
上則宜下之故制平氣散以下

白牽牛 半生半炒熟 取頭末一刀 大黃 七各 陳皮 半去白

青皮 去白 檳榔 三各

内經云肺苦氣上逆急食苦以泄之故曰牽牛苦寒瀉氣
分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦温体輕浮理其肺氣

青皮苦辛散肺中滯氣為臣檳榔辛温性沉重下痰降氣
大黃苦寒瀉滯滿实故以為使右于細末每服三各煎生
薑湯一大盞調下无時一服減半再服喘愈止有胸膈不
利煩熱口乾時上咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

青皮 去白 二兩 桑白皮 一兩 知母 地骨皮

陳皮 桔梗 半兩 甘草 各 炙

右剉如麻豆大每服半刀水二盞煎至一盞去滓食後温
服數服良愈

華陀云盛為喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡
看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣
有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作
不足脉氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以其火入

於肺衰与不足而為喘也故言盛非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火實補肺氣用者不可不知也

淵降湯 治喘嗽

枳殼 一刃 半夏 製 桔梗 青皮

陳皮 紫蘇子 檳榔 茯苓

葶藶 上各半刃 縮砂仁 白薑 薤仁

紫蘇葉 已上各二分半 甘草 分三

右剉散每服三升生薑五片水一盞煎至七分不拘時服

八仙丸 治喘嗽神効

天南星 一刃 半夏 洗 款冬花 小皂角 炙黃去

白礬 粘 甘草 已上各半刃 巴豆 七個 杏仁 三十個 去皮尖

棗 豆 三箇 去核 煨果 已

右為細末醋煮糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用溫薑茶汁送下或細嚼蘿蔔子生薑湯下

沉香散 定喘止咳

沉香 阿膠 人參 紫蘇

陳皮 已上各半刃 桑白皮 煉一刃 微火 甘草 炙

右為細末每服三升水一大盞生薑三片煎至七分去滓

通口服元方只以棗湯調下

白雲換肺丸 治遠年近日喘嗽不止

款冬花 一刃 寒水石 半夏 明礬 各

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三四十丸不拘時用生薑湯送下

治遠年近日喘嗽方

右用皂角不姓者三大莖刮去黑皮刀切開去子每子倉
內入巴豆肉一粒合就以麻皮縛定用生薑自然汁和蜜
塗令周匝慢火炙之又塗又多以焦黃為度擘開去巴豆
不用又以好明礬一两枯過葦麻子七粒生姜汁和蜜再
塗炙前皂角三味同為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏
却与前藥和勻每服一水用栝子乾炙過候冷點入藥內
細嚼臨睡服忌熱毒魚鮓鮓油麪酒米醋煎燂熱物

定喘丹

治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧齶

豁久嗽亦宜服之累年不瘥漸致面目浮腫者神効

杏仁

去皮尖別研馬兜零

蟬蛻

洗去土并足翅

砒二字服

右為細末蒸棗肉為丸如蔡子大每服六七丸臨睡用葱
茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

人參方

治咳嗽上氣喘急嗽血吐血者宜服

右用揀參搗為末每服三次用鷄子清調之五更初服使
睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麪等并
勿過醉飽將息

百花膏

治喘嗽不已痰中有血

百合

蒸焙

欬冬花各等分

右為細末煉蜜和丸如龍眼大每服一丸食後細嚼生薑
湯送下噲化尤佳

七七散

治喘嗽

右用長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十
粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用生薑汁製杏仁
麻油製巴豆蜜製半夏各製三樣皂莢畢
又將皂莢火炙黃色碾為細末每服一字安在手掌中臨

睡用生薑汁調舌舐喫神効

內金丸 治喘

鷄內金二十个信石半二 黃丹半二

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶末半兩半夏末二分半共研勻用蒸棗肉為丸如麻子大露星二宿以硃砂末為衣每服七丸臨睡用冷茶清送下

紫金丹 治喘

信石半二 淡豉皮一 水潤去

右共研和丸如棗豆大每服七丸或十九丸臨睡用冷茶清送下只一服二服後不可喫一應物湯水之類今以信入分豉一兩每服二十九一法二件成膏搽枕內艾薰入生珠末丸存一親戚婦人患年逾求醫者皆不効忽有一道人貨此藥謾贖一服是夜減半數服頓愈遂多金巧乃

此方予屢用以救人特為神異

鯽魚丸 治肺經久受寒邪喘急初發則寒從背起冷如水霜

漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐卧不得莫可支吾兩脅聳豎曲背弩目困憊欲死宜服或未効再服即愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一空入信石一錢令深入在內却以魚入竹筒內外以青蒿搗泥固濟候乾火煨竹筒通紅候冷去泥取魚去燒不過者研細入蛤粉三錢研和得所丸如棗豆大硃砂為衣每服三五丸臨睡用冷沙糖水送下忌熱物一方正喘急時宜服不可多過丸數欲試此藥用猪肺一枚吹脹入此藥數丸於肺院內頃刻漸瘳方表其功

奇効良方卷之三十二終

奇效良方卷之三十三

消渴門

附論

內經陰陽別論曰二陽結為之消脈要續微論曰痺成爲消中
 調逆論曰心移熱於肺傳爲膈消也凡治消痺偏枯痿厥氣滿
 皆飲食膏粱之病也歧伯曰脈實病久可治脈弦細小病久不
 可治後分爲三消膈消者舌上赤裂大渴引飲脈經云堅數相
 搏則爲消渴脈軟散者當病消渴病機云消渴之疾三焦受病
 也上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在
 上焦也治以流濕潤燥消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱
 能消穀知熱在其中胃也匡下之消腎者初發而爲膏淋謂淋
 下如膏油之狀至病成面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂
 液治法宜養血以分其清濁而自愈也是以劉河間三消之論
 始言天地六氣五味以配養人身六位五藏而究乎萬病之源



八每
 小廣
 既文之

終引內經論渴諸證以辨乎或熱藥之誤此證反復要在詳明
非深探陰陽造化之機者孰能知之詩陳其畧經云有言心肺
氣厥而渴者有言肝脾而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而
渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有言小腸
痺熱而渴者有因病瘵而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉
飽後入房而渴者有遠行勞倦大熱而渴者有因傷胃乾而渴
者有因病風而渴者雖五臟部分所感不同之病皆因燥熱云
液一也三消之疾本濕寒相搏陰氣極衰燥熱陽氣太甚亦皆
飲食服餌失宜腸胃乾涸而氣液不可宣平或耗亂精神過違
其度或因大病陰氣損而液衰虛陽氣悍而燥熱亦甚或因久
嗜鹹物恣食炙博飲酒過度亦有汗少服金石丸散久積金石
之毒熱結於胸中下焦虛熱益甚因而腎水不能制金石熱燥
甚於腎故渴而引秋若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食
多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕肌
消瘦而小便有脂膏者名曰腎消此三消者其燥熱同也治比
疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚
水升火降津液充則無危矣此則三消之渴明矣東垣云大飲
食不節勞役所傷以致脾胃虛弱胃既虛不能滋養氣血所生
病主口中津液不行故口乾咽燥也病人自以為渴醫者治以
五苓散謂止渴燥而反渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則
補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂也甘溫之藥以為
多苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心食苦急食酸以
收之心火旺則肺金受邪金虛以酸補之次以甘溫及其寒之
劑於脾胃中瀉心火之亢盛治其本也所勝妄行者言心火旺
能令母實母者肝木也肝木旺則挾火之勢無所畏懼而妄行
也故脾胃先受之又如胃氣不行內亡津液而乾涸求湯飲以

自致非渴也乃口乾也非熱勝也乃血病也當以辛甘益之淡
 慘五零散之類所當禁也又謂胃虛不能食而大渴不止者不
 可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也用七味白朮散補之
 世見渴甚者不求所因例用淡滲之劑重竭其液故也今推其
 所因合而分之夫渴本乎熱也而熱有內外虛實之分若傳經
 之熱七甚耗液而為渴者氣分而受邪也當與寒涼淡滲之劑
 速清其熱七去而陰生陰生而渴止矣若胃虛亡液陰虧而為
 渴者血受病也當與其溫辛酸之劑滋益其陰七生而燥除燥
 除而渴已矣豈可一禁而治哉且消渴之疾三焦之病火炎其
 心則危邪熱薰蒸漸漬日深氣血凝滯有患癰疽瘡愈渴止則
 生瘡潰渴甚則危叔和云消渴之脉大者活虛小病深厄難脫
 此之謂也古人論三焦者消渴消中消腎是也渴有虛實之分
 皆立其論以啟後人之學當以誠心鑒之

消渴通治方

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩燥

生地黃

熟地黃

天門冬 去心

麥門冬 去心

人參 去芦

黃芪 蜜炙

石斛 去根

枇杷葉 去毛

枳殼 去穢炒

澤瀉

甘草 炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子 治膈消胸滿必煩津液短少多為消渴病

麥門冬 去心

五味子

瓜蒌實

生地黃

人參 去芦

茯苓 去木

乾葛

知母

甘草 炙 已上各 錢二分

右作一服水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時服

烏梅五味子湯 治消渴生津液

烏梅

五味子

百藥煎

巴戟酒

甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

加味錢氏白朮散 治消中消穀善飢

人參去芦 白茯苓去皮 白朮已上各 枳殼去穢

芫胡 藿香 乾葛 此五味子

木香 甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不欲多食

人參去芦 石膏四錢 知母二錢 甘草

黃芩 杏仁各一

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

六神湯 治三消渴疾

枇杷葉 瓜蒌根 黃芩 乾葛

蓮房 甘草各二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服小便不利加茯苓

止渴湯 治霍亂煩渴

方見霍亂門

瓜蒌散 治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱不

能房事多服丹石真氣既盡石氣孤立唇口乾焦精液自

泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十行須當除熱補虛

天花粉 宣黃連 白扁豆 白茯苓去皮

寒水石 甘草節 人參去芦 白朮去芦

石膏 猪苓各等

右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參去芦 破仁 白朮 山梔子

桔梗去芦

瓜蒌

連翹

澤瀉已上各

葛根

黃芩

大黃

白茯苓

甘草生用

薄荷已上各

石膏

寒水石

滑石已上各

右作一服水二鍾入蜜少許煎至一鍾不拘時服

加減八味丸

治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心

煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削

或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩頓止

白茯苓

去皮

牡丹皮

去骨

澤瀉

酒潤蒸

五味子

微炒一

山茱萸

取肉

肉桂

去粗皮

熟地

黃芩

蒸熟

山藥

微炒各

右各研末和勻煉蜜為丸如梧桐子大五更初溫酒鹽

湯任下三五十九午前晚間空腹再服此藥不惟止渴亦

免生癰疽久服求除渴疾氣血加壯

茯神丸

治消中煩熱消穀小便數

茯神去木

人參去芦

枳殼去穢

生地黄

麥門冬去心

牡蠣粉

黃連已上各

蓮肉去心

黃芪去芦

知母已上各

瓜蒌根七

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十

丸食遠用米飲送下

加減腎氣丸

治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢

體消瘦並皆治之

山茱萸

去核

白茯苓

去皮

牡丹皮

去心

熟地黄

酒蒸

五味子

山藥

炒

鹿角

鎊

澤瀉

已上各

官桂

不見

沉香

不見尖

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九米飲鹽湯

任下弱甚者加附子一兩兼常服黃芪六一湯

黃芪六一湯 治諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者宜服之

黃芪去芦蜜炙九甘草炙半

右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉二錢人參去芦當歸去心生薑并焙乾遠志去心生薑并焙乾

白茯苓去皮黃芪蜜炙川芎 此五味子

熟地黃 甘草微炙各

右作一服水二鍾紅棗二枚煎至一鍾食前服

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪蜜炙茯苓去木瓜蒌根 麥門冬去心

生地黃 五味子 甘草炙半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

天花散 治消渴

天花粉 生地黃 麥門冬去心乾葛二錢

五味子 甘草已上各

右作一服水二鍾粳米百粒煎至一鍾食遠服

止渴劉散 治消渴

枇杷葉去毛生薑切片乾葛二錢

淡竹葉 并草生用草菓已上各

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

鹿茸丸 治失志傷腎七虛消渴小便無度

鹿茸去毛酒炙熟地黃洗蒸黃芪去芦蜜炙雞脰脰麩炒

肉蓯蓉酒浸乾山茱萸去核破故紙炒五味子

人參去蘆川牛膝去芦酒浸已白茯苓去皮

地骨皮去骨已上麥門冬去心

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用米湯送下

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三

焦化痰延祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

人參去芦 丹參洗 白茯苓去皮 酸棗仁洗

遠志去心 百部洗 石菖蒲去毛 栝子仁

桔梗去芦 玄參 天門冬去心 五味子

茯神去木 當歸 熟地黄各等分

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸以金箔為衣燈心棗湯化下食後臨臥服或作梧桐子大丸吞服亦可

雙補丸 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠二兩 白茯苓去皮 人參去芦 薏苡仁炒

熟地黄洗蒸 肉蓯蓉酒浸 鹿絲子酒浸 覆盆子

五味子 石斛酒浸 當歸去芦 酒 黃芪去芦

木瓜已酥 沉香不見火 澤瀉各半 麝香一另研

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十九空心用棗湯送下

玉泉丸 治煩渴口乾

麥門冬去心 人參去芦 茯苓去皮 黃芪半生半

烏梅肉焙 甘草已酥 天花粉 乾葛已酥

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一九不拘時細嚼用白湯送下

川黃連丸 治諸渴

川黃連五兩 麥門冬去心 天花粉各半

右為細末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗杵為丸如梧桐子大每服五十九食前用粳米飲送下

天花粉九 治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉 人參去芦等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前用麥

門冬煎湯送下

枸杞子九 治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞子 白茯苓去皮 牛膝酒浸 兔絲子酒浸

麥門冬去心 熟地黄洗 黃芪蜜炙 牡蠣粉已上各

鷄內金炙 桑螵蛸 瓜蒌根各七 山茱萸去核

牡丹皮各半

右為細末煉蜜和搗三五百杵為丸如梧桐子大每服五

十九食前用米飲湯送下

平補九 治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲疹之狀

兔絲子酒浸 山茱萸酒浸 益智仁 當歸半兩

川練子去核 牛膝酒浸 葫蘆巴炒 杜仲去粗皮

肉蓯蓉酒浸 巴戟去心 乳香二兩

右為細末用糯米糊為丸如梧桐子大每服五十九食前

用棗湯或鹽湯送下

菝葜丹 治三消渴通用亦治白濁

白茯苓五兩 兔絲子酒浸 五味子七兩

石蓮肉三兩

右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三百五杵丸如梧

桐子大每服五十九食前用米飲湯送下

和血益氣湯 治消渴消中諸方只止燥渴殊不知足陽明胃

主血所生病手陽明大腸主津所生病此方治口舌乾小

便數舌上赤脈生津液除乾燥長肌肉

生地黃酒浸 黃蘗酒浸 升麻已上各 杏仁去皮尖炒

防已 酒浸 知母 酒浸 羌活 已紅 各 桃仁 去皮尖炒

石無 半斤 黃連 酒浸一分 當歸 酒浸八分 麻黃 六分

紅花 三分 柴胡 六分 甘草 生用五分 炙用六分

右吹咀作二貼每貼用水二鍾煎至七分不拘時溫服

黃連膏 治證同前

黃連 一斤 碾 牛乳汁 白蓮藕汁 生地黃汁 各一

右將汁熬膏搗黃連末為丸如小豆大每服二十九少呷

湯下日進十服

生地黃膏 治證同前

生地黃 一握 冬蜜 一握 人參 半兩 白茯苓 去皮

右先將地黃洗搗爛以新水一大盞調開同蜜煎至一半

次入人參末拌和以磁器密收用匙挑服

三和井露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服

滑石 六分 石膏 四分 知母 人參

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 已紅 各

甘草 一分

右吹咀分作二貼每帖用水二盞煎至一盞食遠溫服

三消丸 治消渴骨蒸

宣黃連 去鬚

右為細末搗冬瓜自然汁和末成餅陰乾再研為末用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服三五十九不拘時用冬瓜煎湯送下或大麥煎湯亦可

疎砂黃連丸 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂 一分 宣黃連 三分 生地黃 二分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九食前用燈心棗湯送下

加減三黃丸 治消渴及治服丹石毒致成此疾

黃芩 春四兩 夏六兩 秋六兩 冬三兩

黃連 春四兩 夏七兩 秋三兩 冬二兩

大黃 春三兩 夏一兩 秋二兩 冬四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心用白湯送下服一月愈

黃連猪肚丸 治消渴強中

黃連 梁米 瓜蒌根 茯神 各四兩

麥門冬 去心 知母 各二兩

右為細末內猪肚中縫兩置甑中蒸極爛取出藥搗猪肚為膏丸或再入蜜杵千餘丸如梧桐子大每服五十九用人參湯送下米飲亦得一方加生地黃乾葛一方去知母梁米用小麥

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦去骨節間

熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食免生瘡瘍

大猪肚 一箇 黃連 三兩 生薑 研 蜜 各二兩

右先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麩等同藥以水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪肚內以線縫定仍入銀石器內水煮爛研如泥搜和下項藥

人參 五味子 山藥 杜仲 去皮切姜 汁炒去絲

石斛 山茱萸 去核 車前子 新蓮肉 去皮

鼈甲 醋炙 熟地黃 當歸 已上各 磁石 煨

白茯苓 梔角子 炒 川芎 已上各 兔絲子 酒浸蒸 研五兩

黃芪 四兩 沉香 半兩 麝香 研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少則添熟蜜搗數千

杵丸如梧桐子大每服五十九食前用温酒或糯米飲送
下一方有白朮二兩陽起石一两

真珠丸 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多以致

煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

鉄胤粉

牡蠣

知母

玄參

苦參

硃砂

黃連

麥門冬

天花粉

金箔

銀箔

右為細末煉蜜入生瓜蒌根汁少許丸如梧桐子大以金

銀箔為衣每服二十九至三十九先用瓜蒌根汁送下一

服次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙燥酒色一方有

蘆薈二炙半白扁豆二兩炒

天花丸 治渴通用

消渴消中消腎病

三焦五臟生虛熱

惟有膀胱冷似水

意中飲水無休歇

小便日夜不記行

骨冷皮焦心肺裂

本因飲酒炙燥多

四肢肌膚轉枯竭

莫交便利白如泔

口苦咽乾舌似血

若如此狀病雖危

遇此神仙真妙訣

天花粉

白茯苓

牡蠣粉

知母

鐵胤粉

苦參

辰砂

白扁豆

黃連

三炙半白扁豆二兩炒

蘆薈

金銀箔

右為細末用生瓜蒌根汁和生蜜丸如梧桐子大每服三

十九用麥門冬湯送下一方無茯苓

梅花聚香湯 又名蘇龍劑子手 治消渴飲水至石斗病極者可

服之即愈

天花粉

烏梅肉

枇杷葉

麥門冬

五味子 瓜蒌实 人参 黄芪

乾葛 已上各 檀香 半及

右為細末水調隨意不時服之

子童桑白皮湯 治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚

瘦削四肢怠惰常服補虛止渴然渴有三消渴屬心內積

煩愁心火炎上與暑熱或飲食相挺而動消中屬脾有陰

勝陽蔚成寒中者有陰不勝陽成熱中者有強陰與盛不

交精泄成強中者消腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹

石以致發動唇乾咽竭精溢自泄不飲而利亦曰內消不

亦危矣

童根桑白皮 去麩皮 人参 麥門冬 去心

白茯苓 乾葛 山藥 桂心 已上各

甘草 半及

右剉碎水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

參芪湯 治消渴

人参 桔梗 天花粉 甘草 已上各

綿黃芪 鹽湯浸炙 白芍藥 各二 白茯苓 北五味子 各半

右剉碎每服四錢水一盞半煎至八分日進四服留滓合

煎一方有乾葛木瓜烏梅

龍鳳丸 治飲酒多發積為酷熱薰蒸五臟津液枯燥血泣小

便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

鹿茸 酒炙 兔絲子 酒浸 山藥 各二

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食前用米

飲送下濃煎人參湯亦可一方用麩糊為丸鹽酒鹽湯任

下一名龍肝鳳髓丸

冬瓜飲 治消渴熱勝心神煩亂及飲水多小便如脂凝片日

大冬瓜 一枚 黃連 半斤

右先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停去淨
瓠子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋搜白麩子裹
冬瓜令遍即更以黃土硬泥裹一重候微乾坐冬瓜在灰
火中四面簇炭火燒令泥赤即止候冷打去泥土并剝去
麩揭開冬瓜裏面有黃連汁不限多少濾過每服一盞渴
即飲之立瘥未瘥更作一服冬瓜皮肉曬乾兼治骨蒸勞
熱及酒黃多年者為末每於食後溫水調下二錢甚效

醍醐膏 治消渴

右用烏梅一片搥碎甜水四大碗煎至一碗濾去滓白砂
蜜五斤砂仁末半兩入沙石器內慢火熬赤色成膏為度
取下放冷加白檀末三錢麝香一字攪勻以磁石器盛密
封口夏月冷水調冬月沸湯調服 詩曰

烏梅化痰止煩渴

蜜生津液潤心肺

白檀大能解暑毒

麝香通竅辟邪氣

蠶絲湯 治渴神効

右用煮蠶絲湯任意飲之類効如非時以絲或綿煎湯
服亦可有一人苦渴疾日飲斗水服此有効

治消渴方

右用香水梨或好鵝梨或江南雪梨取汁用蜜相停同熬
瓶盛不時用熱水或冷水水調服大有功効止嚼梨亦妙
東坡家藏方載消渴日飲水數斗飲食倍常而類渴連年
服藥不愈者可用麝香當門子一箇酒浸之作十小丸以
枸杞熬湯送下隨愈此病脾脉實而腎脉衰初因飲酒瓜
菓過度熱在脾胃而停積生冷雖飲食過人而多飲水飲
水既多不得不溺非消渴也言其當理服者審之

珍珠龍腦丸 治小渴鎮心安神

珍珠

辰砂

人參

黃連已上各半及

龍腦一升

天花一升

銀箔五十片

右為細末練蜜為丸如雞頭實大每服一九空心日午及臨睡時細嚼用麥門冬湯送下

天門冬丸治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶 小便

白濁並宜服之

天門冬去心焙乾一升半

雞內金三升微炙 桑螵蛸十枚炙

土瓜根乾者 熟地黄

瓜蒌根 肉蓯蓉酒浸一宿切焙

知母唐

鹿茸酒炙

五味子

赤石脂

澤瀉已

二升各 牡蠣煨二

苦參一升

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九用粟飲送下食前服

猪腎薺菘湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎一具

大豆一升

薺菘

石膏三升各

人參

茯神一作茯苓

知母

葛根

黃芩

磁石綿裹

瓜蒌

甘草二升各

右咬咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑病勢減渴即止

薺菘丸 治強中為病莖長興盛不交精益自出消渴之後多

作癰疽皆由過服丹石所致

薺菘

大豆去皮

茯神去木

磁石煨研

玄參

石斛去根

瓜蒌根

地骨皮去木

鹿茸已上各

沉香不見

人參已上各

熟地黄酒蒸一升

右為細末用猪腎一具煮如食法爛杵和為丸如梧桐子

大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服七十九空心用鹽湯送下

止渴潤燥湯 治消中大便秘澀燥硬兼喜溫飲陰頭退縮舌

白乾燥唇口乾眼澀黑處見浮雲

升麻半 黃蘗酒浸 當歸身 荆芥穗

桃仁泥 麻仁泥 知母 防風已上各

芫乎 石膏各七 杏仁泥六箇 熟地黄三分

甘草稍 小椒各二 細辛一分 紅花少許

右吹咀作一服水二椀煎一椀去滓食遠溫服忌辛熱物

腎瀝散 治消腎上氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞脛脰微炙 遠志去心 人參 桑螵蛸微炒

黃芪 澤瀉 桂心 熟地黄

白茯苓 龍骨 當歸已上各 麥門冬去心

川芎各二 五味子 甘草炙 女參已上各

磁石三及研碎水

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎

至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五

分去滓空心溫服晚食前再服

金銀箔丸 治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼小便多

金箔一百片 銀箔一百片 丹砂細研 瓜蒌根各二

巴戟去心 五味子 澤瀉已上各

天門冬 黃連四及

白茯苓去皮 生地黄焙 葛根已上各 麥門冬去心焙

右除別研藥外槩為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大

每服二十九加至三十九不拘時用糯米飲送下

白茯苓丸 治消腎因消中之後胃熱入腎消燥腎脂令腎枯

燥遂致此疾即兩腿漸細腰脚無力

白茯苓

覆盆子

黃連

瓜蒌根

葶藶

人參

熟地黄

玄參已上各

石斛去根

蛇床子各三

鷄脰脰三十枚

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十

丸食前煎磁石湯送下

梅蘇丸

治消渴膈熱煩燥生津液

白梅肉

紫蘇葉

烏梅肉各半

麥門冬去心

百藥煎三刀

訶梨勒皮用

人參各一

甘草炙一

右為細末煉黃蠟汁拌和為丸如雞頭實大每服一九不

拘時含化燕津路行解渴

脛脛散

治久渴旬日見效

雞脰脰

雞腸各五共

白龍骨

漏蘆去苦

鹿角膠炙燥

白石脂各一

土瓜根三刀

小鰾二七

牡蠣粉

黃連

苦參各二

右為細末每服一錢至二錢米飲調下日三夜一

神仙減水法名軒龍創子手治三焦壅熱三消渴疾 日夜飲

水無度此藥主之不可輕用其效如神

人參

天花粉

知母

宣黃連

苦參

麥門冬

浮萍

白扁豆

黃芪炙

黃丹以許

右為細末每服一錢新汲水調下妙不可言

生津甘露飲子

治膈消大渴飲水無度舌上赤澁上下齒皆

枯舌根強梗腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃目白精黃

甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噎善怒健忘

腎腰背寒兩尻冷甚

石膏

一斤

黃連

桔梗

木香

各二斤

黃蘗

一斤

薑黃

山梔子

炙甘草

升麻

一斤

人參

全蝎

杏仁

各一斤

葶藶

一斤

生甘草

連翹

白芷

白芷

一斤

麥門冬

當歸

白葵

蘭香

一斤

芫乎

知母

酒浸

藿香

消渴之疾燥熱之氣勝也內經曰熱淫所勝佐以甘苦以
甘瀉之熱則傷氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不
能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云滋水之源以制
陽光故以黃蘗黃連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以
當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷白葵蘭香甘草之
辛寒和血潤燥為佐以升麻芫乎苦平行陽明少陽二經
白芷菟木香葶藶茄藿香反佐以取之又為因用桔梗為

舟楫使浮而不下也

右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子曬半乾將杵碎
篩如米大食後每服二錢抄於掌內以舌舐之隨津唾下
或以白湯少許送下亦可此治之緩也不惟不成中滿亦
不傳瘡瘍下消矣

東垣嘗謂余曰潔古老人有云能食而消渴者白虎倍加
人參湯主之大作湯劑多服不能食而渴者錢氏白朮散
倍加葛根大作湯劑廣服之

赤茯苓湯

治消渴飲水太過胃氣不和腹脹不思飲食

赤茯苓

赤芍藥

枳殼

麩炒

甘草

人參

半斤

白朮

前胡

檳榔

桂心

三分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

右咬咀每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓食前温服

肉蓯蓉丸 治消渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉酒浸切焙地骨皮 澤瀉 五味子

巴戟去心 當歸切焙 韭子 熟地黄焙

牡丹皮 白龍骨 甘草炙 磁石火煨醋

赤石脂 人參二匕上各 禹餘糧分三 桑螵蛸炙十

右為細末煉蜜為丸如梧桐子六每服二十九以牛乳或

白湯送下日進三服

鐵粉丸 治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如脂

鐵粉研水飛過乾 雞胫五枚陰乾

黃連三兩 杜鰾二兩

右再研勻煉蜜和劑以酥塗杵熟丸如梧桐子六每服三

十九加至四十九食前煎粟米飲送下

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉 桑白皮 赤茯苓各一 郁李仁去皮炒

羚羊角銹 檳榔各三 桂心去皮 枳殼炒

獨活 木香各半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不

拘時温服

瞿麥湯 治消渴飲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗 澤瀉 滑石各半 防己三分

黃芩 大黃各一 桑螵蛸炒

右咬咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心温服良

久再服

葶藶丸 治消渴後成水病浮腫

甜葶藶隔紙炒 瓜蒌仁 杏仁湯浸去皮尖及

漢防已

各一

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前赤茯苓煎湯送下日進三四服

填骨煎 治消渴後虛乏

白茯苓

去皮

兔絲子

酒浸

山茱萸

去核

麥門冬

去心

附子

炮去

石斛

去根

牛膝

酒浸

巴戟

當歸

已上各

大豆

炒去

石膏

去毛

桂心

皮各

五味子

遠志

去心

人參

已上各

肉蓯蓉

三及酒

天門

去心

三分

右為細末用生地黄生瓜蒌根各三斤搗絞取汁以銀石器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜九如雞子黃大米飲下日三藥末不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤爛疼痛

藍葉

升麻

玄參

麥門冬

去心

黃芪

葛根

沉香

赤芍藥

犀角屑

甘草

生用

大黃

二兩

右吹咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服
玄參散 治渴利煩熱生癰疽發背爛腫疼痛

玄參

芒硝

大黃

微炒

犀角屑

羚羊角屑

沉香

木香

黃芪

各一

甘草

三分

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下
忍冬丸 治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

不以多火根莖花葉皆可一用一名老公鬚一名金銀花一名左纏藤水洗淨用

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草

少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十
丸至百丸酒飲任下不拘時服一方用忍冬草煎服此藤
凌冬不凋三月開花五出黃白相間微香帝帶紅外科精
要又以煮酒窸服或時不犯鉄器服至大小揚通利此藥
到得力用乾者不及生者効速仍治五種飛尸酒研傳瘡
亦好但留一口泄毒氣真經効奇藥也此藥不特治癰亦
能止渴并五疔諸漏