

暑者證

夫暑者夏令炎天之氣也經曰寒傷形熱傷氣可以言之人與天地同一橐籥夏月天之氣浮於地表則人之氣亦浮於肌表况於盛暑之時膚腠疎豁易於傷感也按潔古云靜而得之為中暑動而得之為中熱東垣謂避暑於深堂大厦得之者曰中暑陰證宜以大順散主之日中勞復得之者曰中熱陽證宜白虎湯主之此大法也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辯宜詳審焉

王安道曰暑熱之氣一也皆夏月中傷其邪而為病焉豈以暑熱分為陰陽二證而名之邪凡人避暑於深堂大厦身

犯寒氣口受寒物因暑而致之病非中暑也宜以秋夕傷寒證篇參治為妙或以養本湯五積散冷香湯胃苓湯大順散詳用

○冒暑者則腹痛水瀉胃與大腸受病宜六和湯黃連香茹飲黃連退熱否或惡心有痰飲者加南星生薑半夏

○傷暑者則身熱頭疼躁亂不寧或身如針刺者宜解毒白虎湯熱加柴胡氣虛加人參

○中暑者則身熱煩渴小便不利宜天水益元散此藥能燥濕分利水道實大腑化熱毒行積滯逐凝血補脾胃降火之要藥也

附脉理

脉訣舉要曰暑傷於氣所以脉虛弦細花暹體狀心煩面垢

附諸賢論

丹谿載一人夏大熱謔語肢體莫舉喜冷飲脉洪大而數以黃芪茯苓濃煎如膏用凉水調服三四次後昏卧如死氣息如常次日方醒而愈

○一人夏月發熱火汗惡寒戰慄煩渴此暑傷病也脉虛微而數其人勞損太過以人參作湯調辰砂四苓散八貼而安

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之證也其病必苦頭痛發躁熱寒熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類

暑熱發渴脉虛用人參白虎湯不效或用竹葉石膏湯亦好
若吐瀉脉沉微甚者不可用涼藥可用大順散如熟附子等
分或附子理中加炒芍藥

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥
多用溫脾消食治溫利小便之藥醫者要識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次
治其外清暑補氣而以理脾為主東垣清暑益氣湯已兼
此意其用黃芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃
柏葛根是清暑補氣也蒼朮神麩陳皮澤瀉青皮是治內
補脾也

附諸方

香薷飲治一切暑熱腹痛瀉
亂吐利煩心等症

香薷四兩

厚朴製

白扁豆各二兩

每服水二鍾煎一鍾不拘時服加黃連一錢名黃連香薷

飲最解秋暑

五物香薷飲 驅暑氣和脾胃

香薷三兩

白扁豆

厚朴製

茯苓各一兩

甘草炙一兩

右剉每服七錢水二盞煎至七分去粗不拘時服

十味香薷飲 治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利

香薷兩

人參

陳皮

白朮

茯苓

黃芪

木瓜

厚朴製

白扁豆炒 甘草炙各半兩

右剉每服一兩水二盞煎八分不拘時服

清暑益氣湯

治長夏溫熱蒸人人感之四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便赤而數大便澹而頻或痢或渴不思飲食自汗身重

黃芪 升麻 蒼朮各一錢 人參去蘆

神麩炒 陳皮各五錢 甘草炙 五味子九箇

澤瀉五分 青皮二分 黃蘗 麥門冬

當歸各三分 葛根 白朮

右剉作一服用水二盞煎至八分食遠服

冷香飲子治老人虛人伏暑煩躁引飲無度惡心疲倦服涼藥不得者

草菓仁錢五分 附子炮去皮臍 橘紅 甘草炙各一錢

右作一服水二盞生姜七片煎至一盞去粗井水沉冷旋旋服不拘時

竹葉石膏湯治伏暑內外熱熾燥煩大渴

石膏五錢 麥門冬去心 人參去芦各二錢 甘草炙五分

半夏湯洗七次一錢五分

右剉作一服水二盞生姜五片青竹葉十四片粳米一撮煎至一盞不拘時服

人參益氣湯治暑熱傷氣四肢困倦嗜卧兩手指麻木

黃芪二錢五分 甘草二錢半 人參五錢 升麻二分

白芍藥一錢 五味子二十箇 柴胡八分

右剉作一服用水二盞煎至八分不拘時服

清暑六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰嗽胃脘痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食並皆治之

縮砂湯泡 半夏七次 杏仁去皮 人參去

藿香去 白扁豆炒 香茹 厚朴製

木瓜各一錢 甘草炙五分 赤茯苓去皮

右剉作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至八分不拘時服

益元散一各天水日散 治中暑身熱小便不利分水道實大府

化食毒行積滯遂疑血解煩渴降妄行火之要藥也

滑石六兩 甘草一兩

右和勻每服三五錢新汲水調服

養需湯藿香正氣散合香

大順散治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分

甘草七兩 乾薑 杏仁去皮 肉桂去麤皮

右先将甘草用白蜜炒過次入乾薑却下杏仁炒過用篩

篩淨合桂為末每服二三錢白湯點服

香朴飲子

治大人小兒伏暑吐瀉虛煩悶亂

人參去蘆

茯苓去皮

甘草炙

紫蘇

澤瀉

香薷

半夏麩

白扁豆

烏梅肉

木瓜

厚朴薑製各一錢

右剉作二服用水二鍾薑二片棗一枚煎至八分食前服

生脉散

人參

五味子

麥門冬去心各等分

右剉用水煎夏月飲之孫真人曰夏曰必服五味子以補

五臟氣東垣曰夏間服生脉散加黃芪炙甘草令人氣

力湧出

若夏月傷寒發熱汗大世無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣

七月後方

人參

黃芪蜜炙

麥門冬去心

白芍藥

陳皮

白茯苓各一錢

黃連炒

甘草炙各五分

黃栢三分

白朮一錢五分

香薷

知母

右薑水煎食前溫服

若夏秋暑熱因過用冷物茶水傷其內又過取涼風傷其外

以致惡寒發熱胸膈飽悶或飲食不進或兼嘔吐泄瀉此

內外俱寒冷也

人參

乾薑炒紫

厚朴薑水

陳皮

羌活

枳實

白茯苓各一錢

白朮五分

甘草炙五分

右薑水煎食前温服

若夏暑在途中常服以壯元氣清熱驅暑服之免中暑霍亂

泄瀉痢疾等證

人參一錢二分

白朮一錢五分

五味子十粒

并碎麥門冬去心

白芍藥炒

白茯苓各一錢

知母炒

陳皮

香薷各七分

黃芩炒三分

甘草炙五分

右薑水煎食前温服

第五濕證

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰濕勝則濡泄地之濕氣感則
害人皮肉筋脉原病式曰諸瘕強直積飲痞膈中滿皆屬於濕

有自外而得之者有自內而得之者又曰因於濕首如裹蓋首
為諸陽之會位高氣清為濕氣薰蒸而沉重似有物以蒙之也
失而不治則鬱而為熱傷血不能養筋故大筋繆短而為拘攣
濕傷筋不能束骨故小筋弛長而為萎弱以必審其方土之源
標本施治如東南地卑多濕凡受必從外入故體重脚氣多自
下起治當汗散久則踈通滲泄之西北地高多燥生冷濕麵或
飲酒食後寒氣拂鬱濕不能越作腹皮疼脹甚則水鼓痞滿或
週身浮腫如沉按之不起此皆自內而出也當以健脾胃消腫
脹利小便為要宜服檳榔木香枳實黃連厚朴大黃之類及葶
藶木香散審其元氣虛實而通利之全在活法為妙不可執一
論也

附脉法

脉訣舉要曰或瀉或細或濡或緩是皆中濕可得而斷

丹溪曰六氣之中濕熱為病十居八九

濕在上宜微汗而解不宜麻黃乾葛經曰濕土甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為效而止也羌活

蒼朮之類散風燥濕

濕在中焦宜利小便此淡滲治濕也又曰治濕不利小便非

其治也茯苓滲濕湯五苓散之屬

濕在下部宜假升提之法內經曰氣升則水自降也除風濕

羌活湯補中益氣湯加導濕

丹溪醫案

王宗一官患濕氣病兩膝疼難行腰疼小便中有白濁滲濕

湯加

人參

白朮

木通

澤瀉

防已

蒼朮

蒼耳

甘草

黃柏

知母

牡蠣

龜板

當歸

芍藥

熟地黄各一錢愈

許正一官患濕氣腰似折勝似冰冷無力除濕湯加

附子

半夏

厚朴

蒼朮

木香

陳皮

白茯苓

甘草

牛膝

杜仲

酒黃芩

猪苓

澤瀉

黃柏

知母各一錢愈

人背間身體如負有二百觔之重用加味茯苓白朮湯

茯苓

白朮

乾姜

甘草

澤瀉

猪苓

酒黃芩

木通

蒼朮

服之愈水煎

黃宗廣年五十五歲患濕氣膀胱脚攣拳身不直當歸粘痛湯

加

杜仲

黃栢

川芎

白朮

甘草

枳殼

五貼而愈

顧宗廣年五十五歲患濕氣嘔吐酸水如醋能飲酒二陳湯

加

蒼朮

白朮

砂仁

藿香

黃連

金文進患濕氣兩膀疼痛小便不利粘痛湯加

滑石

木通

燈心

澤瀉愈

又活套云濕本為土氣火熱則能生濕土故夏熱則萬物濕潤
秋涼則萬物乾燥夫熱而怫鬱則生濕也因濕生痰故用二陳
湯加酒芩羌活防風去風行濕蓋風藥能勝濕也大抵治濕宜
利小便為上策故曰治濕不利小便非其治也

如一身盡痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜五苓散姜汁
蒼朮以微汗之不可大汗恐汗出而虛濕仍在也若自汗
多者宜白朮甘草為主

若小便自利清白大便泄瀉身痛自汗此為濕寒宜五苓散
加生附蒼朮木瓜

又治濕消腫脹利小水健脾胃葶藶木香散葶藶子茯苓猪
苓白朮各一两木香澤瀉木通甘草桂枝各半两滑石三
两為末湯調服

以上諸方乃畧示其端耳全在活法加減用之不可執
一論也

附諸方

茯苓白朮湯

茯苓去皮

白朮

乾姜炮

甘草炙

桂心各一两

右劉每服五錢水煎食前服

當歸粘痛湯

羌活各一两

人參

苦參

升麻

葛根

蒼朮各四两

甘草

黃芩酒炒

當歸身酒洗

防風

知母去毛酒製

茵陳酒炒各

澤瀉

猪苓去皮

白朮各一分

右細切水二盞煎八分不拘時服

麻黃白朮散

治感風濕身體煩疼無汗發熱者

麻黃去節三兩

白朮四兩

甘草

桂心一两

杏仁去皮尖十六个

右劉每服四錢水一盞煎七分空心服

平胃散

和齊方 ○ 治脾胃不和進飲食常服暖胃消痰

蒼朮米泔浸五觔

厚朴薑製炒

陳皮各三觔

甘草煨三兩

右為末每服五錢薑三片棗一枚煎服入鹽一捻沸湯點

服亦得一方加草菓各半胃草菓散

除溫湯百一量方○治寒溫所傷身體重者腰脚酸

半夏麩炒

厚朴薑製

蒼木米泔浸藿香葉

陳皮去

白茯苓去皮各

白木生用

右剉每服五錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食前溫服

加味五苓散本方加羌活一倍治內傷飲食有溫小

茯苓湯秘方○治脾氣不實手足浮腫

赤茯苓

澤瀉

香附子

桑白皮

大腹皮

陳皮

乾薑各等

右剉每服一兩水二盞煎一盞去粗溫服不拘時

二陳湯加酒黃芩酒羌活米泔浸蒼木散風行濕最妙

茯苓滲濕湯治鬱熱嘔吐而渴身體面目俱黃

黃芩

黃連

梔子

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳實各四

赤茯苓

澤瀉各五

茵陳各六

右剉水煎服

除風濕羌活湯治風濕相搏一身盡痛

羌活分七

防風

升麻

柴胡各五

藁本

蒼朮各一

右剉水煎服

茵陳五苓散

治濕熱大勝黃疸發熱五苓散內加茵陳一倍即是也

經驗白朮湯

治中濕遍身疼痛不能轉側及皮痛難着席

白朮

右剉一服無灰酒盞半煎至一盞去渣溫服

謹按濕熱之原蓋因寒溫飢飽失常喜怒勞役過度以傷脾胃夫脾胃乃水穀之海也今脾胃受傷而動火火則薰蒸水穀而為濕熱者也又按胃司納受脾司運化今脾不能運化飲食飲食停積而生濕熱亦良多矣為治之法入壯實則專攻其濕熱入弱虛則攻補兼施而補脾消穀導水三者不可

關一也

丹溪又載治濕者固當以三朮為君以補脾為主治然亦有濕盛氣滿膨脹者又當以利水藥為臣使或以木通澤瀉芩蘆車用或以三朮為君而利水藥為臣使或以木通澤瀉芩蘆車前子等利水藥為君而以茯苓白朮人參等補脾藥為臣使有本而標之者亦有標而本之者看緩急而施治則萬舉萬全之功可立而待也

第六燥證

內經曰諸澀枯涸乾勁斂揭皆屬於燥乃陽明火勝太陰肺之氣也夫金為水源而受燥執竭絕於上則不能榮養百骸有自

來矣或患大病後曾服尅伐之藥或汗下重亡津液或預防養生慎服金石之劑或恣醇酒炙肉皆能偏助旺火而損真陰以致血液衰耗在外則皮膚皴揭在內則腸胃枯涸在上則咽乾口燥在中煩渴不已故脉見細潛結代轉展深痼原病式曰此皆風火熱所傷也治法即當以甘寒滋潤之劑通調百脉使氣液宣通內神茂而外色澤矣

脉法

脉緊而澁 或浮而弦 或乾而虛

方法

丹溪曰皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥痒皆火燥肺金燥之甚也宜服四物湯去川芎加麥門冬人參天花粉黃

栝五味知母之類治之又曰燥熱屬陽宜與熱門參看也
解熱生津藥

天門冬 麥門冬 知母 貝母

栝萋根 琵琶葉 五味子 地骨皮

梅實 欵冬花 紫苑 阿膠

訶梨 淡竹瀝 酸棗仁 丹皮

滋血潤燥藥

生熟地 當歸 川芎 芍藥

麻仁 杏核仁 桃仁 蜀葵花

郁李仁 槐實 栝實 蒲黃

牛膝 枸杞 菴蓉 瑣陽

鹿茸

各經燥藥引用

肝當歸

心門冬

脾麻仁

肺杏仁

腎栢仁

大腸硝

小腸茴香

三焦山藥

膀胱

心炮桃仁

已上本草集要以類而推加減法也

瓊脂膏

治皮膚枯燥消渴並宜

生地膏

搗取真汁去粗

鹿角膠

白砂蜜

沸掠去上珠

真酥油

生薑

取汁

右先以文武火熬地黃汁數沸以絹濾取汁又煎二十沸

下角膠次下酥油及蜜同煎良久候稠如餡以磁器收

貯每服一二匙空心温酒調下

當歸潤燥湯

治口燥及消渴服滋潤開

當歸

熟地黃

生地黃

大黃

酒浸

桃仁

麻仁

甘草

升麻

紅花

右剉水煎空心稍熱服

活血潤燥湯

治大便秘不通常燥結

當歸

防風

大黃

羌活

桃仁

尖另研如泥

麻仁

另研如泥

皂角仁

則滑濕滑則燥結自除用之勿損

右除桃仁麻仁別研外其餘藥研為末和勻練蜜丸如梧

桐子大每服五十九三兩服後大便日久不能結燥也
以磁器盛之勿令見風

生血潤膚飲

川芎

生地黄

熟地黄

黃芪各一

天門冬

五分

麥門冬

去心

五味子

九

片苓

洗五分

酒紅花

分

升麻

分

杏仁

分

瓜蒌

分

桃仁泥

分

右剉作一服如大便結燥加麻仁郁李仁各一錢

天門冬膏

治血虛肺燥皮膚折裂及肺痿咳膿血證

天門冬

新取者不
拘多少

右一味淨洗去皮心細搗絞取汁澄清以布濾去粗滓用

銀鍋或砂鍋慢火熬成膏每用一二匙空心溫酒調服

潤腸湯

治大腸燥結粘惡等證

潤腸丸

治大便秘燥閉結不通○
已上二方並見秘結開

謹按結燥之證有虛實二者之分何則或因風寒邪從外入或

因七氣火自內起此是濕熱拂鬱燥結有時乃為實也實則

宜蕩滌腸胃開結軟堅如大黃芒硝枳實厚朴承氣湯之類

是也或因病久飲食少進或因年高將息失宜此是血液枯

涸燥結無時乃為虛也虛則宜滋養陰血潤燥散熱如當歸

地黃桃仁條芩潤燥湯之類是也凡給燥之證苟不審實虛

而輕用藥死生如反掌之易耶

第七火證

論曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚甚荷者
蓋能燔灼焚焰飛走狂越消燥於物禦之遊行乎三焦虛實之
兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能
不違於道常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交
中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一
動元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之
極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天造君相之
外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激之其火隨
起丹溪又改火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動之類

謂一水不勝五火之火出自人為又考病機一十九條內舉屬
火者五諸執著瘵皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病
者甚多深契內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下泄轉筋小便
渾濁腹脹大鼓之聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下癰亂昏鬱
腫脹鼻塞鼻衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄
衄衄血汚此皆少陰君火之執乃真心因小脹之氣所為也若
脊痠暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭附腫夜酸氣逆衝上禁慄
如喪神守定嘔瘡癆喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明
暴注瀾瘵暴病暴死此皆少陽相火之執乃心包絡三焦之氣
所為也是皆火之變見為諸病也為脈虛則浮大實則洪數藥
之所主各因其屬君火也心火也可以濕伏可以水滅可以直

折惟黃連之屬可以制之相火龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參朮草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃芒硝之屬若腎受傷真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾

王為火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集畧其說備處方之用庶免實實虛虛之拘也

丹谿曰人具五行各其一性惟火有二焉心為君火而又有相

火者寄於肝腎二藏何也內經曰君火人火也相火天火也

火內陰而外陽主乎動者也諸動皆屬火以名而言形質相

生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位稟命因動

而見故謂之相經云一水不能勝二火也又有五性之火為

物所感而動大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火

起於腎悲哀動中則火起於肺心火自焚則死矣正謂一水

不能勝五火也又云相火易起五火相扇則妄動矣變化莫

測無時不有前敷真陰陰虛則病陰絕則死

脉法

脉浮而洪數為虛火○脉沉而實大為實火○洪數見於左寸為心火見於右寸為肺火見於左關為肝火右關為脾火兩尺為腎經命門之火○男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也

方法

丹溪曰陰虛火動者難治

實火可瀉黃連解毒之類○虛火可補參朮生薑甘草之類○鬱火可發當着在何經○風寒外束者可發輕者可降重則從其性而升之○凡火盛者不可驟用寒涼必須

溫散○火急甚者必緩之生甘草蕪瀉兼緩參朮亦可○人壯氣實火盛顛狂者可用正治硝黃冰水之類○虛火盛狂者以生薑湯與之若投以冰水之類正治立死○有補陰則火自降炒黃柏熟地黃之類○凡氣有餘便自火氣從左邊發者肝火也氣從臍下起者陰火也○飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦難治

輕手按之熱甚重手按之不甚此熱在肌表宜清之地骨皮麥門冬竹茹之類

重手按之熱甚而烙輕手按之不覺熱此病在肌肉之內宜發之東垣升陽散火湯火鬱湯之類煩燥者氣隨火升也

臟腑各屬瀉火之藥

木通下行瀉小腸火○人中白瀉肝火○黃芩黃連以豬
膽汁拌炒能瀉肝膽之火○黃栢加細辛瀉膀胱之火
○女參能瀉無根之遊火○小便降火極速山梔子能
降火從小便中瀉去其性能屈曲下行人所不知○人
有氣如火從脚下而入腹者此虛也蓋火起於九泉之
也此病十不救一治法以四物湯加降火藥服之外以
附子末津調貼脚心湧泉穴以引火下行

○愚按此條言猶有未悉者如果勞役陰虛之人有此
固當作陰虛治若壯實之人有此則是濕鬱成熱之
候也愚嘗冒雨走行衣濕得此證以蒼朮黃栢加牛
膝防已等藥作丸服之而愈後累醫數人皆驗若誤

作陰虛治即成痿證劇矣

駱氏年四十餘夜間發熱早晨退五心煩熱無休半年後求
予治六脉皆數浮取全不應與東垣升陽散火湯四貼而熱
減大半胸中覺清快再與二貼熱悉退後以四物湯加知母
黃栢少佐以乾薑調理而安

火證通用方附後

涼膈散加黃連半兩名
黃連清心湯

大黃錢二

連翹錢四

黃芩

山梔子

薄荷

朴硝

甘草各一錢

右剉作一服水二盞入蜜一匙竹葉十片煎服

黃連解毒湯

黃連

黃栢

黃芩

山梔香

右剉水煎食遠溫服

瀉心湯

大黃

當歸

芍藥

荊芥

麻黃

甘草

各一錢半

白木

三錢五分

薄荷

許

右剉作一服生薑三片煎服

三黃丸

又方去
等加連

大黃

黃芩

黃栢

各等分

右為末滴水為丸如梧桐子每服三十九白湯下

大補丸

黃栢

炒褐

粥糊丸溫湯下

抑青丸 治肝火

黃連

薑汁

粥糊丸溫湯下

石膏丸

瀉胃火食積痰火

石膏一味醋丸菉豆大溫湯下

芍藥藥皮丸

芍藥

黃栢

各一兩

當歸

黃連

各兩

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十九白湯下

大金花丸

一方如梔子減大黃各梔子金花丸

黃連

黃栢

黃芩

大黃

各等分

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十九新汲水下

黃連木通丸

治心經蓄熱夏至則甚

黃連二兩 木通一兩

右為末用生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服二十九食

後燈心湯下日進三次

左金丸 治肝火

黃連六兩 茶葉半兩 一兩或

右為末水丸白湯下五十丸

人中白瀉肝火亦降陰火須風露二三年者

人中黃降火治溫病大涼多年者佳

火鬱湯治四肢熱及五心煩熱因熱伏土中 或氣虛得之

或胃虛多食冷物過陽氣於脾吐之中

羌活 升麻 獨活 芍藥

人參各七 柴胡 甘草生各 防風三分

葱白三

右細切作一服水一盞半煎一盞新熱服

升陽散火湯

治男子婦人四肢發困熱筋骨間熱肌表熱如火燥鬱之

烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物鬱遏陽

氣於脾土之中火鬱則發之

升麻 獨活 羌活

白芍藥 人參各六 甘草炙 柴胡

防風三分 生甘草二

右剉作一服水一盞半生薑三片煎一盞熱服忌生冷各

物

四物湯加白馬脛骨降陰火代苓連用

陰虛發熱四物湯加炒黃柏酒知母乃降火補陰之妙劑甚

者加龜板蕪氣虛加參芪白朮

手心熱癩熱鬱當用火鬱湯或用梔子香附白芷半夏川芎

麩糊為丸服

滋腎丸降腎火

黃柏二兩知母二兩

西去毛酒浸陰乾

肉桂一兩去粗皮

右二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火也桂

與火邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也

右為細末以熱水九百沸湯下

謹按此方用大黃瀉陽明之濕熱從大便出用滑石降三焦
之妄火從小便出用黃芩以涼膈柴胡以解肌防風以清頭
目用人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾
腎之陰而無半味辛香燥熱之謬藥真治風熱燥熱溫熱挾
虛之良劑非至於醫者其能治如是也耶溫熱病汗下後餘
熱未退用此尤妙

瘧證

內經曰夏傷於暑秋為瘧瘧又曰先寒而後熱者名曰瘧瘧先
熱而後寒者名曰溫瘧其但熱而不寒者名曰痺瘧丹溪曰瘧
瘧比星於風瘧瘧者老瘧也以其隔二日一作纏綿不去古古

多用峻劑恐非稟受怯弱与居養所移者所宜殆悟常山烏梅
砒丹劫劑或誤投之輕病變重七者必危夫三日一作邪入
於三陰經也作於子午卯酉日者少陰瘧也作於寅申巳亥日
者厥陰瘧也作於辰戌丑未日者太陰瘧也瘧得於暑當以汗
解或因取涼太過汗鬱成痰其初感也弱者即病胃氣強者伏
而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其雖差夫感暑与風
皆外邪也故非汗多不解今之選此疾也已經再三劫試胃氣
重傷何由得愈欲治此證必先以參朮等補劑為君加些葛等
發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下体屬阴最難得汗補
藥力到汗出至足方是佳兆又有感病極深邪氣必自藏傳出
正府其發无時若發於午之後寅之前者血受病也為難愈願

三補丸

鴻三傑

黃芩

黃連

黃柏

右為細末新汲水丸服

千金麥門冬湯

治諸病后火熱乘肺致吐有血胸脇脹滿上气喘急羸瘦五心烦熱渴而煩悶

麥門冬

桑白皮

生地黄

紫苑茸

桔梗

淡竹葉

麻黃

五味子

甘草

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

柴胡飲子

治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來蓄熱寒戰及傷寒
發熱不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗

後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服日三

服病熱甚者加服之

防風當歸飲子

防風

當歸

白芍藥

柴胡

黃芩

人參

甘草

大黃

滑石六兩

右剉每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至七分

去渣溫服

漸趨早亦佳此也治斯疾者春夏為易秋冬為難大忌飽食
發日食飽疾愈加重尤當以汗之難易較輕重也外有陰虛證
每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解脈必虛滯而數且瘧
脈弦而虛脈不大弦為辯耳若誤作瘧治而用常山砒丹及柴
胡乾葛等藥多至不救醫者宜以脈證參驗其虛實而療之母
縱巨膽以殺人也

脈法

瘧脈弦數多熱弦遲多寒弦而小緊者下之瘥故宜溫宜汗

宜吐正治法也

脈經云瘧脈自弦微則為虛代散則死

方脈

丹溪曰 有暑 有風 有食 有痰

大法風暑當發汗夏中多在風涼處歇遂閉其汗不泄故也
惡食者必是飲食上得之宜無消導

王節齋曰瘧是風暑之邪無是食積痰合而為病有三日一發者受病一年有間日一發者受病半年有一日一發者受病一月連發住一日者乃氣血俱受病也有午前發者有午後發者有發於夜者治法乃邪從外入俱宜發散必須分別陽分陰分又云有汗要無汗扶正氣為王無汗要有汗散邪為主邪瘧及新發者可散可截虛瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

三方

柴胡

白朮各錢半

陳皮七分

乾葛一錢

甘草五分

蒼朮米泔浸一錢

若間二日或一日發午後夜發者邪入陰分加當歸川芎若

藥酒炒熟地知母酒炒各一錢

紅花酒洗黃蘗酒炒升麻各四分

提起陽

分方可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱虛加人參黃芪

白朮各一錢以補氣當歸川芎芍藥熟地以補血

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏熱

甚頭痛再加川芎軟石膏各一錢口渴加石膏知母門冬各一錢

若陽瘧自汗用黃芪人參白朮以斂之無汗蒼朮白朮黃芪

乾葛以發之

若陰瘡多汗用當歸白芍藥熟地黃芪黃柏以斂之無汗柴

胡蒼朮川芎紅花升麻以發之故曰有汗要無汗扶正為

主無汗要有汗散邪為主

若病胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參

五酒炒芍藥大麥芽

若傷食痞悶或有食積者加神麩麥芽一枳實一錢黃連

分炒五

若痰盛加薑製半夏南星枳實一錢黃芩一分六黃連分六

者欲截之加檳榔青皮常山各一烏梅肉三

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用

四君子四物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血

青皮飲方濟生 ○治瘧瘧症此藥效但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澀

青皮白

厚朴製

白朮

半夏湯洗七次

草菓仁

柴胡苗

茯苓皮

甘草各分

鬼哭丹 治瘧二三日一發者

常山一筋醋浸春五夏三日秋七冬十日

檳榔各四兩

半夏製

貝母各一兩

右為末用雞子清麵糊為丸如梧桐子大每服二十九隔

夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

驚甲飲子方濟生 ○治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰癘母也

草菓仁

驚甲醋

黃耆去

白朮

白芍藥

厚朴姜製

檳榔

橘紅

川芎 甘草炙名

右剉每服四錢水一盞薑七片棗一枚烏梅少許煎溫服

草菓飲和濟方 ○治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

紫蘇 草菓仁 良薑炒 川芎

青皮去白炒 甘草炙 陳皮去白 白芷各等分

右剉每服四錢水一盞煎七分熱服

截瘧常山飲

川常山 草菓 檳榔 知母

炙甘草 烏梅 穿山甲煨

右各等分細切每服五錢水酒各半炙罏罏至七八分露星月

一宿清晨冷服之欲吐則順之忌熱湯一日然常山性

暴悍善驅逐痰飲火傷真氣病人稍虛弱者戒勿輕用

老瘧方此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散

川芎 撫芎 紅花 當歸

炒栝 白朮 蒼朮 甘草

白芷

右剉水煎露一宿次早服

附效方

加減柴苓湯代青皮易棗為穩當

柴胡錢一 黃芩酒炒七分 人參分六 半夏姜製七分

甘草 澤瀉各五分 茯苓分八 白朮分七

猪苓分三 青皮炒五分 常山分三 檳榔分三

小柴胡湯五日效
加常山三小量

草菓分三

若陰疔午後夜發者加當歸川芎升麻各五分

右劉薑棗煎服三貼立效

小勞復來散出奇効方治瘧後瘥又發效補兼和鮮

當歸

川芎

芍藥

茯苓

半夏

陳皮

青皮

柴胡熱可加

鱉甲

烏梅

加草菓

右劉薑棗煎服

第九痢證

古方瀉痢滾同論治丹溪以下水穀為瀉下膿血為痢方論從而別之矣

內經曰澁澁而便膿血知氣行而血止也註云上句言病因也蓋血因氣滯而澁也

河間開明之詳見下文

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後重則宜下

腹痛則宜和身重則除濕疎弦則去風膿血稠粘以重藥竭

之身冷自汗以熱藥溫之風邪外束宜汗之驚澹為痢宜溫

之又曰在表者發之在裏者下之在上者瀉之在下者竭之

身表執者內疎之小便澁者分利之又曰盛者和之去者送

之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也夫古方

以瀉痢滾同論治朱紫混淆殊不知瀉屬脾而痢屬腎也丹

溪曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎賊邪難愈先膿血而後

水瀉者此腎傳脾微邪易愈是皆先格言以為後學之

繩墨醫者其可不詳究乎

戴氏曰痢雖有赤白二色終無寒熱之別如白者濕熱傷大腸
來屬氣分赤者濕熱傷小腸來屬血分赤白相雜氣血俱傷
黃屬食積有無五色亦屬五臟治法瀉腸胃之濕熱開鬱結
之氣消化積滯通因通用初得一二日胃氣尚強先宜下之
下後未愈隨證調之倘痢稍久胃氣已弱不宜下之亦有虛
寒者虛則補之寒則溫之年老及產後患此俱不宜下

脈法

脈訣舉要曰溢則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰
無積不痢脈宜滑大浮弦急死沉細無害

不治證

如下痢純血者如麝腐色者如屋漏水者大孔如竹筒者

如朱紅者俱死如魚腦者身執脈大者俱半死半生

有身執挾外感不惡寒小柴胡湯去人參

有惡寒發熱為表證宜微汗和解局方用敗毒散亦可

有噤口痢胃口執甚故也用黃連多加人參煮湯呷之如吐

了再喫開以降之人不知此多用溫藥甘味此以火齊火

以滯益滯哀哉

一乃用田螺搗菴臍中以引熱下流

痢疾治例

王節齋曰痢是濕熱食積三者別赤白青黃黑五色以屬五

臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱

傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣消化積滯

通因通用其初只是下之下後未愈隨證調之痢積久者不可下胃虛故也痢多濕熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃連炒

黃芩

錢五分

白芍藥

炒二錢

已用上三錢

木香

枳殼

錢五分

檳榔

錢一

甘草炙三分

若腹痛加當歸

錢五分

縮砂

錢一

再加木香芍藥

各五分

若後重加滑石

錢半

再加枳實檳榔

各五分

芍藥生用

再加五

分黃芩用條實者亦加五分

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮

各一錢

初欲下之再加大

黃芩兼食積加山查子枳實

各一錢

若紅痢加當歸川芎桃仁

各一錢

初欲下之再加黃芩五錢

若紅白相雜加當歸川芎桃仁

各一錢

以理血滑石陳皮蒼朮

各錢半

以理氣有食積亦加山查枳實初欲下之亦加大黃

若白痢久胃氣虛或下後未愈減芍藥

各七分

加白朮

錢五分

黃芪茯苓陳皮

各一錢

縮砂

錢五分

去檳榔枳殼再加炙乾薑

若紅痢久胃弱血虛或下後未愈減芍藥連五分加當歸川芎熟

錢五分

地阿膠珠陳皮

各一錢

白朮

錢五分

若色赤黑相雜此濕勝也及小便赤澀短少加木通澤瀉茯苓

錢各一

山梔子

錢五分

以分利之

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁炒槐花

各一錢

久不愈減芍

連各七去檳榔枳殼再加阿膠珠炒側栢葉各一錢炒黑

乾薑錢一白木五分陳皮錢一

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條實黃
芩加升麻錢一以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏五分陳皮錢一山梔仁炒五分入生
薑汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血兩虛而痢者用四物湯加入人參白木陳皮黃連
黃芩阿膠之類以補之而痢自止

有一樣寒痢用黃連木香酒炒芍藥當歸炒乾薑縮砂仁

若得痢誤服溫熱止瀉之藥則雖稍久亦可用前法以下之
下後方調之

若得痢便用前正法下之而未愈又用前調理法治之而久
不愈此屬虛寒而滑脫可冬前虛補寒溫二條擇用更加
龍骨赤石脂鶯粟殼烏梅肉等虛之藥

丹溪醫案

一人禁口痢熱甚故也

黃連二錢人參二錢煎湯終日呷之，生

卞千戶年四十六歲黃巖縣人患痢疾久矣服丸愈

側栢葉 黃連 黃栢 黃芩

櫻粟殼 當歸 地榆 枳殼

生地黃 香附 木香 檳榔

右為末以糊為丸有食積腹痛加蓬朮三稜砂仁米湯下

七八十九

李宇宙年六十八歲因飲白酒下痢腹疼甚小便不利裏急後重以

人參

白朮

滑石

蒼朮

木香

檳榔

甘草

右煎下保和丸二十五丸第二日前證俱減惟小便不利用益元散愈

葉先生年三十九歲患痢疾後甚重正合承氣湯證予曰氣口虛形雖實而面黃稍白此必食過飽而傷胃也寧忍兩日與參朮等補藥二三日後胃氣稍充與承氣湯兩貼而安

周信年二十六歲患痢疾喫飯易飢予曉之曰病中便當調養豈可縱口以助病邪教其只用熟蘿蔔喫稀粥且少與如此半月而安

顧流三官患痢疾小腹疼甚日夜五六十次治以

白芍藥分二

陳皮分一

茯苓分七

澤瀉分六

猪苓分四

木香分五

檳榔分八

蒼朮分五

當歸分五

川芎

青皮各六分

何福壽患痢疾疼痛日夜一百來次如血膿甚多治以

當歸分二

白芍藥分一

川芎分八

澤瀉分五

茯苓分六

黃連分一

木香分八

檳榔分一

白朮分一

蒼朮分八

陳皮分六

滑石分五

徐能患痢疾白色者治以

蒼朮 白朮

猪苓

厚朴

滑石 黃連

白芍藥

枳殼

吳茱萸 澤瀉

張景初年七十二歲患痢疾赤白相和身發熱木香檳榔丸六十粒一瀉後四物四君子湯加陳皮芍藥調理半月而安

吳謹六官飲酒多下痢以

陳皮 芍藥

黃連

茯苓

甘草 蒼朮

白朮

枳殼

當歸 乾薑

白芷

川芎

方

芍藥湯

芍藥 當歸

黃芩

黃連 各半

甘草 檳榔

木香 各二

桂 五分

大黃 二

右剉每服五錢水煎食後溫服如痢不減加大黃此方除桂甘草名導氣湯治下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度

香連丸

治下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 二十兩用茱萸十兩 木香 四兩八分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下一方

加蓮肉

大黃丸

治泄痢久不愈膿血稠枯裏急後重日夜無度

大黃兩

右剉用好酒二大盞浸半日煎盡半去大黃將酒作二服

頓飲之後以芍藥湯和之此蕩滌邪熱之藥用酒煎者

欲其上至頂巔外徹皮毛也

瘡後變成痢疾從虛治故用補脾胃藥

黃連炒

木香

縮砂

黃芩炒

橘皮各一

白朮一分

白芍藥二分

甘草五分

當歸酒洗

右剉生薑三片水煎食前溫服

第十 痰 證

痰者病名也人之一身氣血清順何痰之有益因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁而變為痰焉或吐咯上出或留聚腸胃或客於經絡或四肢麻痺隨氣升降無處不到其為病也為喘為欬為惡心為喉閉為嘔吐為痞膈壅塞閉格異病為泄為弦暈為嘈雜怔忡驚悸為癩狂為寒熱痛腫或胸間漣漣有聲或背心一片常如冰冷皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結欬之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於脾胃宜實脾燥濕又隨

氣而升宜順氣為先分導次之又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積則消之在上者吐之在中者下之中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

謹按痰本因熱蒸薰津液而稠濁故名為痰治法不同古以二陳湯為總治焉如寒痰加附子薑桂濕痰加蒼朮厚朴食積痰加以麩蘖山查熱痰加以芩連梔子風痰加以南星皂角燥痰加以瓜蒌貝母鬱痰加以枳殼香附老痰加以海石芒硝是舉其綱張其目也雖然痰證又有挾虛者不可不加補焉如挾氣虛加以四君子血虛加以四物湯脾虛加以六君子腎虛加以六味分其表裏上下等

未有不中病情者也

脈法

脈浮而細滑者傷飲○脈弦數有寒飲春夏難治○脈沉而弦者懸飲內痛○兩關弦浮大實膈上稠痰宜吐之丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰活套加減法于後

附主方

二陳湯

陳皮去白 甘草五分 茯苓一分 半夏炮制

右剉作一服生薑三片水煎溫服此總治一身之痰如要

引下

執痰加黃芩黃連山梔子瓜萋子滑石石膏竹瀝之類

濕痰身重倦怠本方加蒼朮白朮南星之類

食積痰加神麩麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者消積藥

或化痰丸攻之胃氣虛弱宜固中氣若攻之太重而痰愈

盛

風痰加南星枳殼白附子天麻殭蠶猪芽皂角之類氣虛者

加竹瀝氣實者加荆瀝俱用薑汁

寒痰痞塞胸中倍加半夏甚則加麻黃生薑細辛烏頭之類

老痰用海石半夏瓜萋香附連翹之類五倍子佐他藥大治

頑痰宜丸服

血虛有痰者加天門冬知母瓜萋仁香附米竹瀝薑汁帶蟲

者再加黃芩芍藥桑白皮血滯不行中焦有飲食者取竹

瀝薑汁及萋菜自然汁喫二三銀匙必胸中煩燥不寧後

愈

氣虛有痰者加人參白朮脾虛者加白朮白芍藥神麩麥芽

兼補中氣而運痰加竹瀝薑汁傳送尤妙

喉中有痰咯不出嚥不下此痰結也宜鹹以軟堅瓜萋仁杏

仁海石桔梗之類噙化方於後

吐法痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡必用吐

脉浮痰盛必用吐吐法宜先升提其氣就有發散之義用

防風川芎桔梗芽茶生薑薑汁之類或瓜蒂散方見中風或羅

蔔子搗和醬水一碗入油與蜜少許溫服或鰕半觔入醬

葱薑料水煮先喫鰕後喫汁少時以鷺翎探吐吐時先以布勒腰腹於不通風處行之

痰在腸胃間可下而愈宜滾痰丸如畏利藥過傷脾氣莫若清氣化痰丸潤燥化痰丸最為穩當

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外及四肢經絡非竹瀝薑汁不可攻也

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好飲何物吐下後方用藥

凡人頭面頸頰有結核不紅不痛不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

丹溪醫案

鄧高歌患痰血滯不行曾中有飲者服韭菜自然汁冷喫三

四銀錢必胸中煩躁不寧無妨但服後即愈後服抑痰丸

瓜蒌仁兩一 半夏兩二 貝母兩三

右為末炊餅子丸如麻子大薑湯送下

馮大祐年二十七歲濕熱勞倦新婚胸膈不快覺有冷飲脉

瀆大充多得辛溫導散藥血氣俱傷治

蒼朮 白朮 半夏 陳皮各半兩

白芍藥六分 龜板七錢五分 炒黃柏一分 黃芩三分

砂仁定嘔下氣 甘草一分

右為末炊餅丸食前薑湯送下四十九

又要方

導痰湯 治風濕痰等證

南星 制

橘紅 去白

甘草 大各一

半夏 二錢湯七次

茯苓 炙

枳殼 炙

右剉作一服生薑五片前服久嗽傷肺燥熱火鬱者去半

夏加五味子九粒杏仁泥五分

滾痰丸 治濕熱食積成窠囊老疾并小兒癰

黃芩 酒

大黃 各八錢酒洗日乾

沉香 五分

礞石 炙

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三五十九量人壯

怯大小加減丸數

清氣化痰丸

赤茯苓

陳皮 去白

甘草 炙

枳實 炒

杏仁 去皮尖

南星

黃芩 酒洗

瓜蒌子 各兩

右為細末薑汁打糊為丸如梧桐子每服七八十九

辰砂化痰丸 治風濕痰證

南星 炙

枯礬

辰砂

半夏 湯炮七次

右為細末除辰砂另研先以三味用薑汁糊丸芡實大辰

砂為衣每服二丸淡薑湯磨服

清痰丸 專治胸膈中脘痰積食積

烏梅 核去

滑石 炙

黃芩 酒

陳皮 去白

青皮 炙

蒼朮 米泔浸日乾各半兩

山查

南星

神麩 炒

半夏 薑制湯炮

香附 童便浸各一兩

右為末蒸餅糊丸每服二錢白湯下

化痰丸前專潤燥開鬱降火消痰

治老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝濁於心肺之分俱宜開鬱降火滋潤消痰緩而治之庶可效耳

天門冬去心

黃芩酒炒

海粉另研

橘紅去白各一兩

連翹半另研

桔梗去蘆

香附米并研淡鹽水浸炒各半兩

青黛另研一兩

芒硝另研二兩

瓜蒌仁取肉另研一兩

右為極細末煉蜜生薑汁少許和藥杵極勻丸如小龍眼大噙化一九或爵爛清湯細噉之或丸如黍米大淡薑湯送下王六十九此等老痰大率飲酒之人多有之酒

氣上升為因肺與胃脘皆受火邪薰蒸故鬱滯而成此方用天門冬黃芩泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也瓜蒌仁潤肺消痰香附連翹開鬱降氣青黛解鬱火故皆不用辛燥之藥

十棗湯治懸飲內傷

芫花

甘遂

大戟各等分

右為細末以水一盞半煮大棗十枚至八分去棗調藥末強人一盞弱久五分平旦服之不下更加五分下後以糜粥調養之河間曰芫花之辛以散飲甘遂大戟苦以泄水其二物直達水氣所結之處乃泄之之聖藥也然亦有大毒人虛者不可輕用此方各書其載故敢錄之

使學者知其用藥利害之意耳

痰在腸胃間可下而愈

小胃丹 上可取胃膈之痰
下可取腸胃之痰

甘遂 水浸冬七夏三春秋五日
麩裹

大戟 時洗淨晒乾
荒花 醋拌經宿炒令
黑勿焦各一兩

大黃 酒紙裹煨焙乾再以酒潤
一云二兩

黃栢 炒褐色三兩
一云二兩

右為末粥丸如麻子大每服一十九溫湯下此藥能損胃

氣惟實者可用

取竹瀝法 大治熱痰厥厥不省人
事幾死者灌之遂醒

右用淡竹一尺許兩頭去節每段劈作三四片以薄磚二

塊排定將竹片架於磚上兩頭露出一二寸中以烈火
迫之兩頭以盆盛瀝六分中加薑汁一分服之

取荆瀝法 用黃荆截作短
段炙取法同上

能治熱痰功勝竹瀝但不補耳

竹瀝達痰丸

半夏 二兩湯炮洗七次再用生薑汁浸
透晒乾切片瓦上微火炒熟用

人參 去蘆一兩 白茯苓 去皮二兩 陳皮 去白二兩 甘草 炙一兩

白木 微火炒三兩 大黃 酒浸三兩透
熟晒乾秤用 黃芩 三兩酒
浸炒

沉香 五錢用礞石一兩搗碎用硝一兩和勻故入硝
最高者礞石銀鍋內上用瓦片蓋之用鹽泥固

濟晒乾以炭煨過
如金色黃者可用

右為細末用竹瀝一大碗半又用生薑自然汁二小鍾和

勻入鍋內大熬一刻許令熟却將前藥末和搗如稀醬
樣以磁器盛之曬乾仍以竹瀝薑汁如前法搗勻再曬
乾三次仍前竹瀝和丸如小豆大每服一百丸食遠溫
白湯下能墜痰於大腸從大便出此藥不損元氣主能
達痰如神取效丹溪曰痰在四肢非竹瀝不能達也

十一 哮喘

內經曰諸逆衝上皆屬於火大抵哮喘以聲響各喘以氣息言夫
喉中如水雞舌者謂之哮喘呼吸氣促不能以息者謂之喘朱有
不由痰火內鬱風寒外束而致之者外感風寒以祛散之藥痰
火內鬱當以疎導之劑亦有陰血虛少而上喘者宜以滋陰藥
藥之法必須臨期消息用藥無不愈矣

戴氏曰凡喘有胃氣虛喘者擡膏擷項喘而不休火炎上喘
者乍進乍退得食則減食已則喘大抵胃中有實火膈上有
稠痰得食入咽墜下稠痰其喘即止稍久食已入胃反助其
火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者
以火濟火也葉都督患此醫作胃虛治之不愈後以導水丸
利五六次而安

○丹溪曰哮喘必用薄滋味專主乎痰宜大吐藥中多用醋不
用涼藥須當帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者又曰
喘證未發以扶正氣為主已發以攻邪為主也

脈法

脉滑而手足温者生○脉溢而四肢寒者死
附方

專治寒包熱兼治表證

半夏薑製

枳殼炒

桔梗

片苓酒

甘草

紫蘇

麻黃節不去

杏仁去皮

右剉水煎服天寒加桂枝

又痰喘方

南星

半夏

杏仁

瓜蒌仁

香附

陳皮白去

皂角炭

蘿蔔子

右為末神麴糊丸每服六分

薑湯下

千緡湯治風痰壅盛

半夏

七箇湯炮吹去皮

皂角

一寸去皮炒黃

甘草炙一分

右細切作一服入生薑三片水煎温服可加於導痰湯服

治尤妙

方具痰門

蘇子降火湯

治哮喘氣急不能安息

川當歸去蘆

甘草炙

前胡去芦

厚朴去皮薑制各五分

肉桂去皮半

陳皮去白半

紫蘇子二

半夏炒二

右剉每服四錢生薑三片棗一枚水煎七分不拘時服

五虎湯

治哮喘神效

麻黃

石膏

杏仁

細茶

甘草各等分

右劉每服四錢加瓜萸一錢煎服

三拗湯 治氣笑人因服黃芪過多而喘者此湯服之立效

右劉每服五錢薑五片棗二枚水煎服取痰清乃止

一法小胃丹二陳湯加蒼朮黃芩作湯使送下看虛實用之

陰虛痰喘者補其陰火自降四物湯 方見中風加桔梗半夏一方

加陳皮甘草些少

紫金丹 治哮喘 三年後可用

右用精猪肉二觔細切散子大砒一两為細末耳勻分作

六分用紙勑黃泥包之用火烘謝放無人處炭火煨令

青煙盡放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅為丸藜

豆大大人二十九小兒十九茶清下量實與之

喘用阿膠須分虛實若久病發喘必是肺虛用阿膠人參五

味之類補之若新病肺實而發喘者宜桑白皮葶藶子麻

黃杏仁之類瀉之

葶藶大棗瀉肺湯治肺壅脹胸膈滿悶上氣喘急身體面目

浮腫等證

葶藶子不拘多少炒黃為末煉蜜丸如彈子大

右以水三盞大棗十枚煎至二盞去棗入葶藶一九再煎

至一盞溫服

氣實人因服黃芪過多而喘者用三拗湯瀉之

因咳嗽

內經曰咳謂無痰而有聲嗽謂無聲而有痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也治法宜分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血蒸鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

脉法

關上脉微為咳○肺脉微急為咳而唾血○脉緊者為肺寒○脉弦澁而咳為血少○脉浮濡者生脉緊者死○凡肥瘦脫形熱不去咳嘔腹脹且泄脉弦急者皆死證也

方脉

溪曰咳嗽有風寒有火有勞有痰有肺脹

風寒者主發散行痰二陳湯加麻黃杏仁桔梗之類類鼻寒身

重是也宜二陳湯麻黃杏仁桔梗之類

火熱者三拗湯加知母黃芩生薑

勞嗽者主補陰當歸芍藥天門知母貝母桑皮阿膠之屬

主方 出明醫雜著

杏仁 去皮 白茯苓 各一分 橘紅 七分 五味子

桔梗 甘草 各五分

春多上升之氣宜潤肺抑肝加用芍芍藥 各一分 半夏 錢一 麥門

冬炒黃芩知母各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫蘇炒

黃芩麥門冬 各一

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黃芩麥

門冬石膏錢一

秋冬濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮錢一防風黃芩

山梔子各五分

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾薑防風

錢一肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母各五分若發熱頭

痰鼻塞加重再加藁本川芎前胡柴胡各錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星薑汁濕痰脾困少食加

白朮蒼朮有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母水

并貝母黃芩瓜蒌仁

若夏月熱痰或素熱感加黃芩黃連知母石膏

上半日咳者胃中有火加貝母石膏黃連五更咳者同上

黃昏欬者火浮於肺不可止用寒涼藥宜加五味子五倍子

訶子皮欬而降之

若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生薑天門

冬欬冬門馬兜鈴酒芍藥之類肺熱喘咳去人參用沙參

此兼補氣血藥也

若午後咳者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加四物湯并黃

栢知母竹瀝薑汁天門冬瓜蒌仁半夏麩海石青黛黃芩

為末蜜丸噙化仍服前補陰降火湯藥失治則成癆

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒌仁貝母海石青黛半夏

麩軟石膏山查子枳實薑炒黃連為末蜜調噙化

若癆嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白皮亦
於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是肺受熱邪
氣得熱而變為火火盛而陰血不得安寧從火上升故治
宜瀉火滋陰忌用人參黃芪款冬花等藥但此等證不多耳
款血者則宜用人參黃芪款冬花等藥但此等證不多耳
因款而有痰者款為重主治在肺因痰而致款者痰為重主
治在脾但是食積痰痰氣上升以致款嗽只治其痰消其
積而款自止不必用肺藥以治款也

丹溪醫案

何宇亨年四十五歲患咳嗽遇冬則發此乃寒包熱也宜解
表則熱自除治法用

枳殼

桔梗

半夏

陳皮

加麻黃

防風

紫蘇

木通

黃芩

寒嗽甚加杏仁去麻黃黃芩

又一人盛冷嗽膈上多痰二陳湯加

枳殼

黃芩

桔梗

蒼朮

麻黃

木通 薑水煎服

張光顯年四十二歲患肺脹咳嗽或左或右不得眠此痰挾
瘀血礙氣而病降火疎肝以清其痰四物湯加

桃仁

訶子

青皮

竹瀝

周能年五十三歲患痰嗽治以杏仁去皮

蘿蔔子各二兩

右為末粥糊丸服之效

一婦人患積嗽治以

黃芩 黃連 香附 貝母

瓜蒌 年甘草 陳皮 茯苓

白朮 知母 杏仁 桑白皮瀉肺而愈

杜齊能年一十九歲喫麵多遍身痛發熱咳嗽有痰治以

蒼木一錢五分 陳皮一錢 羌活 茯苓

防風 黃芩 川芎 甘草

右作一服姜三片煎半飽時服治嗽大抵多姜以辛散之

又法

治嗽烟筒用鐵管石堆黃欬冬花佛耳草為末以鷄子清刷

紙上捲藥末作筒燒烟以口啣吸烟入喉姜湯送下

好色之人元氣虛弱欬嗽不愈瓊玉膏最捷

肺脹抑遏不得眠者難治

喘嗽遇冬則發者此寒包熱也解表熱自除

枳殼炒 桔梗各一錢 麻黃 防風

甘草 陳皮 紫蘇 木通

黃芩酒炒各五分

如嚴寒去黃芩加杏仁五分

痰嗽無度胃膈痞塞頭疼發熱不拘陰分陽分並可服

茯苓一錢 紫蘇七分 半夏湯炮 陳皮去皮

桔梗炒 甘草各五分 枳殼炒 當歸酒炒五分

川芎五分

芍藥炒

乾葛各五分

杏仁去皮尖

右剉作一服生薑三片棗一枚水煎温服

嗽而失聲潤肺飲

訶子肉

五倍子

五味子酒炒

黃芩各一分

右為細末煉蜜噲化

嗽而有聲有痰

白朮

半夏

五味子

防風

久不愈者粟殼訶膠殊

人參清肺飲

茯苓

陳皮

半夏

甘草

桔梗

五味

知母

貝母

門冬

欵花

黃連

地骨皮

右剉生薑三片棗二枚水煎服

華蓋散治喘嗽

紫蘇子

陳皮

桑皮

赤茯苓

杏仁

麻黃

紫蘇

枳殼

半夏

生薑

右為末生薑三片棗一枚煎七分温服

茯苓丸治性急人愛酒患痰嗽

半夏四兩

茯苓二兩

枳殼炒

風化硝半兩

有鬱痰用白薑蚕杏仁瓜萸仁訶子貝母

導飲丸用吳茱萸製三分 茯苓兩 黃連半兩 滑石七錢 蒼朮用米

浸水 俱用麵糊丸薑湯下

人參欵花膏 治一切咳嗽

人參 欵冬花 五味子 紫苑

右煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼薑湯下噙化亦可

瓊玉膏 治虛勞乾咳嗽一人好酒久嗽不愈者服之效

人參 十二兩 白茯苓 十五兩 沉香 兩半

生地黄 去蘆淨者十觔洗淨銀石器內并細取自然汁大忌鐵器

白砂蜜 五觔煎 拂去沫 琥珀 兩半

曝僊曰今予所製此方加沉香琥珀二味其功效異於世傳之方故錄

右以人參茯苓沉香琥珀俱為細末先將地黃汁與白砂

瓶內綿紙十數層外加竹箬包封紫瓶口入砂鍋內或

銅鍋內以長流水煮沒瓶頸用桑柴文武火煮三晝夜

取出換蠟紙數重包紫瓶口浸沒井中半日以出火毒

提起仍入前鍋內煮半日以出水氣然後收藏每日清

晨及午前後取一二匙用溫酒一盞調服不飲酒人白

湯亦可此法須用不聞雞犬聲處煨煉之及不許孝子

婦見之

治嗽最要分肺虛肺實 肺實用桑白皮杏仁之類瀉之肺虛

東垣曰治嗽必用五味子為君然其外邪者驟用之恐閉住

其邪必先發散之而後用之可也

其邪必先發散之而後用之可也