

王氏增補醫學正傳目錄卷之七

婦人科 經候上

論

脈法

丹溪方法

固經丸

調經散

崩漏有虛熱

加味四物止血方

崩漏因氣所使

婦人病宜用當歸說

帶下是濕熱為病

肥人帶下濕痰方

結痰帶下小胃丹

治白帶二方

帶黃荊子湯



羅先生治帶方

帶下必須斷厚味

一人頭風帶下方

四物湯爲婦人諸疾總司說

東垣治帶主寒

赤白葵花治帶說

調經升陽除濕湯

涼血地黄湯

酒煮當歸丸

固真丸

烏藥湯

助陽湯

丁香膠艾湯

水府丹

黃芪當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

當歸附子湯

調經補真湯

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃芪白朮湯

增味四物湯

補經固真湯

溫胃補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

桃仁散

通經下取方

通經丸

膠艾湯

加減四物湯

元戎和味四物湯

香附一物丸

艾附丸

地黄通經丸

益母丸

苦練丸

丹溪活套

通經秘方

月經不通方

血崩方

婦人科

胎前中

論

附期嗣法

脉法

丹溪方法

固胎飲

安胎飲

安胎丸

又丹溪方法

懷娠嗜物說

胎動說

胎漏方

又治漏方二

胎痛方

心腹諸痛方二

川芎散

妊娠腰痛如折方

又兼脚痛方

胎腫方

惡阻方

半夏茯苓湯

嘔吐鑿按

參橘散

小膠艾湯

又膠艾湯

妊娠下血不止方

下血如月信來方

胎孕無故下血方

胎動冲心煩悶方

因舉動仆跌方

遺尿失禁方

子煩方

子煩犀角散

子煩當歸飲

子煩竹瀝湯

澤瀉散

仲景方法

木通散

白朮散

鯉魚湯

紫蘇飲

天仙藤散

安榮散

地膚子湯

治子淋方

冬葵子散

車前散

忘憂散

葛根湯

防已湯

消風散

天門冬飲

百合散

參朮飲

丹溪轉胞論

安胞散

如聖散

加味四物湯

霹靂奪命丹

無憂散

催生奪命丹

芎歸湯

奪命丹

黑龍丹

胞衣不下方

枳殼散

藥石禁

飲食禁忌篇

臨產須知十九條

難產法

灸難產法

橫倒產方

治橫生方

橫逆不順方

礙產說

兒身向未順說

治盤腸產法

子死腹中方

下死胎牛膝丸

子死腹中不出方

又一方

生子下血過多方

胞衣不下方

丹溪活套

秘方

催生方

胞衣不下三退散

婦人科 產後下

論

脈法

丹溪方法

嚴氏清魂散

愈風湯

新產不可用芍藥

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

乳母小水短少說

產婦損破尿管

黑神散

參歸散

歸芪湯

失笑散

三聖散

抵聖湯

當歸羊肉湯

茯苓散

當歸散

黃芪湯

增損四物湯

四物一黃散

黑龍丹

烏金散

調經散

正脾散

栝子仁散

琥珀散

交感地黃煎丸

七珍散

調中湯

定痛散

麻仁丸

羊肉湯

滋腸五仁丸

固經丸

熟乾地黄散

拒勝湯

八味理中丸

旋覆花湯

四神散

當歸養血丸

猪腎子飲

歸芪飲

當歸散

桃仁膏

硫黃湯

通乳汁方

漏蘆湯

鍾乳散

母猪蹄湯

丹溪活套

王氏增補醫學正傳目錄卷之七

婦人科

論

內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其
傳為風消為息奔者死不治難經曰心出血肝納血
肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火
一起則心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心
事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用
已竭經曰母令子能虛是以脾不磨而食亦少所謂
二陽之病發心脾者此也

二陽者
陽明也

因食少故肺金亦

失所養而氣滯不行則無以滋腎陰况月經全籍腎
水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或後
淋瀝無時若不早治漸而至于閉塞不通甚則爲癥
瘕血膈勞極之証不易治也又如崩漏不止之症先
因心火亢甚于是血脉泛溢以致肝實而不納血出
納之道遂廢經曰子能令母實是以肝腎之相火挾
心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而
泛溢也若不早治漸而至于崩中不息甚則化爲白
濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣經曰邪氣盛
則實正氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火
亢甚者邪氣盛也邪氣者相火也丹溪曰天非此火不能生
物人非此火不能有生但貴乎適中凡動必聽命乎
心君則無以上諸症大抵經閉不行與夫經漏不止
其初皆由心事不足以致月經不調早不調治直至
危篤求醫雖妙手莫能爲矣東垣經閉不行有三論
崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以治之不可
拘泥也

脉法

脉經曰寸口脉微而瀯微則衛氣不足瀯則榮氣無
餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱
虛言語謬妄跌陽脉微而瀯瀯則胃氣虛虛則短
氣咽燥而口苦胃氣瀯則失液少陰脉微而遲微
則無精遲則陰中寒瀯則血不來此爲居經三月
一來

脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不
者此爲居經三月一來

脉微弱而澁年少得此爲無子中年得此爲絕產

寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏跌

陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚澁胃氣衰則身

體腫少陽脉革少陰脉細男子則小便不利婦

人則經水不通經爲血不利則爲水名曰水分

寸口脉沉而數數則爲出沉則爲入出則爲陽實

入則爲陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則

不得息少陰脉沉而滑沉則爲在裏滑則爲實

沉滑相搏血結胞門其臟不瀉經絡不通名曰

血分 經水前斷後病水名曰血分此病難治

王氏增補醫學正傳 卷之八 婦人門 三
先病水後經斷名曰水。分此病易治。

婦人帶下六極之病。脉浮則爲腸鳴腹滿。緊則爲腹中痛。數則爲陰中癢痛。則生瘡。弦則陰戶掣痛。

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治。

婦人寸口脉浮而弱。浮則爲虛弱。則爲血浮。則短氣弱。則有熱而自汗出。

跌陽脉浮而濡。浮則氣滿。濡則有寒。喜噫吞酸。其氣時下小腹則寒。

少陰脉滑而數者。陰中生瘡。

少陰脉數則氣淋。陰中生瘡。

少陰脉弦者。白腸必挺核。

少陰脉浮而動。浮則爲虛動。則爲痛。婦人則脫下。生。

婦人漏下赤白不止。脉小虛滑者。生。大緊實數者。死。

婦人疝瘕積聚。脉弦急者。生。虛弱小者。死。

少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡寒絕產

寒
肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胃上有

婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微不利不汗出者其經二月必來

方法

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱消血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而

而不生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

虛中有熱月事不來以四物湯加黃芩治之

常過期者血少也以芎歸參朮兼淡藥治之

過期紫黑有塊作痛血熱以

四物湯加香附黃連

過期色淡挾痰者以

二陳湯加芎歸

常不及期者血熱也以

四物湯加黃芩黃連香附肥人多兼痰藥治之

血枯經閉者以

四物湯加紅花桃仁

痰多佔住血海地位因而下多者目必漸昏肥人

多有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之

肥人軀肢滿經閉者以

道痰湯加芎歸黃連不可服地黃以泥滯也如

用必以姜汁炒肥人少子亦以痰多脂膜閉塞

子宮不能受精而施化也宜服前藥

瘦人子宮無血精氣不聚亦令無子以

四物湯養血養陰等藥

經水未行臨經將來作疼者血實也一日瘀血鬱

滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄

胡索 莪朮 木香 有熱加柴胡黃芩

經水行後而作疼者氣血俱虛也以八物湯加減

煎服

夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯色淡者氣血虛而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑者熱之甚今人多指為風令而行溫熱之劑禍不旋踵調經散 治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來俱効

川歸

酒洗一錢五分

麥門冬

去心二錢

人參

去蘆一錢

半夏

湯泡七次一錢

白芍藥

一錢

川芎

牡丹皮

去心各一錢

肉桂

五分

阿膠珠

甘草

各七分半

吳茱萸

棟去開目者姜湯泡七次焙乾五分

每服加生姜三片水二盞煎空心稍熱服

月經過期不行宜服

當歸

一錢五分

川芎

五分

桃仁

二十箇去皮尖研

紅花

三分

肉桂

五分

木通

八分

甘草

五分

蘇木

蓬莪朮

香附米 白芍藥 熟地黄 各一錢

每用水一盞半煎空心温服

月經先期而來宜服

當歸身 一錢五分 白芍藥 八分 川芎

阿膠珠 艾葉 甘草

黃栢 知母 各五分 生地黄

條芩 香附 各一錢 黃連 八分姜汁拌炒

每空心服

經不通用馬鞭草杵汁熬膏為丸或燒存性為丸

紅花當歸煎湯送下

固經丸 治經水過多不止

黃芩 龜板 白芍藥 各一兩

樗根白皮 七錢五分 黃栢 炒三錢 香附 童便浸一宿焙乾二錢炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九

白水湯下

崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急則治其標

用白芷湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨

燒存性或五靈脂半生半炒俱以酒調服後以

王印坤補醫學正傳 卷之七
四物湯加乾姜調服之緩則治其本四物湯加
芩連參芪香附乾姜之類

四物湯加荆芥條芩止血神効

崩漏多因氣所使而下香附米末一錢炒黑歸身
白芍藥各一錢酒炒熟地黄一錢川芎黃芪蒲
黃地榆人參各五分白朮一錢升麻三分煎服
甚者加棕櫚灰爲末酒調服

婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用
瘦黑人宜與生地黃香附同用

帶下是濕熱爲病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼
朮治濕熱爲病主氣虛入參朮血虛入芎歸

帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知
此以二陳湯加蒼白朮升麻柴胡甚者上用吐
法以提其氣下用二陳加二朮仍用瓦壘子以
燥其濕痰

肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃栢蒼朮
川芎香附樗皮冬加乾姜瘦人少有此病有者
是熱以滑石樗皮川芎海石青黛丸服

結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以

補藥調治

一方治白帶

樗白皮

山茱萸

苦參

香附

各五錢

龜板

酥炙

梔子

各二兩

黃栢

一兩

乾姜

貝母

各一錢五分

白芍藥

七錢五分

右為細末酒糊丸服

又方

白芷

四兩以石灰半斤澆三宿去灰以白芷炒焦為末清米飲調空心服

又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服上可治

心痛下可治白帶以其能燥濕痰也

羅先生治帶用十棗湯神祐丸玉燭散此法實者可

用虛者不可峻攻

帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應

變用之

一人上有頭風鼻涕下有白帶

用南星

泡

蒼朮

米泔浸

黃芩

酒炒

辛夷川芎黃栢

焦炒滑石半夏牡蠣粉丸服

四物湯乃婦人衆疾之總司也

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

右等分水煎服

東垣治崩漏帶下多主于寒學者宜再思之不可一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

東垣曰葵花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調

或暴崩不止多下水漿之物皆因飲食不節勞倦所傷或素有心氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜臥困倦乏力氣短氣急脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸 酒洗

獨活 各五分

蔓荊子 七分

防風

炙甘草

升麻

藥本 各一錢

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪

各一錢五分

每服水二盞煎去粗空心溫服少時以早飯壓之可一服而已 如灸足大陰脾經中血海穴

三七壯亦已

此藥乃從權之法因風勝為胃

氣下陷而氣迫于下以救其血之暴崩也住後

必須服黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補

之于補氣升陽湯中加血藥便是也若遇夏月

白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯

治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守

胞絡相火故血走而崩也

黃芩

荆芥穗

蔓荊子

各一分五厘

黃栢

知母

藁本

細辛

川芎

黃連

各二分

羌活

柴胡

升麻

防風

生地黃

當歸

各五分

甘草

紅花

少許

每服水三大盞煎去粗空心稍熱服

酒煮當歸丸

治癩疔白帶下疰脚氣腰以下如在

蒼朮

黃芪 各一錢五分

每服水二盞煎去粗空心溫服少時以早飯壓之可一服而已 如炙足大陰脾經中血海穴

三七壯亦已 此藥乃從權之法因風勝為胃

氣下陷而氣迫于下以救其血之暴崩也住後

必須服黃芪人參炙甘草當歸之類數服以補

之于補氣升陽湯中加血藥便是也若遇夏月

白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止

涼血地黃湯 治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守

胞絡相火故血走而崩也

黃芩 荆芥穗 蔓荊子 各一分五厘

黃栢 知母 藁本

細辛 川芎 黃連

羌活 柴胡 升麻

防風 各三分 生地黃 當歸 各五分

甘草 一錢 紅花 少許

每服水三大盞煎去粗空心稍熱服

酒煮當歸丸 治癩疔白帶下疰脚氣腰以下如在

水雪中居火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小便
與白帶長流而不禁固面白目青目眈眈無所見
身重如山行步欹側腿膝枯細大便閉澁心下痞
悶懊懷食不下面垢背寒此上中下三陽俱虛脉
沉緊而澁按之空虛洪而無力充爲中寒之証乃
氣血俱虛之極也

茴香

五錢

黑附子

炮

良姜

各七錢

當歸

一兩

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草

苦楝

生用

丁香

各五分

木香

升麻

各一錢

柴胡

炒黃鹽

全蝎

各三錢

玄胡索

四錢

與前四味同研爲細末酒煮麩糊爲丸如梧桐
子大每服五七十丸空心淡醋湯送下忌油膩
冷物及酒濕麪等

固真丸

治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦冷目

中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕
乘於胞內肝經陰火上熱故目中溜火其惡熱飲

者陽明經中伏火也法當大瀉寒濕以此丸治之

黃栢 酒洗 白芍藥 各五分 柴胡

白石脂 各一錢火煨研為末 當歸 酒洗一錢

乾姜 四錢泡 白龍骨 酒煮水飛晒乾為末一錢

右除龍骨石脂水飛晒乾另研外餘共為細末

麩糊為丸如鷄頭仁大晒乾空心白湯下少時

以早飯壓之是不令熱藥犯冒也忌生冷硬物

酒濕麩

烏藥湯 治婦人血海疼痛

當歸 一錢 甘草 木香 各五分

烏藥 一錢五分 香附子 二錢

每服水二盞煎食前溫服

助陽湯 治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮

緩身重如山陰寒如水

生黃芩 橘紅 各五分 防風

高良姜 乾姜 郁李仁

甘草 各一錢 柴胡 一錢三分 白葵花 五朵

分作二服水二盞煎去粗食前稍熱服

下香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲

食不節所得其脉兩尺俱弦緊而按之無力自覺

臍下如冰冷白帶及白滑之物多間有如屋漏水

下時或有鮮血右尺脉時或浮洪

熟地黄

白芍藥

各三分

川芎

四分

當歸

一錢二分

丁香

四分

阿膠珠

六分

生艾葉 一錢

右以川芎地黄丁香另為細末其當歸芍藥艾

葉各細切連前共六味入水五大盞煎去粗入

阿膠再上火煎稍熱空心服

水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹

中暴痛面有黧黯黎黑羸瘦

礪砂

隔紙沸湯
淋熬取

紅豆

已上各
五錢

桂心

另為
末

木香

乾姜

各一
兩

砂仁

二兩

花蕊石

煨研一
兩五錢

班貓

一百箇
去頭足

生地黄汁

童子尿

各一
升

臘月狗膽

七枚

元靖

三百箇去頭足
米同炒黑色去米

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如鷄頭實

大硃砂為衣每服一丸食前細嚼温酒送下米飲亦可

黃芪當歸人參湯 治婦人經水暴崩不止先因損

身失血自後一次縮十日而來其後暴崩不止蓋

因其人心窄性急多驚而心氣不足及飲食不節

得之診得掌中寒脉沉細而緩帶數九竅不利四

肢無力上喘氣促口鼻氣不調脾胃虛弱胃皖當

心而痛左脇縮急當臍有動氣腹鳴下氣大便難

宜先治其本餘証可去安心定志和脾胃益元氣

補血養神以大熱劑去其寒少加生地黄去命門

相火不令四肢痿弱

黃連 二分

生地黄 二分

炒神麴

橘紅

桂枝 各五分

草薺寇 八分

黃芪

人參

麻黃 不去節 各一錢

當歸身

一錢五分

杏仁

五枚另研如泥

右作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去沫煎

至二盞下諸藥同煎至一盞食前服立止又以

草薺寇丸十五粒以止胃皖客寒之痛再與消

積之藥除其病根

當歸芍藥湯 治婦人經水漏下不止其色鮮紅時
值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止
身熱悶亂不思飲食四肢困倦大便時泄後復因
心氣不足經水暴下不止微覺氣下行懶于言語
此藥主之

柴胡 二分

炙甘草

生地黄 各三分

黃芪

陳皮 連白

熟地黄 各五分

蒼朮 米泔浸

白朮

川歸

白芍藥 各一錢五分

右作一服水二盞煎空心溫服

柴胡調經湯

治經水不止其色鮮紅項筋急腦痛

脊骨強痛不安

炙甘草

當歸身

葛根 各三分

獨活

藁本

升麻 各五分

柴胡 七分

羌活

蒼朮 各一錢

紅花 少許

每服水二盞煎空心溫服取微汗立止

益胃升陽湯

治婦人經候凝結黑血成塊左廂有

血癥水泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄

俱作是前後二陰有形血脫竭于下既久經候猶

不調水泄日三四行食罷煩心飲食減少人形瘦

弱血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發

之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務蓋甘能生

血陽生陰長之理也人身以穀氣為寶故先理胃

氣為要

柴胡

升麻

各五分

炙甘草

當歸身

酒洗

陳皮

各一錢

人參

有熱不用

炒神麴

各二錢

黃芪

一錢五分

白朮

二錢

生黃芩

二分

右細切作一服水二大盞煎去粗熱服如腹

中痛加白芍藥三分中桂少許如渴或口乾

加葛根三分不拘時服

升陽舉經湯

治經水不止右尺脉按之空虛是氣

血俱脫大寒之証輕手其脉數疾舉指弦緊或澁

皆陽脫之証陰火亦亡見熱証于口鼻眼或渴此

皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之
此法乃大升浮血氣補命門之下脫

肉桂

夏月不用

白芍藥

各二分

紅花

五厘

細辛

三分

人參

熟地黃

川芎

各半分

獨活根

黑附子炮

炙甘草

各七分五厘

羌活

藁本

防風

各一錢

白朮

當歸

黃芪

柴胡

各一錢二分

桃仁泥

少許

右分作二服每服用水二大盞煎空心熱服

當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下

當歸

四分

炒塩

三分

蝎稍

升麻

各五分

甘草

炙六分

柴胡

七分

黃栢

附子

炮

乾姜

炮

良姜

各三分

每服水三盞煎去粗稍熱服或為細末酒麪糊

為丸亦可

調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶下陰

戶中寒一服立止

獨活 乾姜炮 藁本

防風 蒼木各二兩 麻黃節不去

炙甘草 人參去 當歸身

白朮 生黃芩 升麻各五分

黃芪七分 良姜 澤瀉

羌活各一錢 柴胡四分 杏仁二枚研

桂枝少許 白葵花七朶去萼

右作一服除黃芩麻黃另外先以水三盞煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入

生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

朱胡丁香湯 治婦人年三十歲左右行經先腰膈

痛甚則腹中亦痛經縮三二日

生地黄五分 丁香 當歸身

防風 羌活各一錢 柴胡二分

全蝎一枚

每服水二盞煎去粗食前稍熱服之

延胡苦棟湯 治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃栢 一分

延胡索

苦楝子 各二分

附子

肉桂 各三分

炙甘草 五分

熟地黄 一錢

每服水二盞煎食前溫服

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒証

黃栢 為引

知母 各五分

肉桂 五分

附子 炮三錢

右作一服水二盞煎空心溫服 如少食即飽

腹中滿悶加白芍藥五分 如不思飲食加五

味子二十箇 如煩惱面上如虫行乃胃中元

氣極虛加黃芪一錢五分人參七分炙甘草升

麻各五分

人參補氣湯 治四肢懶倦白汗無力

丁香末 二分

生甘草

炙甘草 各三分

生地黄

白芍藥 各五分

熟地黄 六分

人參 去蘆

防風 去蘆

羌活

黃栢

知母

當歸身

升麻 各七分

柴胡 一錢

黃芪 一錢五分

全蝎 一箇
五味子 二十箇

每服水二大盞煎空心稍熱服

黃芪白朮湯 治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡

風頭痛躁熱

細辛 二分
吳茱萸
川芎 各三分

柴胡
升麻 各四分
歸身 六分

黃栢 酒炒
炙甘草
羌活 各八分

五味子 一錢
白朮
人參 各一錢五分

黃芪 二錢五分

每服水二大盞生姜五片煎去粗食前稍熱服

增味四物湯 治婦人血積血瘕

當歸
川芎
白芍藥

熟地黃
京三稜
乾漆 炒烟盡 另研

肉桂 去粗皮
廣茂 各等分

每服五錢水二大盞煎去粗空心溫服

補經固真湯 治婦人白帶下流不止其心胞尺脉

微細蓋始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之

物下流不止所謂崩中日久為白帶也乃本經血

海枯竭津液復亡不能榮養筋骨以本部行經藥
為引用以大辛甘油膩之藥潤乾枯而滋津液以
大辛熱之藥補其陽道生其血脈以苦寒之藥泄
其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥
為佐而益元氣

白葵花

研爛四分

陳皮

不去白五分

生黃芩

細研另入

郁李仁

去皮炙研如泥

炙甘草

柴胡

各二錢

乾姜

細末五分

人參

二錢

右除黃芩外以水三盞煎入黃芩同煎去粗空

心熱服少時以早飯壓之

溫胃補血湯

治嬾人耳鳴鼻不聞香臭口不知穀

味胃氣不快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下
膝冷陰汗帶下喉中吟吟不得臥口燥咽乾大息
頭不可以回顧項筋緊急脊骨強痛頭旋眼黑頭
痛嘔噎

生地黃

白朮

藿香

黃栢

各二分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

陳皮

吳茱萸

各三分

當歸身

四分

柴胡

人參

炙甘草

地骨皮

各五分

升麻

生甘草

各六分

黃芪

一錢

丁香

一個

棗仁

三個

白葵花

五朵

每服水二大盞煎食前熱服

立効散

治嬾人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

已上各一兩

右剉如豆大紙包裹泥固火煨存性爲細末每

服三錢

如乾血氣研血竭爲引溫酒調服或

加輕粉五分

如血崩甚不止加射香爲引溫

酒調服

四聖散

治婦人赤白帶下

川烏

生白礬

各一錢

紅娘子

三個

班貓

十個

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大綿裹塞陰戶中

溫經除濕湯

治嬾人值冬月四肢無力乃痿厥濕

熱在下焦也醋心者是濁氣不下降欲爲中滿也

合眼麻木作者陽道不行也惡風寒者上焦之分
皮膚中氣不行也開目不閉者陽道少行而陰寒
之氣漸退也頭旋目眩者風氣下陷于血分不得
伸越而作也近火則有之

黃連 二分

柴胡

草豆蔻

神麴 炒

木香 各三分

麻黃 不去節

獨活

當歸身

黃栢

升麻

羌活 各五分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉 各七分

黃芪

陳皮

蒼朮 各一錢

白芍藥 一錢五分

每服水二大盞煎食遠服治肢節疼痛無力之
聖藥也

桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不止止後復來
狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅動不可行動月
水或前或後或經月不來身體沉重惟欲眠臥多
思酸物

桃仁 去皮尖炒另研

甘草 炙

半夏 各二分

赤芍藥

生地黄

各一錢

澤蘭葉

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎 各七分

右作一服加生姜三片水二盞煎空心服

通經下取方曾經試驗神効

海蛤粉 五錢

苦亭蘆

牙皂 各二錢五分

巴豆 畧去油

天花粉

苦丁香

紅娘子 各一錢五分

麝香 少許

右爲細末每用一錢芫涎同搗爲丸薄綿裹以五寸竹管納陰戶中候執時先通黃水次則經行矣

通經丸 治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

桂心

青皮

大黃 酒浸紙包煨

川椒

莪朮

乾姜

川烏 炮去皮

乾漆 碎炒烟盡

當歸

桃仁 去皮尖麩炒研如泥各等分

右爲細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥

末成劑日中杵汁勻丸如梧桐子大每服二十丸空心淡醋湯下漸加至三四十九溫酒亦可下性畏漆者入鷄子清和藥內

膠艾湯 治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止

止

阿膠

炒成珠

川芎

甘草

炙各五分

當歸

艾葉

各七分五厘

熟地黄

白芍藥

各一錢

每服水一盞半煎溫服 一方加地榆 黃芪

加減四物湯

治經候微少漸致不通手足煩疼瘦

形潮熱脉息微數

本方去地黄川芎加澤蘭葉三倍甘草半分如

經候過多本方去熟地黄加生地黃如經行身

熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩如經行微少或

脹或痢四肢疼痛本方加延胡索沒藥白芷共

為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疴痛只

用芎歸二味煎服名君臣散以歸倍于芎也

元戎加味四物湯 因氣衝經脉故月事頻併臍下

多痛本方加白芍藥 如經欲行臍腹疔痛本方
加玄胡苦棟棋榔木香 如經水過多本方加黃
芩白朮 如經水澁少本方加葵花紅花 如經
水適來適斷或往來寒熱宜先服小柴胡湯以去
寒熱然後以四物湯和之或以二方并服名柴胡
四物湯

香附一物丸 治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭
眩惡心崩漏帶下並宜治之

香附子

并去皮毛不拘多少米醋浸
一日夜用瓦銚煮令熟焙乾

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大日乾每服五
十丸淡醋湯下

艾附丸 治證如前

香附子

一斤
醋煮

艾葉

四兩

當歸 二兩

右爲細末醋糊爲丸服

地黃通經丸 治婦人經候不行結成血瘕在臍下
如覆杯

熟地黃

三兩

蜚虫

去翅
足炒

水蛭

糯米同
炒去米

桃仁

各五
十箇

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九
空心溫酒下未止加至七八十九

益母丸 治婦人赤白帶惡露時下不止及胎前產
後經中諸般奇病無所不療

益母草 一名茺蔚子紫花方莖俗名野天麻五月採陰乾

右為細末勿犯鐵器煉蜜為丸如彈子大每服
一丸用熱酒加童便化下 兼氣者木香湯化
下或只為末子每服二錢或酒或童便調下此
婦人之仙藥也

煉丸 治赤白帶下最妙

苦棟

茴香

當歸 各等分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九
空心溫酒送下

丹溪活套

凡婦人經候不調皆當以四物湯為主治

如經候過如腹中作痛綿綿無休息者屬血虛

本方倍當歸熟地黃兼氣虛者本方加入參黃

芪挾寒者加乾姜 如經候將來腹中陣陣痛

乍作乍止者血氣實也本方用生地黄加黃連
香附桃仁紅花玄胡索牡丹皮之類 如經水

常不及期而行者血熱也本方用生地加黃連
黃芩白芷之類 如經水常過期而來者瘦人

多應是血少本方倍當歸熟地黃加黃芪甘草
少佐以紅花桃仁泥以爲生血之引用也 肥

人大槩是氣虛挾痰阻滯升降然也本方去地
黃加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附等藥 常

過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛本方用

生地黄加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥
之類 過期而血淡色者痰多血少也本方用

生地黄合二陳湯煎服 肥盛婦人或三二箇
月一行者痰盛而軀脂閉塞經脈以導痰湯加

芎歸香附蒼白朮之類 如經水適來適斷往
來寒熱如瘧者本方合小柴胡煎服 如經行

過三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣未
盡行也本方加木香枳榔煎服立愈

祖傳經驗秘方 治婦人室女月經不通漸成脹滿

婦人科

及治男子墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血

蠱病者皆治之名曰桃奴飲子

桃奴 桃樹上嫩桃乾朽不落者冬月及正月收 玄胡索 肉桂

香附米 五靈脂 各一錢炒 砂仁 桃仁 去皮尖研

獾鼠糞 節雄鼠糞也兩頭尖者是一錢

右各等分為細末服三錢空心温酒調下

一方治月經不通只鼠糞一合略炒研細温酒下

又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調

服立止或調入四物湯中亦効