



康治本傷寒論

貳 9
560
11



武中門
第 360
卷



康治本傷寒論序

余平生喜聚古書苟聞有
藏之者必求而觀焉惟年越後人
某示影鈔康治年間沙門了純
寫傷寒論一卷開闔數回不能
私自問其原本則云藏同鄉某處



余欲之而口不敢言到今寔然心目
笑一日抵河戶上玄斐來謁亦出示
一卷蓋其友河口玄龍騰徑與
而玄斐以宋板對校者也然則與
人所蒞轉歸越人手而余曾觀其
影鈔吁亦可謂奇矣抑玄斐之

苦心篤志實可嘉也曰恣憑壽
諸梨棗而他日余亦或得越人影
鈔而梓之与此并行焉則豈不亦
一大快事乎乃為弁其由於毫端

嘉永二年春王正月

中務少輔丹波賴易

池内奉時填
諱

先考既作此序未及淨書而易篋
矣玄斐曰請余代書援筆不堪
風木之歎也

丙辰嘉平月 丹波賴德識



刻康治本傷寒論叙

余嘗遊北筑與唐津人河口春龍相善
乙己春余將東遊。道過肥會其不在
焉。其明年邂逅於京師。驩如舊日矣。示
一小冊於余曰。此書比叡山所藏。奧之
醫生得之武州永源寺僧。吾學于東武。

與其人驩。固請得見。因寫藏之。原本唐貞元乙酉所寫。相傳昔者叡山僧入唐。謄寫以歸。康治二年癸亥。沙門了純再寫焉。卷末所錄。可參徵也。唯卷中作圈及二四八六十四等字。不知何故。余受讀之者再三。較諸宋板成本及近世坊本。

所載方。僅五十首。如其闕文。是固無論。以余臆之。此書或別有所流傳。而未經叔和氏之撰次者歟。蓋李唐距西晉三百餘年。互相傳寫。固當有別本。且前輩所疑而闕如者。此書概不載。以為古之遺文。亦不誣也。自貞元至康熙。三百

康治本例身語序
餘年。自康治至于今。七百餘年。既經千載之久。彼之所逸。而獨巋然存乎。

本邦者。謂之靈祇所護。誰曰不然。豈非國家文明之化。施及方技者邪。覽者不以余言之固陋棄之。則幸甚。

嘉永改元春三月望

柳河鑿官 戶上重較玄斐謹撰



凡例

一此書在卷末蠹毀者似乙字。按唐書德宗貞元二十一年乙酉崩。而順宗即位。其八月改元永貞也。一唐貞元二十一年。當我延曆二十四年。至康治二年。三百三十九年。自康治二年。至嘉永紀元七百五年。合計之。則千四十四年也。

一此書較宋板成本及近世坊本。僅什一也。其前後次第。亦頗不同。蠹毀誤脫。不敢補之。所以存舊也。一此書所載方。通計五十首。而原本不舉其目次。今

錄之以備辨覽耳。

一此書原題曰傷寒論。然宋板及其它類本甚多。而近世所行小刻本。獨以傷寒論稱焉。因冠以康治本三字。而別小刻而已。

一世所傳傷寒論。宋板最古。故標註引宋板。以辨異同。抑以余之淺學疎鹵。恐多誤謬。覽者恕焉。

戶上重較又識

黃苓方目次

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去桂枝加白朮茯苓湯

甘草乾姜湯

芍藥甘草湯

葛根湯

葛根加半夏湯

麻黃湯

青龍湯

乾姜附子湯

麻黃甘草杏仁石膏湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓桂枝甘草白朮湯

茯苓四逆湯

芍藥甘草附子湯

調胃承氣湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生姜豉湯

小柴胡湯

建中湯

大柴胡湯

桃仁承氣湯

陷胸湯

柴胡桂枝乾姜湯

半夏瀉心湯

十棗湯

生姜瀉心湯

甘草瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生姜湯

白虎湯

白虎加人蔘湯

大承氣湯

茵陳蒿湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥大黃湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

吳茱萸湯

甘草湯

白通湯

真武湯

通脈四逆湯

豬苓湯

四逆湯

通計五十方

傷寒論	卷之
辨六經病	第一
辨太陽病	第二
辨陽明病	第三
辨少陽病	第四
辨太陰病	第五
辨少陰病	第六
辨厥陰病	第七
辨傷寒	第八
辨傷風	第九
辨傷寒與傷風	第十
辨傷寒與傷風	第十一
辨傷寒與傷風	第十二
辨傷寒與傷風	第十三
辨傷寒與傷風	第十四
辨傷寒與傷風	第十五
辨傷寒與傷風	第十六
辨傷寒與傷風	第十七
辨傷寒與傷風	第十八
辨傷寒與傷風	第十九
辨傷寒與傷風	第二十
辨傷寒與傷風	第二十一
辨傷寒與傷風	第二十二
辨傷寒與傷風	第二十三
辨傷寒與傷風	第二十四
辨傷寒與傷風	第二十五
辨傷寒與傷風	第二十六
辨傷寒與傷風	第二十七
辨傷寒與傷風	第二十八
辨傷寒與傷風	第二十九
辨傷寒與傷風	第三十
辨傷寒與傷風	第三十一
辨傷寒與傷風	第三十二
辨傷寒與傷風	第三十三
辨傷寒與傷風	第三十四
辨傷寒與傷風	第三十五
辨傷寒與傷風	第三十六
辨傷寒與傷風	第三十七
辨傷寒與傷風	第三十八
辨傷寒與傷風	第三十九
辨傷寒與傷風	第四十
辨傷寒與傷風	第四十一
辨傷寒與傷風	第四十二
辨傷寒與傷風	第四十三
辨傷寒與傷風	第四十四
辨傷寒與傷風	第四十五
辨傷寒與傷風	第四十六
辨傷寒與傷風	第四十七
辨傷寒與傷風	第四十八
辨傷寒與傷風	第四十九
辨傷寒與傷風	第五十
辨傷寒與傷風	第五十一
辨傷寒與傷風	第五十二
辨傷寒與傷風	第五十三
辨傷寒與傷風	第五十四
辨傷寒與傷風	第五十五
辨傷寒與傷風	第五十六
辨傷寒與傷風	第五十七
辨傷寒與傷風	第五十八
辨傷寒與傷風	第五十九
辨傷寒與傷風	第六十
辨傷寒與傷風	第六十一
辨傷寒與傷風	第六十二
辨傷寒與傷風	第六十三
辨傷寒與傷風	第六十四
辨傷寒與傷風	第六十五
辨傷寒與傷風	第六十六
辨傷寒與傷風	第六十七
辨傷寒與傷風	第六十八
辨傷寒與傷風	第六十九
辨傷寒與傷風	第七十
辨傷寒與傷風	第七十一
辨傷寒與傷風	第七十二
辨傷寒與傷風	第七十三
辨傷寒與傷風	第七十四
辨傷寒與傷風	第七十五
辨傷寒與傷風	第七十六
辨傷寒與傷風	第七十七
辨傷寒與傷風	第七十八
辨傷寒與傷風	第七十九
辨傷寒與傷風	第八十
辨傷寒與傷風	第八十一
辨傷寒與傷風	第八十二
辨傷寒與傷風	第八十三
辨傷寒與傷風	第八十四
辨傷寒與傷風	第八十五
辨傷寒與傷風	第八十六
辨傷寒與傷風	第八十七
辨傷寒與傷風	第八十八
辨傷寒與傷風	第八十九
辨傷寒與傷風	第九十
辨傷寒與傷風	第九十一
辨傷寒與傷風	第九十二
辨傷寒與傷風	第九十三
辨傷寒與傷風	第九十四
辨傷寒與傷風	第九十五
辨傷寒與傷風	第九十六
辨傷寒與傷風	第九十七
辨傷寒與傷風	第九十八
辨傷寒與傷風	第九十九
辨傷寒與傷風	第一百

康治本傷寒論標註
柳河 戶上重較識

宋板作名為傷寒

傷寒論

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒
 太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風
 太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛
 嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒
 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰
 弱者汗自出嗇々惡寒淅々惡風翁々發

康治本傷寒論

熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

桂枝三兩去皮芍藥三兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘右五味咀

三味以水七升微火煮取三升去滓適寒

温服一升

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主

之

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝

加葛根湯主之

按宋板無三味字恐衍

宋板服一升下有服已須更飲
熱稀粥一升餘以助藥力温覆
令一時許遍身熱々微似有汗
者益佳不可令如水流離病必
不除若一服汗出病差停後服
不必盡劑若不汗更服依前法
又不汗後服小促其間半日許
令三服盡若病重者一日一夜
服周時視之服一劑盡病證猶
在者更作服若汗不出乃服至

二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛
酒酪臭惡等物百三十一字

按宋板有麻黃三兩去節六字
恐衍且作桂枝芍藥各二兩右
六味云云亦作右七味以水一
斗先煮麻黃葛根云云温服一
升下有覆取微似汗不須啜粥
餘如桂枝法將息及禁忌十九
字

宋板作甘草三兩

桂枝三兩去皮芍藥三兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘葛根四兩右

六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓温服一升

太陽病發熱遂漏不止其人惡風小便難

四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主

之

桂枝三兩去皮芍藥三兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘附子一枚炮去

宋板温服一升下有本云桂枝湯今加附子將息如前法十四字

皮破八片 右六味以水七升煮取三升

太泮温服一升 太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝三兩去皮甘草二兩炙生姜三兩切 大棗十二枚擘 右四味以水七升煮取

三升去滓温服一升 服桂枝湯或下之後仍頭項強痛翕發熱

無汗心下滿微 小便不利者桂枝去桂

宋板温服一升下有本云桂枝湯今去芍藥將息如前法十四字 宋板下之下無後字 按宋板及諸本皆作翕々發熱此書恐似脫一字

按宋板及諸本皆作桂枝去桂加茯苓白朮湯

枝加白朮茯苓湯主之 芍藥三兩甘草二兩炙生姜三兩切大棗

十二枚擘白朮三兩茯苓三兩 右六味 以水七升煮取三升去滓温服一升

服桂枝湯不汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加人蔘湯主之

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚 攣急反服桂枝湯得之便厥咽中乾煩躁 吐逆者與甘草干姜湯以復其陽若厥愈

宋板作傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚凌急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足温者更作芍藥甘草湯與之其

按宋板作大汗出人蔘亦作人參且載劑及煎法

宋板作水八升温服一升下有 小便利則愈本云桂枝湯今本 桂枝加茯苓白朮十九字

脚卽伸若胃氣不和讖語者少
與調胃承氣湯若重發汗復加
燒針者四逆湯主之

宋板作乾薑二兩二合作五合

按宋板作白芍藥甘草各四兩
灸五升作三升三服作再服其
下有調胃承氣湯方及煎法三十
一字
宋板惡風下無者字

者與芍藥甘草湯以其脚伸若胃氣不和
讖語者與調胃承氣湯若重發汗者四逆
湯主之

甘草四兩灸乾姜三兩 右二味以水三

升煮取一升二合太滓分温再服

芍藥三兩甘草三兩灸 右二味以水五

升煮取一升五合太滓分温三服

太陽病項背強几々無汗惡風者葛根湯

主之

宋板温服一升下有覆取微似
汗餘如桂枝法將息及禁忌諸
湯皆做此二十字

葛根四兩麻黃三兩太節桂枝二兩太皮
芍藥二兩甘草二兩灸生姜三兩切大棗
十二枚擘 右七味以水一斗先煮葛根
麻黃減二升太白沫內諸藥煮取三升太
滓温服一升

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主
之
太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加
半復湯主之

宋板作生薑二兩切

宋板温服一升下有覆取微似汗五字

宋板作甘草一兩

葛根四兩麻黃三兩去節桂枝二兩去皮
芍藥二兩甘草二兩炙大棗十二枚擘生
姜三兩半復半外洗 右八味以水一斗
先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮
取三升去滓温服一升

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡
風無汗而喘者麻黃湯主之

麻黃三兩去節桂枝二兩去皮甘草二兩
炙杏仁七十箇去皮尖 右四味以水九

宋板温服八合下有覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息十六字

宋板作大青龍湯主之下有若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也二十六字

宋板作杏仁四十枚大棗十枚

宋板温服一升下有取微似汗汗出多者温粉撲之一服汗者停後服若後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也三十六字

外先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取
二升半去滓温服八合

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗
出而煩躁者青龍湯主之

麻黃六兩去節桂枝二兩去皮甘草二兩
炙杏仁四十箇去皮尖生薑三兩切大棗
十二枚擘石膏如鷄子大碎 右七味以
水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓温服一升

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者青龍湯發之

按宋板作下之後復發汗云云且不渴下有無表證三字

發汗若下之後晝日煩躁不得眠夜而安

靜不嘔不渴脉沉微身無大熱者乾姜附

子湯主之

按宋板作乾薑一兩破亦作切

乾姜一兩半附子一枚生用去皮破八片

宋板作者取一升去滓頓服

右二味以水三升煮取一升二合分溫服

按溫服之服恐衍

再服

宋板發汗後下有不可更行桂枝湯七字無大熱者下作可與

發汗後汗出而喘無大熱者麻黃甘草杏

麻黃杏仁甘草石膏湯

仁石膏湯主之

按宋板麻黃四兩去節下有杏仁五十箇去皮尖八字此書蓋似脫

麻黃四兩去節甘草二兩炙石膏半斤碎

宋板作右四味以水七升煮麻黃減二升溫服一升下有本云黃耳極五字

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上

按宋板發汗後下有其人二字臍下悸下有者字而奔豚下無者字

沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

按宋板發汗後下有其人二字臍下悸下有者字而奔豚下無者字

發汗後臍下悸欲作奔豚者茯苓桂枝甘

草大棗湯主之

宋板作桂枝四兩

茯苓半斤桂枝三兩去皮甘草二兩炙大

宋板溫服一升下有日三服三字其下有作甘爛水法取水二

棗十五枚擘 右四味以甘爛水一斗先

斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六十顆相逐取用之三

煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫

十一字

宋板作傷寒若吐若下後頭眩下有脉沉緊發汗則動經身為振々搖十三字

服一升

發汗若下之後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩者茯苓桂枝甘草白朮湯主之

按宋板作水六升温服一升亦作分温三服

茯苓四兩桂枝三兩去皮甘草二兩炙白朮二兩 右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升

按宋板發汗若下之下無後字而有病仍不解四字

發汗若下之後煩躁者茯苓四逆湯主之

宋板作人參一兩

茯苓四兩甘草二兩炙乾姜一兩半附子一枚生用去皮破八片人參二兩 右五

宋板作以水五升煮取三升去滓温服七合日二服

味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

宋板作發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

發汗若下之後反惡寒者虛也芍藥甘草附子湯主之但熱者實也與調胃承氣湯

宋板分温三服下有疑非仲景方五字大黃四兩下有去皮清三字

芍藥三兩甘草三兩炙附子一枚炮去皮破八片 右三味以水五升煮取一升五合去滓分温三服 大黃四兩酒洗甘草二兩炙芒消半升 右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更煮兩沸頓服

宋板作發汗後水藥不得入口
為逆若更發汗必吐下不止發
汗吐下後虛煩不得眠若劇者
云云

宋板溫進一服下有得吐者止
後服六字

宋板甘草二兩下有炙字

宋板得字作取

發汗若下之後虛煩不得眠若實劇者必
反覆顛倒心中懊懣梔子豉湯主之若少
氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生
姜豉湯主之

梔子十四箇擘香豉四合綿裹 右二味
以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取
一升半太滓分為二服溫進一服 梔子
十四箇擘甘草二兩香豉四合綿裹 右
三味以水四升先煮梔子甘草得二升半

宋板溫進一服下有得吐者止
後服六字

宋板得作取

宋板溫進一服下有得吐者止
後服六服

按汗出後字宋板作汗出不解

宋板無脉沉緊三字

宋板真武湯主之下載方及煎
法

宋板傷寒下有五六日三字

內豉煮取一升半太滓分為二服溫進一
服 梔子十四箇擘生姜五兩香豉四合
綿裹 右三味以水四升先煮梔子生姜
得二升半內豉煮取一升半太滓分為二
服溫進一服

太陽病發汗汗出後其人仍熱心下悸
頭眩身憊動振々欲擗地脉沉緊者真武
湯主之

傷寒中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲

飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或
腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利
或不渴身有微熱或咳者小柴胡湯主之
柴胡半斤黃芩三兩半夏半升洗生姜三
兩切人蔘三兩甘草三兩炙大棗十二枚
擘 右七味以水一斗二升煮取六升太
滓再煎取三升溫服一升日三服
傷寒身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而
渴者小柴胡湯主之

宋板切作洗

宋板日三服下有若胸中煩而
不嘔者云云百二十二字
宋板傷寒下有四五日三字

按宋板作小建中湯愈亦作差

宋板作更上微火消解溫服一
升下有日三服嘔家不可用建
中湯以甜故也十五字

宋板傷寒下有二三日三字

宋板作太陽病過經十餘日反
二三下之後四五日柴胡證仍
在者先與小柴胡嘔不止心下
急鬱鬱微煩者為未解也與大

傷寒陽脉潛陰脉弦法當腹中急痛先與

建中湯不愈者小柴胡湯主之

桂枝三兩去皮芍藥六兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘膠飴一升 右

六味以水七升煮取三升太滓內飴更上

微火消盡溫服一升

傷寒心中悸而煩者建中湯主之

太陽病反二三下之後嘔不止心下急鬱

鬱微煩者大柴胡湯主之

柴胡湯下之則愈

宋板半复半并下有洗字生薑五兩下有切字此似脫文

宋板日三服下有一方加大黃二兩若不加恐不為大柴胡湯十七字

宋板太陽病下有不解二字下者愈下有其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者乃可攻之二十七字

宋板作宜挑核承氣湯
宋板大黃四兩下無酒洗二字
芒硝二合亦作二兩

康治本傷寒論

柴胡半斤黃芩三兩半复半并生薑五兩

芍藥三兩枳實四枚炙大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

太陽病熱結膀胱其人如狂血自下下者愈但少腹急結者與桃仁承氣湯

桃仁五十箇去尖大黃四兩酒洗甘草

二兩炙芒硝二合桂枝二兩去皮 右五

味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更

宋板作更上火微沸下火先食温服五合日三服當微利

宋板作傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石硬者大陷胃湯主之

按此方在宋板屬太陽病脉浮而動數條而作大黃六兩去皮甘遂一錢七且温服一升下有得快利止後服六字

宋板作太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胃湯主之

上微火一兩沸温服五合

傷寒結胃熱實脉沉緊心下痛按之石硬

者陷胃湯之

大黃六兩酒洗芒硝一升甘遂一兩末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓

內芒硝煮一兩沸內甘遂末温服一升

太陽病發汗而復下之後舌上燥渴日晡所有潮熱從心下至小腹鞭滿痛不可近

者陷胃湯主之

康治本傷寒論

宋板傷寒下有五六日已四字復下之下無後字

宋板者字下有此為未解也五字

宋板作括樓根四兩乾薑二兩

宋板日三服下有初服微煩復服汗出便愈十字

宋板作傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振

傷寒發汗而復下之後胃腸滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者柴胡桂枝干姜湯主之

柴胡半斤黃芩三兩牡蠣二兩熬括樓根三兩桂枝三兩去皮甘草二兩炙乾姜一兩右七味以水一斗二升煮取六升太滓再煎取三升溫服一升日三服

太陽病發汗而復下之後心下滿鞭痛者為結胃但滿而不痛者為痞半夏瀉心湯

却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯

主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

宋板作黃連一兩

宋板日三服下有須大陷胸湯者方用前第二法十二字

宋板下利嘔逆下有表解者乃可攻之其人熱々汗出十三字

宋板表解上有此字

宋板無大棗十枚擘五字芫花甘遂大戟下無末字

主之

半夏半升洗黃連三兩黃芩三兩人蔞三兩乾姜三兩甘草三兩炙大棗十二枚擘右七味以水一斗煮取六升太滓再煎取三升溫服一升日三服

太陽中風下利嘔逆發作有時頭痛心下痞鞭滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之

大棗十枚擘芫花熬末甘遂末大戟末

宋板作右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合太滓外蒸末強人服一錢匕羸人服半錢温服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

宋板作黃連一兩入瀉三兩下有乾薑一兩四字右七味作右八味

右四味以水一升半先煮大棗取一升太滓丹諸藥末等分一兩温服之
傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯主之
生姜四兩切黃連三兩黃芩三兩人瀉三兩甘草三兩灸大棗十二枚擘半夏半升洗 右七味以水一斗煮取六升太滓再煎取三升温服一升日三服

宋板作傷寒中風醫天下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也

宋板作黃連一兩

傷寒中風及二三下之後其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭滿乾嘔心煩不得安者甘草瀉心湯主之
甘草四兩灸黃連三兩黃芩三兩乾姜三兩大棗十二枚擘半夏半升洗 右六味以水一斗煮取六升太滓再煎取三升温服一升日三服
傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

宋板作人参二兩

按宋板三升作六升温服下無一升字而有晝三夜二疑非仲景方九字

宋板作與黃芩湯

宋板作芍藥二兩

宋板温服一升下有日再夜一服五字

黃連三兩人浸三兩乾姜三兩桂枝三兩
太皮甘草三兩灸大棗十二枚擘半復半
升洗 右七味以水一斗煮取三升太滓
温服一升

太陽與少陽合病自下利者黃芩湯主之
若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩三兩芍藥三兩甘草二兩灸大棗十
二枚擘 右四味以水一斗煮取三升太
滓温服一升 黃芩三兩芍藥三兩甘草

宋板温服一升下有日再夜一服五字

宋板作傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之

宋板温服一升下有日三服三字

宋板作傷寒若吐若下後七八日不解

二兩灸大棗十二枚擘半夏半升洗生薑
三兩 右六味以水一斗煮取三升太滓
温服一升
傷寒脉浮滑表有熱裏有寒者白虎湯主
之

石膏一斤碎知母六兩甘草二兩炙粳米
六合 右四味以水一斗煮米熟湯成太
滓温服一升

傷寒下後不解熱結在裏表裏但熱時時

按但字宋板及諸本皆作俱此恐寫誤

按白虎加人參下宜有湯主之三字

惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者

白虎加人參

石膏一斤碎知母六兩甘草二兩炙粳米

六合人參二兩 右五味以水一斗煮米

熟湯成去滓溫服一升

傷寒無大熱口煩渴心煩背微惡寒者白

虎加人參湯主之

陽明之為病胃實也

陽明病發熱汗出譫語者大承氣湯主之

宋板溫服一升下有日三服以下六十二字

宋板作口燥渴

宋板作陽明之為病胃家實是也

按宋板闕此條而大承氣湯方附陽明病脈遲雖汗出不惡寒

條下。

宋板厚朴枳實作二物取五升下有本津二字

宋板分溫再服下有得下餘勿服五字

宋板作陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頭而還小便不利渴引水漿者此為瘵熱在裏身必發黃

按宋板作梔子十四枚大黃二兩下無酒洗二字而有本皮二字茵陳下無蒿字二升作六升梔子大黃作二味分溫三服作分三服以下有小便當利云云

大黃四兩酒洗厚朴半斤炙去皮枳實五

枚炙芒硝三合 右四味以水一斗先煮

厚朴枳實取五升內大黃更煮取二升去

滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服

陽明病發熱但頭汗出渴小便不利者身

必發黃茵陳蒿湯主之

茵陳蒿六兩梔子十四箇擘大黃二兩酒

洗 右三味以水一斗二升先煮茵陳蒿

減二升內梔子大黃煮取三升去滓分溫

宋板作譏語遺尿。發汗則譏語下之則額上生汗。

三服

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢遺尿發汗譏語下之額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

少陽之為病口苦咽乾目眩也

太陰之為病腹滿而吐自利也

太陰病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛者桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂

按太陰之為病。太陰病兩條。宋板合為一條。作太陰之為病。腹滿而吐。食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之必胃下結。鞞而桂枝加芍藥湯。及桂枝加大黃湯方。附本太陽病醫反下之條下。

枝加芍藥大黃湯主之

桂枝三兩去皮芍藥六兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘 右五味以水

七升煮取三升太滓溫服一升

桂枝三兩去皮芍藥六兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘大黃二兩酒洗

右六味以水七升煮取三升太滓溫服一

升

宋板溫服一升作溫分三服以下有本云桂枝湯今加芍藥九字

宋板無酒洗二字

宋板一升下有日三服三字

少陰之為病脉微細但欲寤也

按宋板諸本寤作寐此恐寫誤
宋板作少陰病得之二三日以
上心中煩不得臥黃連阿膠湯
主之

少陰病心中煩不得眠者黃連阿膠湯主
之

黃連四兩黃芩二兩芍藥二兩鷄子黃二
枚阿膠三兩 右五味以水六升先煮三
物取二升去滓內膠烱盡小冷內鷄子黃
攪令相得溫服七合日三服

宋板作少陰病得之一二日口
中和其背惡寒者當灸之附子
湯主之
宋板作白朮四兩

少陰病口中和其背惡寒者附子湯主之
附子二枚炮去皮破八片白朮三兩茯苓

宋板作溫服一升
宋板作身體痛

三兩芍藥三兩人參二兩 右五味以水
八升煮取三升去滓溫服八合日三服

少陰病身體疼手足寒骨節痛脉沉者附
子湯主之

少陰病下利便膿血者桃花湯主之

赤石脂一斤一半全用
一半篩末 乾姜一兩粳米一

宋板作右三味以水七升煮米
令熟去滓溫服七合內赤石脂
末方寸匕日三服若一服愈餘
勿服

升 右三味以水七升煮米熟湯成去滓
內赤石脂末溫服七合日三服

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱

黃湯主之

宋板生薑六兩下有切字

宋板作少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯

宋板一升二合作一升半三服亦作二服

宋板無者字

宋板作乾薑一兩附子一枚生下無用字

吳茱萸一升人蔘二兩大棗十二枚擘生

姜六兩 右四味以水七升煮取二升太

滓溫服七合日三服

少陰病咽痛者甘草湯主之

甘草二兩 右一味以水三升煮取一升

二合太滓溫服七合日三服

少陰病下利者白通湯主之

葱白四莖乾姜一兩半附子一枚生用太

宋板無二合字

宋板少陰病下有二三日不已至四五日九字自不利下有者此為有水氣其人八字下利上無不字

宋板作白朮二兩

宋板日三服下有若效者以下五十一字

皮破八片 右三味以水三升煮取一升

二合太滓分溫再服

少陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛自

下利或欬或小便利或不下利嘔者真武

湯主之

白朮三兩茯苓三兩芍藥三兩生薑三兩

切附子一枚炮去皮破八片 右五味以

水八升煮取三升太滓溫服七合日三服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉

宋板赤色作色赤

宋板附子下有六者二字

宋板乾薑三兩下有強人可四兩五字

宋板分溫再服下有其脉即出者以下六十七字

宋板丁利下有六七日三字

宋板猪苓下有太皮二字

微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯主之

甘草二兩炙附子一枚生用太皮破八片

乾姜三兩 右三味以水三升煮取一升

二合太滓分溫再服

少陰病下利數而嘔渴心煩不得眠者猪

苓湯主之

猪苓一兩澤瀉一兩茯苓一兩阿膠一兩

宋板作以水四升先煮四物取二升

宋板者下有急溫之三字

宋板分溫再服下有強人可大附子一枚乾薑三兩十二字

宋板作食則吐蛇

按此條在宋板屬太陽中篇且後字作而字

滑石一兩 右五味以水六升煮取二升

太滓內阿膠烱盡溫服七合日三服

少陰病脉沉者宜四逆湯

甘草二兩炙乾姜一兩半附子一枚生用

太皮破八片 右三味以水三升煮取一

升二合太滓分溫再服

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢

而不欲食食則吐下之利不止

發汗若下之後煩熱胃中窒者梔子豉湯

宋板脉滑下有而字且載劑並煎法

康治本傷寒論
主之

傷寒脉滑厥者裏有熱白虎湯主之

○二四八 六十四 五十

十五 四十五 五十五 ○

唐貞元乙酉歲寫之

康治二年 亥九月書寫之沙門了純

康治本傷寒論五十方善係抄
書者卷末有唐貞元乙酉歲寫
之康治二年沙門了純十八字
柳河戶上玄斐傳寫以承余
曰唐貞元乙酉即
皇朝延曆二十四年而傳教航

海東傳之衆也。其間最澄傳物蓋
其陰功。醫方則了純。而寫原奉
或出。東澄手書而來。其也。但了
純不知何人。了玄受悟。然曰。何
以。澗法。年曰。堂觀。橫川。松禪院
所藏。澄手書。將成。目錄。卷尾。曰

大唐貞元貳拾壹年歲次乙酉五
月朔拾叁日日本國求法沙門寂
澄錄。今此奉干支。而因。故云。尔子
若能影抄。以傳。則亦可嘉。尚也。
玄斐曰。此書。善也。在延曆。与人。或
得之。後。注。江戸。傳之。奧人。某。珍

重如拱壁不妄示人友人河口春
龍竊騰之而不及影鈔為可愧
也余曰此與宋板校經互有異
同而此本為優且今子之言作而
可激於日子一語則亦為有據
矣余意者歧黃一道既純而古

而又恐凌更畫律之謂也固辭
不許回錄其所答問者以還之
嘉嘉紀元之嘉平月
華頂王府侍讀池內奉時致
書於如別書院



嘉永二年八月 御免
安政四年十二月 刺成
柳河 户上玄達 校
京都書林 著 屋宗八

嘉永二酉年八月 御免
安政四巳年十二月 刺成
柳河 户上玄達 校
京都書林 著 屋宗八

