

百病自療叢書

月經病自療法

冊 下

上海大眾書局印行

百病自療叢書緣起

坊間出版醫藥各書。非深奧難懂。卽漫無系統。皆不合自習之用。故本局有百病自療叢書之發行。以普及民衆醫藥常識。而能便於自療爲宗旨。每種一冊。論病一種。該病之種種變化與病象。及各種治療方法。皆明白曉暢。一目了然。普通醫書。每以一方統治一病。不知病有輕重。體有強弱。又有夾雜他症者。若以一方混治之。豈不大誤。本書卽矯正此弊。雖同一病症。因症狀之不同。故其治法多至數十種。所列各方。經幾次考慮。務使妥善穩捷。一無流弊。見是證。用是藥。可無顧慮。可收大效。名曰自療法。允副其實。定價又極低廉。使普通民衆。皆能購閱。書中如有未盡善美之處。如能摘出指示。尤爲歡迎。

MG
R271.11
1.2



月經病自療法目錄下

月經病自療各法(下)

- (二十四)血瘀經閉之自療法.....一
- (二十五)行房經閉之自療法.....一
- (二十六)痰滯經閉之自療法.....二
- (二十七)受驚經閉之自療法.....三
- (二十八)脾胃虛弱經閉之自療法.....三
- (二十九)經閉腫脹之自療法.....四
- (三十)經閉咯血塊之自療法.....五
- (三十一)經閉成癆之自療法.....五
- (三十二)經色淡白之自療法.....六

月經病自療法目錄下

一

(三十三)經色鮮紅之自療法	六
(三十四)經來黃色之自療法	七
(三十五)經色紫黑之自療法	八
(三十六)經如豆汁之自療法	八
(三十七)倒經吐血之自療法	九
(三十八)倒經鼻血之自療法	〇
(三十九)經從大便出之自療法	〇
(四十)經行咳嗽之自療法	一
(四十一)經行泄瀉之自療法	一
(四十二)經行發熱之自療法	二
(四十三)經行譫狂之自療法	三
(四十四)及筭而經猶未行之自療法	四

(四十五) 未老經斷之自療法	四
(四十六) 經水已斷復來之自療法	五
前賢於月經病之意見	

(一) 張石頑論經行當慎將理	一六
(二) 蕭慎齋論經與病之因果二種	一七
(三) 李東垣謂調經先宜去病	一七
(四) 方慎庵論經不調各有所因	一八
(五) 褚寇二氏論月經與情慾之關係	一八
(六) 王節齋謂停經不可漫治	一九

月經病治驗筆記

(一) 白帶經多先黑後淡	二〇
(二) 經水不行血從上湧	二〇

(三)月經不調腫脹泄瀉.....	一一〇
(四)腹內有塊月經不調.....	一一一
(五)經行陰部發腫.....	一一二
(六)經行音啞.....	一一三
(七)經前必作瀉.....	一一三
月經病要方(八則)	
月經病問答一束(七則)	

月經病自療法(下)

中醫朱振聲



□月經病自療各法(下)

(二十四)血瘀經閉之自療法

原因 瘀凝氣滯。血不通行。則經水不至。

症狀 經事不來。腹滿形瘦。臍下有塊。有時上攻作痛。

治療 宜祛瘀行滯。

處方 荆三稜(醋炒)錢半 蓬莪朮錢半 炒當歸二錢

製香附二錢 焦查肉二錢 延胡索錢半

炒枳殼錢半 大黃廩蟲丸(另吞每服五粒日三次)

(二十五)行房經閉之自療法

月經病自療法(下)

原因 經將行時。同房交合。精阻胞宮。以致經閉。

症狀 經水停閉。小便刺痛。不可忍。二便俱閉。

治療 宜通瘀導滯。

處方 桃仁泥三錢 紫丹參錢半 川棟子錢半 芫蔚子三錢

淮牛膝四錢 原紅花一錢 兩頭尖四錢(包) 生草梢八分

琥珀末三分(吞)

(二十六)痰滯經閉之自療法

原因 肥盛之婦。喜啖油膩。生冷。脂肪阻滯。痰濁壅甚。以致經行不暢。甚則經

閉不行。

症狀 身體肥胖。不耐勞動。經閉不行。腹脹微痛。

治療 宜健脾祛濁。

處方 煨甘遂一錢 製香附二錢 炒白朮二錢 廣木香七分

砂仁末八分 製半夏二錢 新會皮一錢 炒黑丑一錢
炒苡仁四錢 白茯苓三錢

(二十七) 受驚經閉之自療法

原因 驚受之時。神經受劇烈之刺激。所謂「驚則氣亂」。神經失調節之機能。以致經閉不行。前述經閉各症。其發也緩。此則驟然不行。最易分辨。

症狀 經閉不行。神經錯亂。飲食無味。臥寐不安。

治療 宜用心理療法。舒暢其神志。兼以安神養心。補益氣血之劑。

處方

大生地四錢 炒歸身錢半 青龍齒一兩 石菖蒲三錢
川雅連四分 柏子仁三錢 遠志肉八分 酸棗仁三錢
硃茯神四錢 西血珀二分 西牛黃一分(上一二味先服)

(二十八) 脾胃虛弱經閉之自療法

原因 經旨月事不以時者。責之衝任。衝爲血海。隸於陽明。陽明者胃也。飲食

月經病自療法(下)

月經病自療法(下)

四

入胃。化生精血。榮出中焦。陽明虛則不能生化精血。下注衝任。太衝不盛。經從何來。

症狀 經停數月。胃納不旺。

治療 宜溫經湯加味法。

處方 全當歸二錢 川桂枝四分

吳茱萸四分 仙半夏二錢 阿膠珠三錢

大川芎八分 粉丹皮錢半 赤白芍各錢半 紫丹參錢半

(二十九) 經閉腫脹之自療法

原因 經閉血滯。血中水液滲洩於外。充於肌膚。

症狀 經水不行。腰以下腫脹。食納脹悶不化。大便溏薄不實。

治療 宜宣通血絡。溫化脾陽。

處方 生白朮二錢 川厚朴七分 大腹皮三錢 紫丹參二錢

芫蔚子二錢 川椒目八分 五靈脂(炒)錢半
豬茯苓各二錢

(三十)經閉咯血塊之自療法

原因 下焦氣滯。經閉不行。鬱血生熱。下路既阻。失其宣泄之道。則逆而向上。
症狀 經閉腹滿。大便不爽。不時吐紫血塊。

治療 宜順氣導瘀。宣通下焦。

處方 鮮生地汁五錢 熟大黃錢半 潯桂心五分 生姜渣五分
炒桃仁三錢 郁李仁錢半 青陳皮各八分 湖丹皮二錢

赤茯苓二錢

(三十一)經閉成癆之自療法

原因 有先患肺癆。而後經閉者。有經閉之後。再現勞病徵象者。此乃癆蟲傳入胞宮。侵蝕四圍。而成頑固之結節。以阻礙血流之通暢。月經閉止。有

月經病自療法(下)

由來矣。

症狀

形體怠倦。日見減瘦。下午發潮熱。咳嗽盜汗。納食不香。經水不行。

治療

宜補陰壯水。以滋化源。服藥而外。尤須怡悅情懷。抱樂觀主義。

處方

大生地三錢 大麥冬二錢 北沙參四錢 紫丹參錢半

淮牛膝三錢 煨牡蠣五錢 阿膠珠三錢 浮小麥四錢

炙百部錢半 川貝母三錢 香穀芽三錢

(三十一)經色淡白之自療法

原因

血氣不足之人。則赤血球減少。經來亦現淡白色。

症狀

神形瘦弱。精力怠疲。不論先期或後期而至。其量不多。

治療

宜補養心血。

處方

見血虛而經至後期條。

(三十二)經色鮮紅之自療法

原因

當卵子成熟之時。子宮充血過甚。以致毛血管破裂。卵子隨血液排出。此排出之血。即為經水。則此經水者。以鬱積之故。其鮮紅之色。已帶紫黯。若血熱過甚。毛血管為熱所迫。早期排洩。則色現鮮紅。

症狀

經來必先期。或一月數至。色鮮紅而多。口渴心煩。

治療

宜涼血清熱。

處方

見熱甚而經至先期條。

(三十四) 經來黃色之自療法

原因

血虛氣滯。臨期經不即下。先流黃水。似經而實非經也。

症狀

身體不健。經來如黃水。腹中微痛。

治療

血虛之人。經水本少。為氣所滯。當於培補之中。參入行氣之品。

處方

炒歸身二錢 炒白朮二錢 淮山藥三錢 小川芎八分
炒白芍錢半 玄胡索錢半 大熟地三錢 台烏藥錢半

月經病自療法(下)

二

七

小茴香七分

生姜三片

大棗二枚

(三十五)經色紫黑之自療法

原因

性急之人。易於動怒。不能自禁。致肝火內炎。血液受其煎熬。則經水現紫黑色。

症狀

處事躁切。易於鬱怒。經水愆期。色現紫黑。

治療

宜平肝泄火。用丹梔逍遙法。

處方

炒歸身二錢

炒白芍錢半

青柴胡八分

湖丹皮錢半

黑山梔二錢

小川芎八分

茺蔚子三錢

竹葉三十片

生甘草八分

(三十六)經如豆汁之自療法

原因

濕痰流入胞宮。爲寒氣所凝滯之故。

症狀

經來後期。血成小塊。淡而作紫暗色。有如豆汁。頭昏目眩。少腹作痛。更

兼白帶。

治療 宜甘溫培補。

處方 炙潞黨四錢

大熟地四錢

炒歸身三錢

小川芎八分

炒白芍二錢

炒白朮二錢

製香附錢半

炒枳殼一錢

川斷肉三錢

炙甘草三分

(三十七) 倒經吐血之自療法

原因 肝家不順。其氣妄動。血隨氣爲行止。氣安則血安。氣動則血動。氣既不

安。則血隨之妄行。乘勢上逆。從口而出。

症狀 經未行之前一二日。忽然腹疼吐血。

治療 經逆吐血。雖不大損。而反覆顛倒。未免大傷腎氣。必須順氣而補腎。

處方 當歸(酒炒)五錢 大熟地五錢 山萸肉三錢 生白芍二錢

北沙參三錢

黑芥穗錢半

牛膝炭二錢

粉丹皮錢半

月經病自療法(下)

白茯苓三錢

(三十八) 倒經鼻血之自療法

原因 氣滯血瘀。肝火載血。不能順注。衝任。而反衝激。妄行。上溢清竅。

症狀 天癸臨期不至。或數量甚少。腹痛隱隱。鼻中流血。

治療 逆者順之。激者平之。

處方 紫丹參二錢 淮牛膝二錢 全當歸二錢 粉丹皮錢半

芫薊子三錢 製香附二錢 白茅花一錢(包) 炒荆芥八分

福橘絡一錢 鮮竹茹三錢

(三十九) 經從大便出之自療法

原因 經道之與大腸。徑道各別。何以經水能從大便而出。蓋因胞胎之系。上

通心。下通腎。心腎不交。則胞胎之血。兩無所歸。而心腎二經之氣。不能

照攝。故血不出前陰。而出後陰。

症狀 狀似腸紅，惟腹不痛。初起之時，不知不覺。迨下血過多，則精神短少。體

漸消瘦，情志不快，納食不宣。

治療 宜大補其心腎。心腎之氣一交，則胞中之氣不散。經血自不妄行。

處方 潞黨參三錢 酒炒歸身二錢 山萸肉二錢 炒白芍二錢

黑芥穗一錢 貫仲炭一錢 炒白朮二錢 炒杜仲二錢

炙升麻三分 大熟地四錢

(四十) 經行咳嗽之自療法

原因 肺氣先傷，值經至時，脾血下行，脾氣不足，不能散津以輸於肺，因而咳

嗽。

症狀 無頭脹鼻塞等外感現狀。喉不爽利，咳雖頻而無痰。呼吸氣短，早晨汗

出，背常覺冷。經來漸遲。

治療 宜扶金生土，兼斂陰和血之品。

月經病自療法(下)

月經病自療法(下)

處方

川桂枝四分	炙黃芪三錢	炒白芍二錢	炙百部錢半
炙款冬一錢	五味子六分	炙甘草一錢	大棗三枚
飴糖三錢(冲)			

(四十一) 經行泄瀉之自療法

原因 脾主濕而統血。經水將至。脾血先流入血海。則脾氣必虛。脾虛則不能運行其濕。故泄瀉作矣。

症狀 腹中微痛。便泄。口中發淡。經來亦少。

治療 宜專事扶脾。脾健則瀉自止。

處方

奎黨參三錢	炒白朮三錢	淮山藥三錢	白扁豆四錢
炒苡仁四錢	春砂仁四分	新會皮一錢	白茯苓二錢
建澤瀉二錢			

(四十二) 經行發熱之自療法

原因 經前發熱。多係表熱。經後發熱。多是血虛。今臨經發熱。實係瘀血。瘀積胞宮。經不得下。故發熱也。

症狀 外感則頭疼惡寒。血虛則體倦掌熱。此則小腹疼痛。手按之。痛益甚。經來澀少。亦有紫黑成塊者。

治療 宜涼血化瘀。

處方 全當歸二錢 生枳殼二錢 桃仁泥三錢 淮牛膝三錢

原紅花一錢 炒延胡錢半 小川芎八分 澤蘭葉錢半

炒赤芍錢半 粉丹皮錢半

(四十二) 經行譫狂之自療法

原因 肝鬱化熱。內火熾盛。逆血挾痰上沖。延累腦筋。

症狀 神情煩躁。徹夜不眠。言語無倫。宛如傷寒發狂之狀。

治療 宜平肝火而清痰熱。

月經病自療法(下)

處方

生川軍二錢 葶藶子一錢 杜蘇子一錢 括藎皮三錢

竹瀝半夏二錢 廣鬱金錢半 淡黃芩二錢 紫降香七分

桃仁泥三錢 硃砂安神丸錢半(另吞)

(四十四)及笄而經猶未行之自療法

原因 先天不足。營血虧損。無以下注。衝任。故雖屆破瓜之年。而經水猶未一

轉也。

症狀 面色皸白。心悸跳躍。神疲力乏。脈象濡小無力。

治療 宜和榮通經。

處方 大熟地五錢 炒當歸二錢 青龍齒四錢 抱茯神三錢

紫丹參二錢 茺蔚子三錢 鷄血藤二錢 廣橘白一錢

月季花八分 青橘葉錢半

(四十五)未老經斷之自療法

原因 女子七七而經水絕。年未至七七而經水先斷者。乃血不足也。

症狀 身體虧損。精力不足。色衰神疲。

治療 宜補血養心。

處方 大熟地六錢 白歸身二錢 炒白朮二錢 潞黨參三錢

炒山藥四錢 炒白芍二錢 湖丹皮二錢 生棗仁三錢

川杜仲三錢 雲茯苓三錢

(四十六)經水已斷復來之自療法

原因 婦人七七之期。經水必斷。已斷之後。不宜再有洩漏。若斷而復來。乃營

分有熱。迫血下行。

症狀 有經斷之後。偶爾略見者。乃餘波未靜。不必服藥。有狂來不止。如少年

之血崩者。此甚危險。

治療 宜涼血清營。

月經病自療法(下)

處方

金石斛三錢(先煎)

天花粉三錢

東白薇錢半

京元參三錢

白茅根(去心)一紮

黑山梔三錢

湖丹皮錢半

側柏炭二錢

川連炭八分

甚者加犀角三分

前賢於月經病之意見

(一)張石頑論經行當慎將理

婦女經行之際。與產後一般。將理失宜。為病不淺。若被驚則血氣錯亂。漸止不行。或逆於上。而從口鼻中出。或逆於身。而為血分勞瘵。若其時勞力太過。則生虛熱。亦為疼痛之根。若鬱怒則氣逆。氣逆則血滯於腰腿心腹背肋之間。遇經行時則痛而重。經過則安。若怒極而傷於肝。則又有目暈嘔吐之證。加以血不循經。遂成淋瀝而不止。凡此之類。感風則病風。感冷則病冷。久而不治。崩漏帶

下。七癥八瘕。皆從此而成矣。

(二) 蕭慎齋論經與病之因果二種

婦人有先病而後致經不調者。有因經不調而後生諸病者。如先因病而後經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不行而後生病。當先調經。經調則病自除矣。

(三) 李東垣謂調經先宜去病

婦人月水循環。纖疴不作而有子。若兼潮熱腹痛。重則咳嗽。汗嘔或瀉。有潮熱則血愈消耗。有汗咳嗽則氣往上行。瀉則津偏於後。痛則積結於中。醫人必先去病。而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛。尤爲婦人常病。蓋血滯積入骨髓。便爲骨蒸。血滯積瘀。與日生新血相搏。則爲疼痛。血枯不能滋養百體。則蒸熱於內。血枯胞絡火盛。或挾痰氣食積寒凝。則爲疼痛。凡此諸病。皆因經候不調。必先去其病。而後可以調經也。

(四)方慎庵論經不調各有所因

婦人經病。有月候不調者。有月候不通者。然不調不通中。有兼疼痛者。有兼發熱者。此分而爲四也。細按之。不調中有趨前者。有退後者。趨前爲熱。退後爲虛。不通中有血枯者。有血滯者。血滯宜破。血枯宜補也。疼痛中有常時作痛者。有經前經後作痛者。常時與經前爲積。血經後爲血虛也。發熱中有常時發熱者。有經行發熱者。常時爲血虛有積。經行爲血虛有熱也。是四者又分爲八矣。人之氣血周流。忽有憂思忿怒。則鬱結不行。經前產後。忽遇飲冷形寒。則惡露不盡。此經候不調不通作痛發熱所由作也。大抵氣行血行。氣止血止。故治血病以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治熱病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

(五)諸寇二氏論月經與情慾之關係

寇宗奭曰。童年情竇早開。積想在心。月水先閉。蓋憂愁思慮則傷心。心傷則血

耗竭。故經水閉也。火既受病。不能榮養其子。故不嗜食。脾既虛。則金氣虧。故發嗽。嗽既作。則水氣竭。故四肢乾。木氣不充。故多怒。髮鬢焦。筋痿。五臟以次傳遍。故卒不死。然終死也。比於諸症。最爲難治。

褚澄曰。女子天癸既至。逾十年無男子合。則不調。未逾十年思男子合。亦不調。不調則舊血不出。新血誤行。或漬而入骨。或變而爲腫。或雖合而難子。合多則。瀝枯虛人。產乳衆。則血枯殺人。

(六)王節齋謂停經不可漫治

婦人女子經脈不行。有脾胃損傷而致者。不可便認作經閉血死。輕用通經破血之藥。遇有此症。便須審其脾胃如何。若因飲食勞倦。損傷脾胃。少食惡食。泄瀉疼痛。或因誤服汗下攻伐藥。傷其中氣。以致血少而不行者。則宜補養脾胃。脾旺則能生血。而經自行矣。又有飲食積滯。致損脾胃者。亦宜消積補脾。若脾胃無病。按其少腹。果有血塊凝結。方宜行血通經。

月經病治驗筆記

(一)白帶經多先黑後淡

一婦年四十餘。素患白帶。經來甚多。口渴。失於調理。馴至愆期。每來必落後。初來色黑。後來色淡。怠倦食少。臍上急痛。余用白朮錢半。紅花。陳皮。黃芩。白芍。各一錢。木通。枳殼。各八分。砂仁。甘草。各四分。煎湯。下保和丸。錢半。二劑即愈。

(二)經水不行血從上湧

一寡婦鬱結成疾。經水不行。忽然發熱。吐血若湧。前醫用止血藥。毫無效驗。此乃鬱久化熱。肝火橫肆。血隨上逆。先以茅根搗汁。濃磨沈香。服至五錢。血始降下。不復作吐。再用順氣導滯之劑。調理而安。

(三)月經不調腫脹泄瀉

婦人年四十。素性急。先因飲食難化。月經不調。服理氣化痰藥。反肚腹膨脹。大

便泄瀉。又加烏藥蓬朮。肚腹腫脹。小便不利。加豬苓澤瀉。痰喘氣急。手足厥逆。頭面肢體腫脹。指按成窟。脈沈細。右寸爲甚。求治於薛。曰。此脾肺之氣虛寒。不能通調水道。下輸膀胱。滲泄之令不行。生化之氣不運。卽東垣所云。水飲留積。若土之在雨中。則爲泥矣。得和風暖日。水濕去而陽化。自然萬物生長。喜其脈相應。遂以金匱加減腎氣丸料服之。小便卽通。數劑腫脹消。半四肢漸溫。自能轉側。又與六君加木香肉桂炮薑治之。全愈。後不戒七情飲食。卽爲瀉泄。仍用前藥加附子五分而安。

(四)腹內有塊月經不調

李姓婦。腹內一塊。不時上攻。呻吟呼痛。吞酸痞悶。月經不調。小溲不利。數年於茲。經數醫調治。皆無起色。余用黨參三錢。黃耆三錢。歸身二錢。柴胡八分。吳萸二分。木香七分。茯神二錢。蘆薈丸二錢。數劑後。諸證減退。再用調中益氣之品。調理而愈。

(五) 經行陰部發腫

馬某媳。每月汎行。子戶旁輒生一腫毒。脹而不痛。過三五日。以銀簪針破。出白膿。蓋許而消。不必貼膏藥而愈。略無癍痕。但汎行即發。或上下左右無定所。第不離子戶也。內外科歷治數年不效。且致不孕。詢於孫文垣。孫沈思兩日。而悟曰。此中焦濕痰。隨經水下流。壅於子戶也。經下而痰凝。故化爲膿。原非毒。故不痛。用白螺獅殼火煨存性。爲君。南星半夏爲臣。柴胡甘草爲佐。麵糊丸。早晚服之。遂愈。

按孫公穎悟。殊不可及。原非毒。故不痛。亦格致名言。此必子宮舊有積血。蘊毒。因經行而發炎。有諸內必形諸外也。

(六) 經行音啞

陳姓女。每逢經行音必啞。嫁後仍然。氣體則漸虛弱。醫用天冬。地黃。菴蓉。歸身等藥。病益甚。延余往診。音啞甚。口張指畫。毫無一字可辨。因思經行音啞。病關

衝任。該婦氣體虛弱。經行則陰血驟下。虛火上壅。來乘肺金。故聲啞。觀其經前。後則不啞。與內經所謂寒客於藏而聲啞者不同。用地黃等藥。原是中病。然祇補下焦肝腎。而不能上滋肺源。火壅絡阻。故不能效。卽於原方中加細辛少許。以通少陰之絡。且味辛能散。使虛火散而肺氣宣。服後其聲稍出。十餘劑後。又宗附桂八味丸法調理。後卽不啞。

(七)經前必作瀉

單姓婦。臨經之前一二日。必大瀉。或一二次。甚則二三日。然後經行。診其脈。兩手皆濡弱。斷爲脾虛。脾屬血屬濕。經水將動。脾血已先流注血海。然後下流爲經。脾血旣虧。則虛而不能運行。其濕乃用炒白朮三錢。淮山藥三錢。芡實三錢。生熟苡仁各三錢。製香附五分。春砂仁五分。白茯苓三錢。服數劑。月餘。經行不瀉矣。

月經病要方(八則)

(一)四物湯

(藥品)熟地。當歸。白芍。川芎。

(方義)此方爲調經之主方。藥雖四味。而三陰並治。當歸甘溫養脾。而使血有統。白芍酸寒斂肝。而使血能藏。生地甘寒而益血。川芎辛溫通氣而行血。陳修園新加法。就四物加入香附。茯神各二錢爲伍。是取鉄鸞道人之交感丸法。又加炙甘草四錢爲君。是取仲景先生之復脈湯法。又有加減套法。經血先期而至。加芩連知柏。後期而至。加姜桂艾葉。實者加陳皮枳實。虛者加人參白朮。大實而閉者。加大黃枳實。桃仁牛膝。更佐以抵當湯。桃仁承氣湯。大虛而枯者。加參朮鹿角膠牛膝外。更佐以人參養榮湯。經行而腹痛拒按者。加延胡索木香。經已行而腹痛者。加人參白朮乾姜。經水不通。逆行而爲吐血衄血者。加牛膝。

蘭菲汁童便。若腹中素有痞。飲食滿悶者。去地黃加枳實半夏。色紫者風也。加荊防白芷黑者熱甚也。加芩連丹皮地骨皮淡白者虛也。有挾痰停水以混之。加參耆陳半色如烟塵水如屋漏水者。合二陳湯再加防風秦艽蒼朮如豆汁者加芩連。或帶黃混濁者濕痰也。或成塊作片血不變者氣滯也。加玄胡索枳實陳皮。若血崩者加生地蒲黃。若赤白帶下加桂枝香附。若白淫白濁加龍骨。如漏下五色研麝香陳酒下。

(一) 溫經湯

(藥品) 吳黃。當歸。川芎。芍藥。人參。桂枝。丹皮。阿膠。生薑。甘草。半夏。麥冬。
(方義) 方中歸芎芍膠。肝藥也。丹皮桂枝。心藥也。吳茱萸。肝藥亦胃藥也。半夏。胃藥亦衝藥也。麥冬。甘草。胃藥也。人參。補五臟。生薑。利諸氣也。病在經血。以血生於心。藏於肝也。衝爲血海也。胃屬陽明。厥陰衝脈。隸之也。細繹方意。以陽明爲主。用吳茱萸。驅陽明中土之寒。卽以麥冬。滋陽明中土之燥。一寒一熱。不

使偶偏。所以謂之溫也。用半夏生姜者。以姜能去穢。而胃氣安。夏能降逆。而胃氣順也。其餘皆相輔而成溫之用。絕無逐瘀之品。故遇期不來者。能通之。月來過多者。能止之。少腹寒而不受胎者。並能治之。

(三) 歸附丸

(藥品) 當歸。香附。

(方義) 當歸補血。香附理氣。凡因氣亂而經來不準。或先或後者。此方宜之。

(四) 醋煎散

(藥品) 三稜。蓬朮。香附。烏藥。赤芍。甘草。肉桂。通用醋炒爲散。

(方義) 三稜。蓬朮。赤芍。破氣行血。香附。烏藥。肉桂。溫通理氣。氣滯經閉。有瘀血作痛者。方可用之。用醋炒者。酸以斂之。防其太過也。

(五) 柏子仁丸

(藥品) 柏子仁。牛膝。卷柏。澤蘭。續斷。熟地。

(方義)女子善懷。每多憂思。憂多則傷心。心傷則不能生血。而血少。血少則肝無所藏。而衝任之脈枯。以致經閉。方中柏子仁安心而養神。地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任。卷柏澤蘭活血脈而通血閉。

(六)芎歸六君子湯

(藥品)當歸。川芎。人參。白朮。茯苓。甘草。半夏。橘紅。
(方義)治經水濇少。形體肥盛。或多痰者。二陳治其痰滯。參朮補其氣虛。芎窮活其經血。

(七)固經丸

(藥品)龜板。芍藥。黃柏。黃芩。香附。樗皮。
(方義)經多不止者。陰虛不足以制包絡之火。故越其常度也。黃芩清上焦之火。黃柏瀉下焦之火。龜板芍藥滋陰而養血。皆壯水以制陽光。香附辛以散鬱。樗皮濇以止脫。一面清火。一面止濇。經自固矣。

(八) 土瓜根散

(藥品) 土瓜根。芍藥。桂枝。蠶蟲。

(方義) 桂枝通陽。芍藥行陰。使陰陽和。則經之本正矣。土瓜根驅熱行瘀。蠶蟲蠕動逐血。去其舊而生新。使經脈流暢。常行不亂也。

月經病問答一束(七則)

(一) 葉李氏問經阻治法

病由抑鬱起。見經阻三月。腹脹潮熱。欬嗽泛嘔。不能飲食。舌紅脈細如絲。敬問治法。

答葉李氏問

據述症屬抑鬱傷肝。木失調達之機。中州受克。胃失降和之權。陰液已傷。肺金輸佈失職。加以舌降脈細如絲。虛中夾實。攻補兩難。姑與舒肝解鬱。和胃通經。

南沙參三錢 硃茯神三錢 炒條芩一錢 銀柴胡八分

杜紅花八分 廣橘白一錢 水炙桑葉三錢 羌蔚子三錢

炒竹茹一錢半 川象貝各二錢 川石斛三錢 甜杏仁三錢

炒瓜婁皮三錢 鷄血藤三錢

(二)楊芝英問乾血癆治法

余年十九性寡言笑自高小畢業後擬出外求學不遂因之悵鬱不舒乃成此病平素身弱內熱去冬微寒微熱胃口大減夜則且有盜汗咳嗽痰多至今春正月間夜則顫耳皆紅形瘦肉落苔花脈細胞脈為閉月事不來至今有五月多矣。

■答楊芝英女士問

據述症屬乾血癆無疑。考素問云二陽之病發心脾有不得隱曲其在女子為不月。夫心主血脾統血因思慮過度所願不遂鬱而成損此症之起果非一朝。

而治療之法亦非易易。苟能改易心志。然後用藥扶持。方能奏效。蓋憂愁思慮。多傷心脾。心脾傷則血之化源告竭。既不能灌溉乎衝任。又無以奉養於四肢。經停形瘦。職是故也。其入夜盜汗者。虛陽逼津液而外泄也。咳嗽痰多者。火炎燦金。肺金受制也。夜則顫紅者。水虧不能涵木。虛陽乘勢升騰也。加以苔花脈細。損症已著。治療較難。今擬養血疎肝。助以通經斂汗之品。蓋血足則經自通。肝疎則鬱自解也。然乎否乎。質諸高明。

白歸身三錢

南北沙參各三錢

抱茯神三錢

大白芍二錢

甜光杏三錢

生白朮二錢

銀柴胡一錢

川象貝各二錢

淮山藥二錢

金鈴子二錢

莞蔚子三錢

炙鱉甲三錢

糯稻根鬚一兩煎湯代水

(三)邵少卿問經水紫黑而吐黑血之治法

素患月事紫黑。忽嘔吐出黑血無算。又大便純黑。有類瘀血。此爲何證。敬詳示。

■答邵少卿問

女子以肝爲先天。肝藏血而喜調達。肝鬱則生火。火迫血瘀。故月事紫黑也。繼忽嘔吐出血。血無算。乃由肝不藏血之故而亦腎不納氣使然。蓋少陰之火得肝火直冲而上。則爲嘔血。厥陰之血。失腎氣收納之功。方能上達也。其後又大便秘黑。有類瘀血。乃心腎不交。檢攝無權。使胞胎之血。不走小腸而走大腸。然肝爲腎子而亦爲心母。其心腎之不交。實肝氣之不調也。然此證出血過多。正氣已虧。治之之法。當以養正疎肝之劑。參以逐瘀之品。

生瀉黨三錢

熟地三錢

白芍錢半

蒺藜三錢

石決明五錢

桃仁錢半

甘草五分

當歸二錢

川芎八分

杭菊三錢

廣鬱金錢半

紅花八分

大棗二枚

(四)張友卿問便艱而月事不行之治法

月經病自療法(下)

內人大便六七日不解。能食知飢。苔潤不渴。月事不行。津液多。又無痰濕。但胸腹痛。請問治法。

■答張友卿問

大腸燥結。故大便六七日不解。胃熱消穀。故能食知飢。惟二者皆屬陽明。陽明有熱。勢必上移於肺。而耗其津液。豈有不渴苔潤之症。其所以有此者。正可知其肺不受邪。而津液無損也。考肺與大腸相表裏。大腸燥結。而不移熱於肺者。以其氣機阻塞。上下不通。故下焦雖有燥結之氣。而上焦仍有輸佈之權。蓋陽明之熱。未傳太陰。營分有邪。無關氣分。肺能輸津於口。故不渴苔潤也。其胸腹痛者。以月經不行。瘀血內阻也。法當攻其下焦之燥結。參以祛瘀之品。庶腑氣得以通達。而月事得以下行矣。

製軍炭三錢

生枳實一錢

大麻仁三錢

春砂壳八分

桃仁泥錢半

全瓜蒌三錢

菟蔚子三錢

青橘葉錢半

杜紅花八分 郁李仁三錢 製香附錢半

(五)李梅影問經來腹痛之治法

振聲先生大鑒。余聞先生之名久矣。無緣拜識。悵結何似。梅自種病以來。迄今八載。回憶初病之時。偶服生冷。於是每逢經來(色淡)即患腹痛(喜按)必俟經淨。其痛始殺。雖曾延醫服藥。而效等於零。故不親湯藥。亦已兩載矣。近聞先生於婦科治療高人一等。倘得診餘有暇。示我良方。俾脫離數載沉疴。而登諸幸福之門。則幸甚矣。

■答李梅影女士問

痛經一症。婦女患者頗衆。或痛於經來之前。或痛於經來之後。或痛於經水適來之時。因痛時之不同。故用藥亦互異。大概經前痛由於瘀滯交阻。經來痛由於寒客胞宮。經後痛由於宿瘀未楚。今女士痛於經來之時。經淨即止。加以病由服生冷而起。且有經水色淡。腹痛喜按等證。此明明爲寒客胞宮無疑。前

醫必用理氣祛瘀之品。而無溫通之藥。故不能見效也。要知河中冰凍。舟不能行。非暴日當空。春回寒谷。則舟不能行。此症非用溫通之劑。以散寒瘀。則痛不止。而病不愈也。錄方于后。以備採用。

肉桂心三分(飯丸吞)

赤茯苓三錢

金鈴子二錢

大白芍二錢

製香附錢半

延胡索一錢

炮姜炭五分

春砂壳八分

失笑散三錢包

台烏藥三錢

佛手八分

(六)王國棟問倒經治法

拙荆按月倒經。血從口鼻而出。請先生示以良方。

答王國棟君問

據述症屬肝火上迫。不循常道所致。宜抑肝火。導歸衝任。可使下行。此即搏躍過顛之理。擬方如下。

全當歸二錢

淡黃芩錢半

荒蔚子三錢

京赤芍二錢

黑山梔錢半

鮮竹茹三錢

粉丹皮二錢

懷牛膝二錢

紫丹參二錢

白茅花一錢包

(七) 陳女士問年已及笄而經猶未行之治法

余負笈春申。條已二載。平日對於各種醫報。無不披閱。知女子二七而天癸至。太衝脈盛。月事以時。下是則女子年至十四。即當行經。惟余也不然。年十六矣。而經猶未行。課餘之暇。每覺神疲乏力。頭眩眼花。心悸跳躍。面色恍白。平常常聞同學言。女子有乾血癆一症。每致不治。清夜自思。不禁淚濕孤枕。然而獨處春申。求治無門。偶讀先生主編之幸福報。知先生於婦科極有經驗。故敢請問余所患者。是否爲不治之症。並希示我以良方。不勝盼望之至。

■ 答陳女士問

女子以肝爲先天。肝藏血。體陰而用陽。榮血虧耗。上既不得榮行於肌肉。(面

色恍白。下又無以灌漑乎衝任（月經不來）且血不養心則心悸。血不涵木則頭眩種種見象無不由於血虧而來幸症延未久尙能治療否則若見潮熱盜汗頰紅納少肌肉瘦削卽難以治療矣今擬一方如下。

全當歸二錢

抱茯神三錢

紫丹參二錢

鷄血藤二錢

京赤芍二錢

廣橘白一錢

青龍齒三錢

芫蔚子三錢

嫩鈎鈎三錢（後下）

月季花八分

青橘葉錢半

第十
眉編

五官病

（折七）角五價定册一

本書共列「目」「耳」「鼻」「口唇」「舌齒」「喉」六大類。每類除通論外。更分「研究」及「治療」二部。先將各器官之構造作用及保護方法。詳細說明。然後將各種器官病之治法驗方。一一詳細排列。以構救濟。文字淺顯。切合實用。不可不備。

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

癆病自療

（折七）角二價定冊一

此書係蕭屏閣采擇東西最精最確之學說而成，其優點有四：（一）文字淺顯，人人能懂。（二）提要鉤玄，專門肺病學者之各種議論，均包括於此小冊子之中。（三）所用方藥，簡之又簡，最穩妥，最靈驗。（四）靜坐法，都市口淋注射法，門外睡眠法，俱為書中極新之發明，有志衛生者，不可不讀。有志公益者，不可不讀。有志醫學者，尤不可不讀。

上海大眾書局發行

售代有均局書大各埠各省各

張偉
汝編

咽 喉 病

（折七） 角五洋大價定 册一

咽喉之病。雖在局部。然其危險特甚。且病因複雜。有關於天時者。有因乎七情者。有外感而腫者。有內傷而感者。遠因在心脾腎。近在肝肺胃。即牙舌腮頰之症。亦關咽喉。本書用科學方法編制。文字淺顯。語句簡潔。治法用藥。一本國醫古法溶酌著者二十年之咽喉經驗。而稍為變通之。自屬方無不效。病無不除。編者張君。治喉素稱擅長。行醫二十餘年。莫不着手回春。本書之編末。即附其醫案。以供參考。

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

書叢療治病萬醫國

茹十

眉編

病兒小

(折七) 角六價定册一

醫，臨診多年，經驗宏富，對於兒
 科，尤為擅長，茲為普及民衆醫藥
 常識及便利病者起見，特編此書。
 本書編法，分作三期，第一期為初
 生期，第二期為哺乳期，第三期為
 孩童期，凡初生期至孩童期中一
 小兒疾病，無不應有盡有，包羅無
 遺。每一病症，先述其病之狀態，
 繼述其病之來源，三述其治療及
 藥之方法，以便對症服藥。全書不
 尚高深，不論空理，皆以實用為歸
 宿，文字淺顯，撰句簡潔，無論知
 醫與否，一看即能明療，家有子
 者不可不備。

行發局書衆大海上

售代有均局書大各埠各省各

吳潛
編克

學斷診

(折七) 角九洋大價定 册一

醫重施又經時大義章案今得以進著矣
海學症治發驗一法則節古之研述
純。寧。無。精。吳。克。潛。過。疑。生。難。
。送。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。特。心。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。宗。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。內。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。顯。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。出。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。有。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。融。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。可。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。合。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。不。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。且。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。文。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。費。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。日。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。茲。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。經。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。
。難。始。輯。得。著。不。克。每。潛。過。疑。生。難。

學方處症臨

(折七) 角三價定 册一 編章煥沈

訣歌頭湯

(折七) 半角二價定 册一 編菴詠汪

行發局書衆大海上

售代有均局書大各埠各省各

朱振聲
編

肺病指南

一册定價五角(折七)

年來國內患肺病者日衆，此皆未病不知預防，已病不善治療之故。本書對於肺病之理論，闡發無遺；對於肺病治療之指導，尤極慎重；更注意於肺部日常之衛生。俾未病者讀此，得知預防，已病者讀此，得知治療，實民衆之肺病醫藥顧問也。全書三大章，十萬餘言。

痛症大全

朱振聲編

凡人身疾病，以痛症爲最苦，一痛在身，大有求死不得之感。本書搜羅人體痛症，各部完備，去根治標，皆有詳細說明。一書在手，百痛全去，誠爲濟世慈航。

一册定價五角(七折)

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

吳克潛醫生編

藥性字典

諸君如對於本書中藥方有疑慮之處
請購本局最近出版之

因本字典中對於每一藥味

均有下列各種詳細解釋：

〔性味〕說明該藥之性質味道。及有毒無毒。

〔產地〕說明該藥屬於何類。及以產地別其優劣。

〔主治〕說明該藥主治何症何病。並引歷代諸大家對該

藥用法之見解作證。

〔用量〕說明該藥之輕重用法。

〔禁忌〕說明該藥之不宜於某病某時。或不宜與某藥同

進。並誤用該藥之補救法。

備此藥性字典一部。以後遇見無論何種

藥方中有疑慮之點。即可翻閱查對，穩

固妥當。萬無一失。

全六餘一精裝二元五角五分一元七折

上海大眾書局發行

各省各埠各大書局均有代售

朱振聲編

家庭醫藥

一册 定價大洋一元(七折)

請醫診治，非鐵石，難免疾病，又感麻煩，若能自費金錢，豈非便利。本書搜羅各門病症，分計四十二章，每章更分若干節，凡人生常見之病，莫不應列盡。每病後詳述其病狀及醫理，然後再列驗方，以便病者對症服藥。百發百中，藥到病除，家庭備此一書，則全家可享平安之福。

肝病胃病

朱振聲編

一册 定價五角(七折)

本書對於肝病胃病，理論與實際並重。先將肝胃在生理上之作用及人體各器官之關係，詳細分析研究；其次述致病之由及預防法；然後更列關於肝病之各種驗方，以便病者對症服藥，某種病狀應服某方，皆詳細說明，不致病者疑難。

上海大眾書局發行

各省各大埠均有代售

馬小琴醫生編纂

醫藥顧問

四版
出書

全書四冊
二十萬言
裝一鎊盒
定價大洋
二元五角
實價六折
寄費加一

指示醫藥常識
預防病魔侵入
羅列各病驗方
救治輕恙重症
一人購備此書
終身可以無病
一鄉購備此書
一鄉人可以無病
若能詳究此書
不難立成名醫

本書十大特色

- (一) 各科病症應有盡有
- (二) 採自名著藥到病除
- (三) 醫理淺近容易明瞭
- (四) 藥餌普通易於措辦
- (五) 大劑小劑無不匯列
- (六) 所載諸方實驗如神
- (七) 家居旅行利己救人
- (八) 文字淺顯盡人可讀
- (九) 分類清晰一查即得
- (十) 印刷優良定價低廉

上海大眾書局發行

中華民國二十三年八月再版

中華民國二十二年八月初版

百病自療叢書
吐血自療法
咳嗽自療法
喘氣自療法
遺精自療法
淋濁自療法
五癆自療法
月經病自療法
帶下自療法
肝氣自療法
白帶自療法
失血自療法
失眠自療法

▲二分十册每册定價銀四角
郵外單酌加

編著者 中醫朱振聲

印刷者 大眾書局

出版者 大眾書局

發行者 大眾書局



總發行所 上海四馬路 大眾書局

代售處 全國各大書局

7/5/1
= 2000

259054

