

膏方大全

秦伯素

陳中樞題



1612  
1025

榮志宏先生惠贈



秦伯未先生著述

膏方大全

上海中醫書局發行

410076

# 沈序

衡山善病。病無微甚。必乞診于秦先生伯未。垂今七載。過從益密。在旁人觀之。將疑爲非先生之詩友。卽先生之酒徒焉。初衡山病咯血。延海上所稱名醫者治。隨愈隨發。凡十餘次。病已經年。旣而就治于先生。先生曰。此血不歸經也。當使之就軌。若以涼藥抑伏。血得寒而止。寒去而血又湧。宜病之纏綿不已也。投側柏葉湯而驗。又病後易罹外邪。月必四五起。但擁絮臥周時卽愈。以詢先生。先生曰。此氣血不充也。內經有言。體弱者善病寒熱。當補益之。囑服參芪。各盡三兩許而不復作。其識病之精。用藥之神。實時下莫與京也。今者有膏方大全之輯。抒平日之經驗。作世人之津梁。持以示衡山。受而讀之。議論旣可法可師。

選方又惟純惟粹。不僅貢獻醫林。抑且有功社會。夫世人自信多虛。醫者更以虛阿其好。於是因虛而誤服補劑。因補而變生他患者。以平日所聞。不可勝數。先生斯作。正不知驚醒。嗑睡幾許矣。辱命撰序。衡山其何敢。敬以心所景仰而感慨者。略陳一二。聊資侑酒云。

民國十八年七月上海沈衡山其宇敬序

# 目錄

## 上編 通論

膏方之意義

膏方之性質

膏方之用量

膏方之煎熬

膏方之禁忌

膏方之效力

膏方之組織

膏方之時期

膏方之服食

膏方之經驗

## 下編 選方

膏方大全 目錄

膏方大全目錄

欬嗽 痰飲

吐血 遺精

眩暈 耳鳴

失眠 多寐

厥症 痞滿

寢聚 龜背

調經 白帶

產後 求嗣

# 膏方大全

上海秦伯未著述

普甯方公溥參校

## 上編 通論

### 膏方之意義

何謂膏。正韻澤也。博雅潤澤也。膏方者。蓋煎熬藥汁成脂液而所以營養五臟六腑之枯燥虛弱者也。故俗亦稱膏滋。藥方書所載瓊玉膏甯志膏等不外滋補之用。可明其義。在實驗方面。發散不用膏。攻下不用膏。通利不用膏。涌吐不用膏。以此數者。非潤澤所宜。則膏之爲義。尤可大明。此其一。進言之。膏方並非單純之補劑。乃包含救偏却病之義。故膏方之選藥。須視各個之體質而施以。



平補溫補清補瀉補亦須視各個之病根而施以生津益氣固精養血萬不可認膏方爲唯一補品貿然進服此其二余習見中下之家羨于膏方之效力又嫌其價格之昂貴輒自服黃耆黨參次焉者輒常餌黑棗合桃未能獲益抑且增患其弊蓋不知膏方之意義而祇惑膏方爲補劑是故凡進膏方者必須乞示于醫家尤必乞示于素所欽佩而富有經驗之醫家庶乎可

■膏方之效力

內經有言形不足者溫之以氣精不足者補之以味蓋一切衰弱怯損之病全賴補益之品收其全效然而人參阿膠等輩同屬補品何以有服之功效不著而必欲乞靈于膏方則以人參阿膠等輩其滋補之點僅限局部如人參補氣阿膠補血不若膏方之集合多種藥物面面俱顧一齊着力故天下惟混合物

最合于身體營養。國人徒以銀耳燕窩爲補。西人又祇知雞蛋牛乳爲補。皆不能達補之絕頂者也。余嘗治吐血重症及遺精重症數十人。病積數年。醫易數人。且調養備至。終不能愈。余爲立膏方。煎服數月。宿恙全捐。精神健旺。可以見其效力之偉大。實非他種所能埒矣。然世人恆信膏方爲補劑。並自餒身體爲不足。醫者亦不察隱情。聽信片言。浪投滋補。因而增病者。數見不鮮。余曾歷舉所見。刊入謙齋醫話。可以參攷。蓋補益之品。施之于虛損。則可。若邪氣內蘊。當以除邪爲先。譬之淤積流澗。必去其淤而流自通。否則實實之戒。其罪焉。道就余經驗所得。處外感方易。處內傷方難。而處補虛方尤難。若膏方則大劑補益。服餌必一二月。設非深思細慮。必使僨事。尤爲難之。又難慎之。慎之。

### 膏方之性質

膏方之性質者推求滋補之重心所在以盡其用也。大抵可析爲四類。一爲溫補類。宜于陽虛之症。如用附子、仙茅、黃芪、黨參、當歸、白朮等。是一爲清補類。宜于陰虛之症。如用地黃、鼈甲、萎蕤、柏子仁、首烏、菴蓉等。是一爲瀉補類。宜于滑脫之症。如用補骨脂、蓮鬚、棗仁、牡蠣、訶子、萸肉等。是一爲平補類。宜於脾胃薄弱。或不耐滋補之症。如用白芍、山藥、芡實等。是而總挈之爲二綱。一補氣。一補血。補氣以四君子湯爲主。補血以四物湯爲主。其他痰多者。佐以化痰。氣鬱者。佐以理氣。濕盛者。佐以祛濕。熱熾者。佐以滌熱。隨機應變。而大法終不外于是。

膏方之組織

立方有制。內經云。君一臣二。奇之制也。君二臣四。偶之制也。君三臣三。奇之制也。君二臣六。偶之制也。又君一臣二。制之小也。君一臣三。佐五。制之中也。君一

臣三佐九。制之大也。是爲方劑之組織法。膏方亦然。惟膏方服時既久。其制勢須擴大。大抵每方平均以三十藥爲準。外更酌加各項膠屬。如阿膠、鹿角膠、龜板膠等。以便收鍊成膏。普通更加紋冰以制其苦味。而便適口。其有不喜甘味。或不宜甘味者。則酌減之。亦有于收膏時加合桃肉、白蓮肉、黑棗肉等者。但求體質相宜。初無定則也。抑有進者。膏方之組織。近于複方。故余之主張。以選方爲第一步。方選既決。然後就各方選藥。藥選既決。尙有不足。則就症補充。如此則藥症自能絲絲入扣矣。

### ■膏方之用量

藥物質量有輕重之別。質輕者用量宜少。質重者用量宜多。此爲處方之原則。膏方之用量。無殊所特殊者。膏方用量。恆依普通方劑比例增加。其增加之率。

常以十倍。但亦有不耐久服者。則五倍六倍酌量施用可也。又膏方多滋膩。須時時顧及脾胃。蓋胃爲水穀之海。脾爲生化之源。五臟六腑實利賴之。使脾胃健全。消化迅速。則五穀化生之精微皆爲百骸無上之補品。不然脾胃衰弱。納減運遲。投以膏方。元氣不勝藥力。徒滯積爲患耳。故于用藥之時。宜有監制而用量之間。尤須適當。此惟有經驗者知之。而未可與語一般者也。

膏方之時期

疾病之進退。每有視時令消長者。勞瘵危于春夏。痰飲篤于秋冬。其淺顯易見者也。因是膏方與時令亦不可不研究。夫膏方之施治。在補益補益之劑。宜靜而戒動。宜藏而戒泄。四時之氣。春爲發。陳夏爲蕃。秀主疎泄者也。秋爲容。平冬爲閉。藏主收攝者也。疎泄則陽氣發越。而人氣浮外。收攝則陽氣固密。而人氣

伏。內。蓋。人。稟。天。地。之。氣。而。生。天。地。之。氣。息。息。與。人。相。關。古。代。醫。家。因。日。人。身。爲。一。小。宇。宙。此。雖。由。研。究。自。然。哲。學。者。附。會。要。亦。有。至。理。存。焉。故。吾。人。服。膏。滋。藥。劑。宜。于。秋。冬。而。不。宜。于。春。夏。取。其。易。于。受。納。而。得。遂。其。營。養。之。作。用。也。但。怯。弱。症。候。固。不。限。于。秋。冬。有。之。則。膏。滋。之。方。于。春。夏。時。期。亦。未。始。不。可。施。用。但。終。不。若。秋。冬。之。獲。效。偉。大。也。

### 膏方之煎熬

藥劑之煎熬合法與否與功效之鉅細大有關係。如羚羊犀角石決等均須先煎。因其性不易出也。薄荷薏仁鈎藤等均須後入。因其氣易消散也。他如人參等貴重之品更須另煎沖服。免致耗費。其於膏方之煎熬此等手續亦不可廢。然此等手續藥肆夥友類能知之。而獨怪世之服膏方者恆完全付託于藥肆。

夥友。在彼不失小節者固多。而貪利圖倖者。要亦不免。于是以僞亂真者有之。以次充上者有之。及煎成膏。各物混合。誰得而知之。又誰得而辨之。若此之類。尙有滋益之效乎。因其不效。遂障礙服者之健康。更疑及醫家之技拙。此實煎熬時所不容不注意者也。

■膏方之服食

攷藥之有膏。見上古內經。癰疽篇曰。癰發于隘中。名曰猛疽。其化爲膿者。瀉則合豕膏冷食。豕膏者。以豕油白蜜煎鍊者也。所以便噙在口中。緩緩嚥下。爲治上焦病之法。所謂病在上者。服藥不厭頻而少也。今之膏方。則治久病及弱症。湯調而頓服。與古法異矣。惟其與古法異。是故對於次數時間諸端。亦應另訂章則。通常次數。每日以兩度爲準。用量。每次以一匙爲準。時間。則以空腹爲宜。

取其易于消化也。若有服膏方後易于泄瀉或脹滿者。此必腸胃虛而滋陰之藥太重。可酌加砂仁以救濟之。易于口渴或目赤者。此必陰分虛而補陽之藥太重。可以菊花茶沖服以救濟之法外之法亦不可不知。

### ■膏方之禁忌

膏方之禁忌可分爲二。一爲疾病方面。一爲飲食方面。所謂疾病方面者。倘偶感外邪形寒發熱欬嗽。或內停食滯腹痛脹滿泄瀉等。則宜暫時停止服藥。調理恐峻補其邪釀成後患也。飲食方面者。藥有剋制必須避免。世俗服膏方後。菜蔬不食。萊菔飲料不用。茶葉其一例也。總之對於攻伐消剋務宜留意耳。此外如在大病之後。胃納不旺者。忌食腥羶油膩之品。宿有一切欬咯吐血及便血尿血等症者。忌辛熱燥烈之品。餘均隨時消息。苟能謹謹遵守。獲效自倍。蓋



人之于胃。猶之盆水。投紅色。則水變紅。投藍色。則水變藍。投黃黑之色。則水變黃黑。豈有食辛熱。沉寒。生冷。炙煉。肥甘。諸物。而臟腑不呈異狀者。又况羸弱之體。正氣之抗拒力已弱。而食與病絕對之物。更有不發生衝突者乎。

膏方之經驗

余治醫無所似。而蒙病家以善調理延譽。於是每歲之來乞膏方去者。恆數十人。茲摭經驗所得。聊備采擇。第一須識消長之機。夫人身不外氣血。氣血不外陰陽。陽盛則陰衰。陰盛則陽衰。故見陽衰之症。卽須推其何以陽衰。陰衰之症。卽須推其何以陰衰。施補庶能入彀。第二須識相互之機。氣虛補氣。血虛補血。繩墨也。然少火生氣。氣能攝血。故補氣而不補火。補血而不補氣。決難盡其能事。第三須識開闔之機。天地不外開闔。用藥不外補瀉。補正必兼瀉邪。邪去補

自。得。力。設。或。一。味。蠻。補。終。必。釀。成。災。殃。能。悟。上。述。三。者。之。妙。臨。診。處。方。自。有。左。右。逢。源。之。樂。余。治。劉。姓。婦。白。帶。沈。其。綱。痰。飲。黃。明。壅。脹。滿。人。皆。引。數。病。無。補。法。而。以。服。膏。方。爲。戒。然。卒。因。以。蠲。除。痼。疾。蓋。能。識。其。機。也。總。之。治。病。之。要。在。求。其。本。所。謂。本。者。卽。發。病。之。主。因。也。能。制。其。主。因。則。一。切。枝。節。不。治。自。愈。而。立。膏。方。尤。須。尋。其。衰。弱。之。根。源。與。疾。疴。之。樞。紐。則。功。效。易。著。遺。患。可。免。淮。南。子。曰。所。以。貴。扁。鵲。者。知。病。之。所。從。生。也。王。應。震。曰。見。痰。休。治。痰。見。血。休。治。血。無。汗。不。發。汗。有。熱。莫。攻。熱。喘。生。休。耗。氣。精。遺。不。瀉。洩。明。得。個。中。趣。方。是。醫。中。傑。真。知。本。之。言。也。然。而。環。顧。醫。林。其。能。悟。此。旨。者。果。幾。輩。耶。

## 內科專家上海秦伯未

### 診例

(主治) 男婦幼內科一切

時氣及調理雜症

(時間) 上午門診下午出

診

(診金) 門診一元出診城

內三元餘視路途遠近酌

加九散膏方四元

(附例) 親朋例外貧病不

計

(診所) 上海小西門內尙

文路第一九四號洋房

## 內科專家廣東方公溥

### 診例

(主治) 男婦幼科溫熱傷

寒虛勞時疫痧痘喉眼奇

難雜症

(時間) 門診上午八時至

十二時出診下午三時至

八時

(診金) 門診一元二角出

診五元四角

(附例) 貧病診金不計拔

號照例加倍

(診所) 上海八仙橋芝蘭

坊念三號電話六二一九

二號

# 膏方大全

上海秦伯未著述

普甯方公溥參校

## 下編 選方

### ■ 欬嗽

劉左 肺爲華蓋。位在上而其氣主降。腎主封藏。位在下而其水宜升。所以升降相因。肺腎交通。而呼吸以勻。胃爲中樞。爲十二經之長。主束筋骨而利機關。脾弱溼困。胃爲淵藪。中州濕盛。則肺降被阻。此稍一感觸。輒發欬嗽之微理也。胃溼蘊聚。則胃氣不和。胃病則機關脈絡不和。時爲身痛。溼不自生。脾失運化而始生。脾不自運。氣機鼓舞而始運。然則致病者溼也。生溼者脾也。脾之不運。

而生溼者氣也。吳義洛云脾健運則溼自除。又云氣旺則痰行水消。洵哉斯言也。擬補氣運溼為主。但調攝之方。自當顧及肝腎。擇其不滯者投之。方為妥善。

炙綿耆四兩

製首烏切四兩

杭白芍酒炒一兩五錢

龜板膠一兩二錢

別直參二兩另煎沖大生地薑汁炒成炭四兩

扁荳子二兩

枳實一兩

奎黨參三兩

炒杞子三兩

炒山藥二兩

厚杜仲三兩

雲茯苓四兩

於潛朮炒三兩

生薑汁三錢沖入

霞天麴炒二兩

鹿角膠一兩五錢

川斷肉三兩

海蛤粉三兩

炙黑草五錢

冬瓜子二兩

木猪苓二兩

生熟薏仁各二兩

懷牛膝酒炒三兩

巴戟肉一兩

左秦朮一兩五錢

製半夏四兩

澤瀉一兩五錢

潼沙苑鹽水炒一兩五錢

桑寄生酒炒三兩

陳廣皮二兩

右藥共煎濃汁。文火收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

鮑左 自幼卽有哮喘。都由風寒襲肺。痰滯於肺絡之中。所以隱之而數年若瘳。發之而累年不愈。今則日以益劇。每於酣睡之中。突然噎咳。由此而寤。寤而頻咳。其咯吐之痰。却不甚多。夫所謂襲肺之邪者。風與寒之類也。痰者。有質而膠粘之物也。累年而咳不止。若積痰爲患。何以交睫而痰生。白晝之時。痰獨何往哉。則知陽入於陰則臥。陰出之陽則寤。久咳損肺。病則不能生水。水虧不能含陽。致陽氣欲收。反逆逆射。太陰實有損乎本元之地矣。擬育陰以配其陽。使肺金無所凌犯。冀其降令得行耳。

炒黃南沙參四兩

炒鬆麥冬一兩五錢

雲茯苓四兩

海蛤殼打五兩

川貝母去心二兩

款冬花蜜炙一兩

蜜炙橘紅一兩

炒香玉竹三兩

蜜炙紫苑肉二兩 甜杏仁去皮水浸打 代赭石煨四兩 川石斛三兩

牛膝炭二兩

杜蘇子

五兩水浸打  
絞汁沖入

百部蜜炙二兩

共煎濃汁。用雪梨汁二斤。白蜜二兩。同入徐徐收膏。

痰飲

張左 每冬必欬。氣急不平。天暖則輕。遇寒則甚。此陽虛留飲為患。陽為天道。陰為地道。人生賤陰而貴陽。經云。陽氣者。若天與日。失其所。則折壽而不彰者也。素體陽虛。脾腎兩病。腎虛水泛。脾虛濕聚。水濕停留。積生痰飲。年深不化。盤踞成窠。阻塞氣機。據為山險。上礙肺金。右降之路。下啓衝氣。上逆之機。不降不納。遂為氣急。飲為陰邪。遇寒則陰從陽屬。虎借風威。遇暖則陰弱陽強。邪勢漸殺矣。痰飲生源於土。濕土濕。本源於水。寒欲化其痰。先燥土。濕欲燥土。濕先溫。

水寒書所謂外飲治脾內飲治腎也肺主氣胃爲化氣之源腎爲納氣之窟肺之不降責之胃納腎之不納責之火衰欲降其肺先和其胃欲納其腎先溫其陽書所謂上喘治肺下喘治腎是也症屬陽虛藥宜溫補今擬溫腎納氣溫腎則所以強脾和胃降逆和胃功兼肅肺但得土溫水暖飲無由生胃降金清氣當不逆氣平飲化欬自愈矣症涉根本藥非一蹴能幾治仿前賢方乃三思而定略述病由以便 裁奪。

別直參三兩

雲茯苓四兩

於潛朮三兩

清炙黃芪三兩

清炙草八錢

炙遠志肉一兩

大熟地四兩

川桂枝六錢

五味子八錢淡乾姜四錢同搗

熟附塊一兩

川貝母三兩

甜光杏三兩

蛤蚧尾五對酒洗

砂仁末八錢

范志麩三兩

陳廣皮一兩



仙半夏 三兩

旋覆花 一兩五錢包  
代赭石 四兩煨

補骨脂 二兩

合桃肉

二十枚二  
味拌炒

炙白蘇子 二兩

淮山藥 三兩

山萸肉 三兩

福澤瀉 一兩五錢

厚杜仲 三兩

川斷肉 三兩

甘杞子 三兩

右藥煎四次。取極濃汁。加鹿角膠四兩。龜板膠四兩。均用陳酒燉烱。白冰糖半斤。溶化收膏。每早服三錢。臨臥時服三錢。均用開水沖服。如遇傷風停滯等。暫緩再服可也。

張右 高年氣血兩虧。營衛之氣。不得宣通。遍身脈絡抽掣。四肢不遂。腹爲至陰。藏陰虧損。則藏絡不和。運動之機。不能靈轉。腹中常常拘急。下虛不攝。衝陽逆升。痰飲泛逆。氣喘痰多。有時並發。營氣不行。虛風自動。氣可以補血。可以養脈絡。可以宣痰飲。可以化無如。古稀之年。氣血有虧。無長。惟有循理按法。盡力

之當盡而已。

大生地薑汁炒八兩 刮白炙元武板八兩

大玄參八兩

粉丹皮一兩

大天冬三兩

炒杞子三兩

生杜仲三兩

奎潞黨二兩

薄橘紅一兩

虎脰骨二兩酥炙  
研細和入

生蒺藜去刺二兩

杭白芍酒炒一  
兩五錢

炒黃肉一兩五錢

酒炒懷牛膝三兩

炒絡石藤二兩

製西洋參二兩

煨磁石三兩

酒炒絲瓜絡一兩  
五錢

酒炒全當歸一兩  
五錢

白茯苓三兩

鹹秋石六錢

炒宣木瓜一兩五錢 海蛤粉包煎四兩

川貝母去心二兩

煨天麻一兩五錢

製半夏一兩五錢

右藥寬水煎三次。瀝去渣。再煎極濃。用陳阿膠三兩。桑枝膏五兩。溶化沖入收膏。每晨服六七錢。開水沖挑。

吳右 產育頻多。木失涵養。風木上干。胃土中州不舒。胃納因而日少。甚則涎沫上湧。有似溼從上泛之象。非溼也。正與厥陰篇中肝病吐涎沫之文相合。時輒不寐。所謂胃不和則臥不安也。然陽明之氣不衰。風木雖從上干。胃氣自能抵禦。何至土為木乘乎。陽明以通為用。則是通補陽明。平肝和胃為開手第一層要義。宜先用通補煎劑以治肝胃。俟胸寬納穀漸增。再以膏劑養肝之體。庶為得體。

人參鬚另煎沖入

製首烏三兩

厚杜仲二兩

阿膠珠一兩五錢

枳實一兩

製半夏一兩五錢

白歸身酒炒三兩

川斷肉二兩

炙黑草五錢

廣陳皮二兩五錢

炒杞子二兩

木瓜皮炒二兩

左牡蠣六兩

煨龍齒三兩

生於朮一兩五錢

酒炒杭白芍二兩

白茯苓四兩

白茯苓炒去刺三兩 炒棗仁炒三兩

奎黨參二兩

右藥寬水煎三次。濾去渣。加文冰三兩。收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

### 吐血

王左 勞傷中氣。火載血行。血從上溢。失血成盃而至。治以清理胃氣。和營降火。血得循止。然一涉勞動。又復帶紅。此絡未堅固。中氣未復。故一經火動。血即隨之擬益。其中氣清。其肺藏補。其腎水中氣足。則火莫能犯。肺氣清。則木不妄動。腎水足。則火有所制矣。

炙綿耆二兩

炙生地五兩

茜草炭一兩

赤白芍各八錢

澤瀉二兩

西潞黨參三兩

龜甲心刮白炙五兩

川石斛四兩

炒黑丹皮一兩

製西洋參二兩

炒牛膝三兩

生山藥四兩

生扁豆衣四兩

炒麥冬二兩

川貝母二錢

茯苓神各二兩

真阿膠二兩溶化沖入

右藥共煎濃汁收膏。每晨服一調匙。

遺精

王左 腎爲陰。主藏精。肝爲陽。主疎泄。故腎之陰虛。則精不藏。肝之陽強。則氣不固。所謂陽強者。卽肝藏所寄之相火強耳。乙木之陽不潛藏。甲木之陽乃漂拔。怵惕恐怖。甚至遺精。進以滋陰八味。病之大勢。遂定。以陰中伏熱。由此而泄耳。然諸恙雖平。而遺精數日必發。發必有夢。皆由病盛之時。肝陽相火內吸。致腎陰虛。而真水不能上承。心氣虛。而心陽輒從下墜。陽性本上。宜使之下。陰性本下。宜使之上。今陽下而陰不上。遂令陽不能收。陰不能固。遺精之來。大率爲

此。擬補氣以收心陽。肚水以升腎陰。卽請 正之。

炙綿耆四兩

炙熟地三兩

雞頭子二兩

煨龍骨三兩

煨牡蠣四兩

臺參鬚一兩三錢  
另煎沖入

炙生地四兩

生山藥三兩

龜板膠化入三兩

奎黨參三兩

潼沙苑鹽水炒三兩

桑螵蛸炙二兩

於潛朮炒二兩

茯苓神各一兩五錢

大天冬二兩

萸肉炭一兩五錢

柏子仁去油二兩

清阿膠化三兩

甘杞子三兩

生熟草各四錢

杭白芍酒炒一  
兩五錢

大麥冬去心二兩

酸棗仁二兩

肥知母去毛炒二兩

遠志肉八錢

益智仁一兩

龍眼肉三兩

右藥共煎濃汁。入水再煎。連煎三次。去枯渣收膏。或加白冰糖三四兩。熬至滴水成珠爲度。每晨服一調羹。開水沖挑。

徐左 夫精氣神者。人身之三寶也。論先天之生化。則精生氣。氣生神。論後天之運用。則神役氣。氣役精。人身五藏。各有所藏。心藏神。腎藏精。精藏於腎。而主於心。心君泰然。腎精不動。是爲平人。尊體氣陰。兩虧坎離。失濟心虛。易動腎虛。不藏神動於中。精馳於下。此夢遺。舊恙所由起也。遞進膏滋。遺泄漸減。藥能應手。未始無功。惟是補牢已晚。亡羊難復。久遺之後。腎陰大傷。腎者主骨。骨中有髓。腎之精也。腰爲腎之外候。脊乃腎之道路。腎精走失。骨髓空虛。脊痛腰痠。在所必見。肝爲乙木。中寄陽魂。胆爲甲木。內含相火。腎水既虧。豈能涵木。木失所養。水走火飛。相火不能潛藏。肝陽易於上亢。清空不空。則爲頭眩。清竅阻塞。則爲耳鳴。陰虛於下。火浮於上。上實下虛。亦勢所必然矣。症勢各類。治本一途。挈要提綱。補精爲重。補精必安。其神安神必益。其氣治病必求其本也。壯水以涵。

其木。滋陰以潛其陽。子虛補母。乃古法也。仍宗前意。再訂新方。補氣安神。育陰固泄。仿乙癸同源之治。爲坎離固濟之謀。復入血肉有情。填益精髓。復元精之走失。補奇脉之空虛。爲日就月將之功。作一勞永逸之計。是否有當。卽正。高明。

臺參鬚一兩五錢

潞黨參三兩

大熟地六兩砂仁拌

炙綿芪四兩

炒淮藥二兩

硃茯神三兩

酸棗仁三兩

炙遠志肉一兩

清炙草六錢

明天冬二兩

大麥冬二兩

厚杜仲三兩鹽水炒

甘杞子二兩

川斷肉二兩鹽水炒

桑椹子三兩

製首烏四兩

陳廣皮一兩

仙半夏二兩

北秫米三兩炒包

甯子淡四兩

煨牡蠣四兩

紫貝齒四兩

紫石英三兩

胡桃肉

二十枚鹽水炒去紫衣



五味子六錢

金櫻子一兩包

剪芡實三兩

川黃柏一兩

熟女貞二兩

猪脊髓二十條酒洗紅棗四兩

鱧膠二兩溶化收膏

右藥煎四次。取濃汁。加龜板膠四兩。清阿膠四兩。均用陳酒炖烱。再將鱧膠和入。白文冰半斤。溶化收成膏。每早晚各服二匙。均用開水化服。如遇外感暫停。

吳左 向有遺精。有時氣從上衝。則心悸驚怖。不由自主。甚則頭暈滿面作麻。牽及四肢。疊投壯水潛陽。甚合病機。足見陰精內虧。坎中之陽。不藏。少陽內寄。相火衝陽。上逆。則胆木撼動。陽得化風。上旋。宜以柔養鎮靜之品。俾水中之火。不致飛越。陰精自臻。固攝耳。

大熟地六兩

奎黨參三兩

湖蓮肉二兩

大生地四兩

生於朮二兩

甘杞子三兩

炒芡實二兩

大麥冬二兩

潼沙苑三兩

煨龍骨三兩

金石斛劈開三兩

粉丹皮一兩五錢

女貞子酒蒸二兩

生熟草各三錢

山黃肉炒一兩五錢

柏子仁去油一兩五錢

生牡蠣八兩

建澤瀉一兩

杭白芍酒炒一兩五錢

縮砂仁七錢另煎和入

生山藥二兩

淡秋石四錢

魚鱔膠二兩

白冰糖三兩收膏每晨服一調羹。

鮑左遺泄頻來數年不愈每至遺後飲食轉增若暫止之時飲食轉退蓋脾胃之運化原藉命火之蒸變而為出入腎水有虧坎中之陽不能潛藏擬以介類潛之。

生地炭三兩

炒雞頭子二兩

酒炒女貞子二兩

元米炒西黨參三兩

熟地炭四兩

旱蓮草二兩

炒山藥二兩

硃茯神三兩

煨龍骨三兩

牡蠣鹽水煨四兩

潼沙苑二兩

炒於朮一兩五錢

金色蓮鬚六錢

龜甲心刮白炙八兩 柏子仁勿研二兩

遠志肉七錢

大淡菜三兩

右藥煎汁收膏。

董左 心火炎上。水從下吸。斯火不上。騰腎水。就下。火從上。絜斯水。不下。淪水之與火。兩相交濟者也。每至心事急迫。輒氣從下注。有似陰精欲泄之象。皆由心腎兩虛。不能相濟。時為眩暈。亦陰不足而陽上升也。擬交補心腎。參以熄肝。

人參鬚五錢另煎濃湯和入

大熟地七兩

遠志肉炒六錢

柏子霜二兩

奎黨參五兩

元武板炙十兩

潼沙苑鹽水炒三兩 山萸肉一兩五錢

生熟於朮二兩

煨龍骨三兩

雞頭子炒三兩

杭白芍酒炒一兩半

黑豆衣三兩

製首烏四兩

炙綿耆三兩

生牡蠣四兩

池菊花一兩

炒山藥三兩

炙黑草七錢

當歸炭二兩

甘杞子三兩

白茯苓三兩

炒棗仁研一兩五錢  
澤瀉鹽水炒一兩

阿膠三兩

冰糖三兩

收膏。

■眩暈

任左 上則眼目昏花。下則陽道不通。有時火升面熱。稠厚之痰。從喉間咯出。或謂真陽式微。陽道閉塞。則眼目昏花。火升面熱。又係陰虛陽升明證。如以陽道不通。與火升目花。分爲兩途。則欲養其陰。必制陽光。欲助陽光。必消陰翳。未

利於此。先弊於彼矣。或者陰陽並虛。水火皆乏。庸有是理。然果水火皆乏。安能形氣皆盛。起居無恙乎。細察陽道不通。斷非陽衰不振。實緣腎水不足。虛陽盡越於上。陽不下降。所以陽道不通。與陽氣衰乏者判如霄壤也。脉象絃大。尤爲陽氣有餘之徵。擬每晨進育陰以潛伏陽氣。每晚進清化痰熱。備方如左。

大生地六兩

製首烏四兩

生甘草七錢

大熟地四兩

黑豆衣三兩

大天冬二兩

生牡蠣四兩

煨磁石三兩

大麥冬二兩

海蛤粉四兩

川石斛四兩

奎黨參四兩

生山藥三兩

浙茯苓三兩

川貝母二兩

西洋參二兩

甘杞子三兩

大元參三兩

生於朮二兩

粉丹皮二兩

女貞子酒蒸三兩

石決明打四兩

池菊花一兩五錢

橘紅鹽水炒一兩

酒炒白芍一兩五錢 潼沙苑鹽水炒三兩 牛膝鹽水炒三錢 澤瀉一兩五錢

右藥煎三次。去渣。用清阿膠三兩。龜板膠三兩。魚鱉膠二兩。溶化。沖入收膏。每晨服一調羹。再另用陳海螵三斤。洗極淡。用清水煎。漸漸收濃。加葶薺汁六兩。沖入。更加白冰糖二兩。收膏。每晚將臥時服半調羹。俱用開水沖挑。薛左平素痰多。漸起眩暈。始清痰熱。未能速效。繼進育陰以潛陽氣。眩暈纔得退輕。蓋脾爲生痰之源。胃爲貯痰之器。升降之機。肝合脾。主左升。胆合胃。主右降。惟胃有蘊聚之痰。斯胆失下行之路。於是甲木生火。火即化風。久之而水源亦耗。所以育陰之劑。獲效於後也。宜循經驗之法調理。

炙生地五兩

奎黨參三兩

粉丹皮二兩

滁菊花一兩

黑元參二兩

生於朮一兩

杭白芍

炒一兩五錢

廣橘紅一兩

竹瀝半夏一兩五錢 生甘草五錢

萸肉炭一兩

川石斛三兩

生牡蠣四兩

茯苓塊二兩

南花粉一兩五錢

川貝母去心一兩五錢

海蛤粉三兩包煎

大天冬二兩

石決明打四兩

煨天麻一兩五錢

肥玉竹二兩

白蒺藜去刺炒三兩 澤瀉一兩五錢

右藥寬水煎三次。去渣再煎極濃。用清阿膠龜板膠溶化沖入收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

秦左 陰虧不能制木。木旺化風。風壅陽絡。頭痛時作時止。風性鼓盪。心中怔悸。沖齡正在生發之秋。何至陰虧致疾。蓋其陽氣日充。稟先不足之軀。陰即不能配合。陽氣相衡之下。不能相偶者。即形其相絀也。宜壯水之主。以配陽光。

大熟地三兩

川芎一兩

茯苓二兩

酸棗仁炒打二兩

石決明打三兩

大生地三兩

炒杞子二兩

澤瀉一兩五錢

元武板十兩

生甘草三錢

炒香玉竹二兩

酒炒杭白芍一兩五錢

桑葉一兩五錢  
另煎沖入

廣皮一兩

上黨參三兩

炙鱉甲七兩

炒菊花一兩

黑山梔二兩

煨牡蠣三兩

白歸身二兩

大有耆炙鹽水二兩粉丹皮二兩

野於朮一兩五錢

鹽水炒潼沙苑三兩

黑大豆二兩

龍眼肉二兩

共煎濃汁。加真阿膠三兩。溶化沖入收膏。

■耳鳴

黃左 痰熱有餘。甲木少降。乙木過升。致痰生熱。熱生風。爲耳鳴。爲重聽。胃爲中樞。凡風陽必過陽明而後上旋。陽明爲十二經之總司。所以肩臂背肋。不時



注痛。所謂下虛而上實也。擬壯水育陰。以涵肝木。而以清化痰熱參之。

大生地八兩

淨柴胡

七錢另煎湯收膏時沖入

白蒺藜三兩

生山藥二兩

西洋參四兩

龜板膠

四兩溶化沖入

清阿膠

二兩溶化沖入

炒杞子三兩

橘紅鹽水炒一兩

竹瀝

五兩滴入蓋汁三分沖

茯苓各一兩

枳實一兩

大麥冬四兩

橄欖膏五兩沖入

上綿耆鹽水炒二兩

竹瀝半夏二兩

稽豆衣三兩

粉丹皮二兩

奎黨參四兩

黑山梔二兩

煨磁石四兩

懷牛膝鹽水炒三兩

杭白芍酒炒三兩

澤瀉一兩五錢

秦朮一兩五錢

右藥共煎濃汁。加白蜜三兩。沖入收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

失眠

蔣左 心主靈明。膽主決斷。靈明所至。雖虛幻之境。可以意搆。惟有膽木決斷。平其間一舉一動。方能合節。今診脉象細絃。關部堅硬。人迎浮露。舌苔薄白。良以營分不足。木少滋濡。厥陽上升。甲木漂拔。失其決斷之職。神情爲之妄亂。目不交睫。刻下難臻平定。而腹撐頭暈。還是木旺見端。擬平肝甯神。交通水火。

大生地四兩

製洋參二兩

立武板三兩

金鈴子二兩

白歸身二兩

煨龍齒二兩

製香附四兩

製半夏三兩

縮砂仁八錢

白蒺藜二兩

上黨參三兩

新會皮一兩

小青皮一兩

厚杜仲三兩

炒牛膝二兩

川斷肉三兩

沉香麴三兩

遠志肉五錢

石菖蒲四錢

硃茯神二兩

杭白芍一兩五錢

野於朮一兩二錢枳實  
二兩二錢同炒

辰砂拌麥冬一兩  
五錢

菊花一兩

右藥如法。共煎濃汁。連煎三次後去渣。將藥汁徐收。再用真阿膠三兩溶化。沖下收膏。每日清晨沖服三錢。

羅左 始患痔漏。繼則不寐。痔漏傷陰。陰傷及氣。氣陰不足。氣不能配陽。陰虛及陽。故爲不寐。不寐之因甚多。而大要不外乎心腎離中一陰。是爲陰根。陰根下降。是生水精。坎中一陽。是爲陽根。陽根上升。則爲火母。坎離交濟。水火協。陽入於陰。則爲寐。陽出於陰。則爲寤也。腎陰不足。水不濟火。心火不能下通於腎。腎陰不能上濟於心。陽精不升。水精不降。陰陽不交。則爲不寐。此不寐之本也。肝爲乙木。內寄陽魂。胆爲甲木。內含相火。平人夜臥。魂歸於肝。陽藏於陰也。腎陰虧耗。水不涵木。肝不能藏其陽。魂胆不能秘其相火。神驚火浮。亦爲不寐。此不寐之兼見也。離處中宮。坎居下極。位乎中而職司升降者。脾胃也。胃以通

爲補脾以健爲運。脾失健。運胃失流通。中宮阻塞。不能職司升降。上下之路。隔絕。欲求心腎之交。不亦難乎。故經云。胃不和則臥不安。胃不和者。不寐之標也。道書云。離爲長女。坎爲少男。而爲之媒介者。坤土也。是爲黃婆。其斯之謂乎。錯綜各說。奇偶製方。益氣以吸陽根。育陰以滋水母。升戊降己。取坎填離。益氣卽所以安神。育陰亦兼能涵木。標本同治。以希弋獲。是否有當。卽正 高明。

清炙綿芪四兩

上潞黨參四兩

大生地四兩

抱茯神三兩 硃砂拌

大熟地四兩

炙遠志肉一兩

清炙草六錢

酸棗仁三兩

仙半夏二兩

北秫米三兩包

明天冬一兩五錢

大麥冬一兩五錢

炒淮藥二兩

甘杞子二兩

生牡蠣四兩

廣橘白一兩

白歸身三兩

大白芍三兩

花龍骨二兩

青龍齒二兩

紫石英三兩

炙鱉甲三兩

川石斛三兩

馬料豆三兩

潼蒺藜三兩

紫丹參二兩

川貝母

二兩另去心  
研未收膏

製首烏六兩

合歡花一兩五錢

蓮子二兩

紅棗六兩

雞子黃

十枚另打  
攪收膏

右藥煎四次。取濃汁。加龜板膠四兩。清阿膠四兩。均用陳酒炖化。白冰糖半斤。融化。再將川貝雞子黃依次加入。攪和收膏。每早晚各服二匙。均用白開水沖服。

■多寐

盛左 脉象濡滑。左尺少力。右尺沉細。壯盛之年。雖不至疾痛纏綿。而神情疲弱。時多迷睡。考傷寒六經。惟少陰篇有欲寐之文。良由命陽不振。陰濁瀰漫。胸中陽氣失曠。宜于調攝之中。仍寓掃蕩陰霾之意。庶與少陰篇之章旨符合也。

炙綿耆四兩

製半夏三兩

別直參二兩另煎沖入

兔絲子鹽水炒二兩

炒杞子三兩

厚杜仲三兩

潼沙苑鹽水炒二兩  
大生地薑汁炙三兩

奎黨參二兩

熟附片七錢

杭白芍酒炒一兩五錢

破故紙鹽水炒三兩

廣橘紅一兩三錢

淡荵蓉一兩五錢

製首烏切六兩

炒於朮二兩五錢

山萸肉一兩五錢

淡乾薑五錢

白茯苓三兩

炙黑草六錢

枳實八錢

肥玉竹二兩

澤瀉二兩五錢

霞天麴炒二兩

陳阿膠二兩溶化沖入

血鹿片三錢另煎沖渣焙乾研末和入

右藥寬水煎三次。去渣再煎極濃。加白冰糖二兩收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

厥症

蔣右 形體蒼瘦。陰虛多火之質。春升之令。忽然發厥。當時神情迷憤。頃之乃醒。前診脈絃微滑。良以相火風木司年。又當仲春升泄之時。陰虛之人。不耐升發。遂致肝藏之陽氣。一時上冒。故卒然而厥也。調理之計。惟益其陰氣。使之涵養肝木。參鱗介之屬。以潛伏陽氣。

炙熟地三兩

西黨參四兩

小黑豆三兩

煨龍骨三兩

炒牛膝二兩

炙生地三兩

煨牡蠣三兩

生鱉甲六兩

煨決明四兩

澤瀉一兩五錢

龜甲心刮白炙八兩  
白歸身炒二兩

杭白芍酒炒一兩五錢

粉丹皮一兩五錢

女貞子酒炒三兩

炒於朮一兩五錢

右藥如法共煎濃汁。濾出渣。入水再煎。去枯渣。獨取濃汁。炭火收膏。藏磁器內。每晨服一匙。開水沖挑。

痞滿

沈右 腎水不足。厥陽有餘。上衝胃土。則胃氣不降。中脘痞滿。歷投苦辛通降。及鎮逆諸法。漸得舒暢。夫六府以通為用。似不宜更進陰柔。然胃之不降。木犯之也。木之所以。上犯。剛太過也。涵木者。水也。腎為起病之源。胃乃傳病之所。所以胃既通降。即進柔養。其少寐易汗等症。次第而退也。服食調攝。宜踵此擴充。

大生地 薑汁炒五兩 製首烏五兩

炙熟地三兩

白蒺藜 鹽水炒一兩

生於朮 一兩五錢用木香四錢煎湯

煨龍骨三兩

潼沙苑 鹽水炒一兩 小兼條參 七錢另煎沖

柏子仁 去油二兩

縮砂仁 六錢另研詳入

川貝母 一兩五錢

光杏仁 打三兩

酒炒歸身二兩

木瓜皮 炒一兩

夜交藤三兩

橘皮一兩

酒炒白芍 一兩五錢

乾枇杷葉 去毛包三兩

甘杞子三兩

煨牡蠣四兩



炒山藥三兩

茯神二兩

乾菴蓉二兩五錢

薑半夏一兩五錢

生熟草各三錢

炒棗仁研二兩

厚杜仲三兩

炒枳殼八錢

澤瀉一兩五錢

右藥煎三次。去渣再煎極濃。用阿膠三兩。龜膠二兩。鹿角膠八錢。溶化沖入。加白冰糖收膏。清晨服六七錢。漸漸加至一兩。開水沖挑。

楊右 氣滯則腹滿。陽升則偏左頭痛。而眩暈耳鳴。氣何以滯。生升之性不能。遂其扶蘇條達也。陽何以升。剛藏而失涵濡。所以在下則爲氣。在上則爲陽矣。宜養其體之不足。而疎其用之有餘。

大生地砂仁炙四兩 嘗首烏切六兩

製香附打二兩九錢 澤瀉一兩

大熟地砂仁炙五兩 奎黨參四兩

桑葉一錢五分另煎沖入

厚杜仲三兩

白歸身酒炒二兩

生於朮一兩五錢木香五錢煎收

白蒺藜炒去刺三兩炒山藥三兩

粉丹皮二兩

川斷肉二兩

黑豆衣二兩

硃茯神三兩

杭白芍酒炒三兩

金鈴子切二兩

川芎蜜水炒一兩

新會皮一兩二錢

生熟甘草各三錢

滁菊花一兩

酸棗仁炒并二兩麩炒枳殼一兩

炒杞子三兩

右藥如法寬水煎三次再煎極濃用清阿膠三兩溶化沖入白冰糖二兩文火收膏每晨服一調羹開水沖挑

### ■ 瘕聚

梁右 左臍旁瘕聚已久發則攻築為痛為脹偏右頭疼略一辛勞輒綿綿帶下良以木鬱不條達厥陰之氣滯積成形下為瘕聚上為乳癥木旺而陽氣上

升。是為頭痛衝氣不和則奇脉不固以致脂液滲泄木鬱宜舒而肝為剛藏其體宜柔。從養血之中參疎肝調氣法。

大熟地 五兩

奎黨參 四兩

清阿膠 四兩溶化沖入

龜板膠 三兩溶化沖入

大生地 六兩

炒杞子 三兩

青皮 蜜水炒一兩五錢

白蒺藜 炒去刺三兩

全當歸 酒炒一兩五錢

黑豆衣 三兩

小茴香 炒八錢

製香附 研一兩

杭白芍 酒炒二兩

製首烏 切五兩

麩炒枳殼 一兩

柏子仁 去油三兩

川芎 一兩

金鈴子 切一兩

茯神 三兩

山梔 薑汁炒二兩

滁菊花 一兩

厚杜仲 三兩

肥玉竹 三兩

炙甘草 七錢

龍眼肉 四兩

淮小麥 四兩

酸棗仁 炒研二兩

大南棗 五兩

右藥共煎濃汁。加白蜜三兩。沖入收膏。每晨服一調羹。開水沖挑。

龜背

徐左 任行於前。督行於後。又督脉者所督護氣血經絡者也。龜背高凸。先天稟賦有虧。兩膝臏時作痠痛。肝腎之空乏已甚。神疲力少。時或凜熱亦固其宜矣。治宜大益肝腎。並補八脈。

大熟地薑汁炒四兩 炒杞子二兩

茯苓二兩

炒牛膝二兩

炙草三兩

大生地煎汁炒二兩 大有耆三兩

製半夏二兩

金毛脊去毛切三兩

白歸身酒炒一兩五錢

杭白芍酒炒二兩

東洋參炒二兩

川斷肉二兩

新會皮一兩

乾菴蓉一兩

澤瀉一兩五錢

野於朮三兩

厚杜仲二兩

熟地片三兩

粉丹皮一兩

炒山藥二兩

山萸肉一兩

製首烏三兩

鹽水炒兔絲子二兩

右藥煎濃汁。加龜板膠二兩。真阿膠二兩。鹿角膠三兩收膏。

調經

林右 陰分久虧。木失涵養。肝強木燥。生火生風。陰血為熱所迫。不能固藏。經水反多。甚至一月再至。營血由此更虧。陽氣化風。上旋為頭暈。撼擾神舍。為心悸。為火升轟熱。諸虛象雜陳。脉形絃細。左部澀弱。且有數意。陰弱陽強。急宜養血。益陰以配合陽氣。庶不致因虛致損。因損不復耳。

大生地五兩

西洋參三兩

酸棗仁炒研二兩

厚杜仲三兩

茯神二兩

大熟地三兩

奎黨參四兩

潼沙苑鹽水炒三兩

樗白皮炒黑一兩五錢

製首烏三兩

生於朮二兩

大天冬四兩

川石斛四兩

生山藥三兩

柏子仁去油二兩

烏賊骨炙四兩

當歸炭 一兩五錢

粉丹皮 一兩五錢

炒黃肉 二兩

大麥冬 二兩

早蓮草 二兩

池菊花 七錢

地骨皮 二兩

杭白芍 酒炒 二兩

細子芩 一兩五錢 防風 七錢 汁收入

香附 蜜水炒 一兩五錢

黑豆衣 三兩

橘白 七錢

女貞子 酒蒸 二兩

生熟草 各四兩

右藥寬水煎三次。去渣再煎極濃。加清阿膠三兩。龜板膠三兩。溶化沖入收膏。以滴水成珠為度。每晨服一調羹。開水沖挑。

### 白帶

孫右 久帶不止。液耗陽升。頭眩暈。肝腎空乏。足膝作痠。帶脈者如帶之圍。繞為一身之約束。帶脈有損。則脾胃之溼。由此滲溢。脂液由此俱耗。宜補益中氣。兼攝脾腎。

炙綿耆三兩

炙熟地五兩

兔絲子鹽炒炒三兩

破故紙鹽水炒二兩

西黨參四兩

茯神二兩

煨牡蠣四兩

野於朮炒二兩

厚杜仲三兩

製首烏四兩

潼沙苑鹽水炒三兩

穉豆衣三兩

炒山藥二兩

白歸身酒炒二兩

酒炒杭白芍二兩

金毛脊去毛切四兩

炒杞子三兩

法半夏二兩

炒川斷肉三兩

土炒新會皮一兩

炒菊花一兩五錢

共煎濃汁。溶入真阿膠三兩。收膏。

產後

裴右 產育頻多。營血虧損。木失涵養。陽氣升浮。夏月陽氣泄越之時。往往頭  
脹眩暈胸悶。若係痧脹。無動輒即發之理。其所以屢發者。亦由陽氣之逆上也。

茲又當產後。營氣更虧。少陽之木火勃升。胸悶頭暈汗出。手足烙熱。咽痛音暗。蓋少陰之脉。少陽之脉。皆循喉也。育陰以涵陽氣。是一定不易之道。但泄少陽清氣熱之藥。不能合入膏方。另以煎藥參服爲宜。

大生地四兩

西洋參三兩

大天冬二兩

金石斛三兩

遠志肉七錢

山萸肉一兩五錢

酸棗仁炒研二兩

生熟草各五錢

女貞子酒蒸三兩

大熟地四兩

黑豆衣三兩

肥玉竹三兩

製首烏五兩

大麥冬二兩

甘杞子三兩

石決明打八兩

白歸身酒炒二兩

潼沙苑鹽水炒三兩

奎黨參四兩

製香附打三兩

生山藥三兩

生牡蠣八兩

茯神三兩

杭白芍酒炒二兩

新會皮一兩五錢



右藥如法共煎濃去渣。用清阿膠三兩。龜板膠二兩。溶化沖入收膏。或加白冰糖三四兩亦可。每晨服一羹。開水沖挑。

求嗣

魏右 經事無故而不受孕。平日間亦無他恙。惟時爲昏暈。或四肢烙熱而痿。楚少腹時滿。脉大有力。蓋氣鬱則生熱。熱從內吸。則子宮枯燥。不能攝精。熱盛則生風。風陽鼓旋。則頭眩。暈脉絡不和。養血益陰。固屬要圖。而泄熱調氣。尤爲急務。非大劑補益。便爲良法也。

大熟地 砂仁炙五兩 黑元參三兩

大連翹三兩

白蒺藜炒去刺三兩

大生地 薑汁炙五兩 櫓荳衣三兩

黑山梔三兩

四製香附研四兩

大麥冬 二兩五錢 製首烏切五兩

晚蠶沙包煎三兩

全當歸二兩五錢

製洋參三兩

奎黨參四兩

炒杞子三兩

粉丹皮二兩

淡天冬二兩

滁菊花二兩

乾荷邊二兩

縮砂仁一兩另煎沖

杭白芍一兩五錢

半夏麴鹽水炒二兩五錢

松蘿茶二兩

桑寄生三兩

右藥共煎濃汁。用清阿膠三兩。龜板膠二兩。白冰糖三兩。溶化沖入收膏。以滴水成珠爲度。每晨服一調羹。開水沖挑。

# 家庭醫藥常識叢刊

## 出版預告

▲第一集 驗方類編

▲第二集 百病通論

▲融化學說經驗于一爐

▲不啻家庭醫藥之顧問

本局專行發售中醫書籍。宣傳中醫文化。對於醫界之貢獻。可謂不遺餘力。惟于病家方面。殊鮮顧及。深引為憾。竊念病家之需要。凡一二為靈驗方劑。以備急救。一為醫藥常識。俾資攝養。爰特聘請中國醫學院教務主任秦伯未先生。從事編輯。秦君學識既高。經驗又富。而此書之作。更願以十年心得。儘量披露。自當倍見精彩。切合實用。不日可以脫稿。決定年內出版。為普及起見。定價特別從廉。初版印一萬冊。如有願附印贈送者。請即來局接洽。當照成本發售。特此佈告。

上海山東路A字一號中醫書局啓

# 國醫製藥公司

監製各種靈驗良藥

## 疳積金丹

每丸實售大洋五角

小兒疳積一症。總由血氣虛憊。腸胃受傷所致。多見面色青黃。身瘦腹痕。髮立骨蒸。腹中微痛。頭縮鼻乾。口噤唇白。焦渴自汗。尿濁瀉酸等症。實為阻止小兒發育之勁敵。此丹特請海上諸名醫審定試用。咸認為有特殊之功效。可謂疳積之無上妙方。兒童之第一金丹也。每丸分兩次服。服法詳仿單。如蒙採購。請認明佛手商標為要。

## 婦女平肝丸

每瓶實售大洋七角

按婦女以肝為先天。因婦女以血為主。而肝臟藏血獨多也。故婦女於肝病特多。如肝勞肝厥。肝脹肝嗽。肝氣肝陽。及因肝而脅痛眩暈泄瀉嘔吐等症。恆於婦女見之。本公司爰請海上諸名醫會製此丸。細諸學說。參以經驗。有疎肝而不損氣血。補肝而不生壅滯之妙。凡屬婦女一切肝病。莫不奏效如神。每瓶分兩次服。服法詳仿單。

總代售處

上海 山東 路麥 家園 天安 堂後 面A 一號 中醫 書局

幼科 第一 善本 幼科 易知錄 清代 吳溶 堂著

▲內容豐富

▲綱舉目張

▲嬰兒之福音

▲家庭之寶筏

本書係吳溶堂著。專為普通人說法。故用筆淺顯。方藥精粹。上采為鞠養類。有拭口洗兒斷臍等一十五法。下卷為胎疾類。有不啼不乳目不開吐不止等六十八症。補編為雜症類。有外感內傷瘡瘍等四十五種。集幼科之大成。為兒童之保障。凡有子女者。不可不備一編。以資參考。

▲全書一厚冊

▲用大字排印

▲定價五角六折

▲中醫書局發行

家庭 必備 普濟良方 德軒 氏輯

▲靈驗簡要

▲遠勝驗方新編

▲人手一冊

▲可以無醫自療

本書係德軒氏輯。早經馳譽醫林。計有急救八十三方。瘡毒五十五方。婦女四十三方。小兒三十二方。雜症七十一方。法法可施。方方有效。誠為普濟人羣之寶筏。較之驗方新編之取材既繁。非知醫不能擇用。藥料多僻。非咄嗟所能立致者。不可同日而語。實養生者亟宜購置者也。

▲全書一冊

▲鉛字排印

▲定價二角六折

▲中醫書局發行

軍力生之界醫中

# 中 醫 世 界

秦伯未方公溥主編——中醫書局發行

(宗旨) 本局有鑒中醫處于今日地位對於西醫之囂張不可不有相當之評論中醫之學術不可不有精密之改進爰特發行本雜誌以應時代之需要

(編者) 本局為慎重計特請中醫界素負盛名之秦伯未方公溥先生主編並請本外埠名醫顧惕生丁福保謝利恆張錫純丁仲英嚴蒼山等二十餘人為特約撰述切實從事以饜閱者

(內容) 分小評論壇發明改革研究常識驗方醫案消息等十餘類其他對於中醫界有貢獻之文字亦儘量採納務求完美

(定價) 每二月出一期約一百頁實價大洋二角定閱全年計六冊實價一元一角郵費六分

(特點) 本雜誌每期均增刊醫界書畫銅版每年出特刊二種內容加增定閱者不另加費以示優待實吾中醫界之生力軍而研究中醫者不可不購以資研究也

上海姜衍澤堂發記老藥鋪製售

內科專家秦伯未先生製方

婦女白帶丸

諺云。十女九帶。甚矣婦女帶病之多。不可不有良藥以服制之也。致帶下一症。無非帶脈為病。帶脈起於季脅。纏束諸脈。不使妄行。如束帶然。為一身之樞紐。上而心脾抑鬱。氣不運行。下而肝腎虛敗。真陰不足。必致停濕蘊熱。下注而流白物。傅青主以濕熱立治法。自是破的之談。其完帶湯加減逍遙散易黃湯利火湯。方藥俱佳。然但就初起時而言耳。若久病之人。亦以清利濕熱為主。五臟精液。勢必愈利愈虧。蓋久病宜益氣固精。補血存液為要。再佐以升提諸味。則庶幾無誤。方鍼凡病分初中末三期。帶下亦何獨不然哉。秦伯未先生治婦女症。獨擅勝場。本經驗之所得。學理之所獲。成婦女白帶丸。方治婦女白帶。腰腿痠痛。頭暈眼花。精神不振。面萎無光等症。不論久暫。莫不見效。且方中面面俱顧。不留遺陷。補不妨利。利不碍補。故服後永不復發。更無遺患。茲由本號商請秦先生將該方歸本號製售。以利病家。特綴數言。為婦女界同胞告云。

(服法)每瓶分三服。每日一次。空腹開水吞下。(奏效)症淺日角者。一瓶即見效。症深日久者。連服三瓶。(特長)元氣不受傷。愈後不復發。(價售)心在濟世。不敢牟利。照成本每瓶實售大洋七暫。

上海小南門外大街新建築洋房  
姜衍澤堂發記老藥鋪謹啓

# 秦伯未醫家著述批校各醫書

清代名醫醫案精華	四冊	中醫書局發行
清代名醫醫話精華	四冊	中醫書局發行
讀內經記	一冊	中醫書局發行
內經類證	一冊	中醫書局發行
難經註疏	一冊	中醫書局發行
膏方大全	一冊	中醫書局發行
全生指迷方	一冊	千頃堂書局發行
本草詩牋	四冊	千頃堂書局發行
本草分經	一冊	千頃堂書局發行
醫經原旨	四冊	千頃堂書局發行
醫學見能	二冊	學海書局發行
國醫小史	一冊	學海書局發行
溫熱類編	四冊	杭州三三醫社發行



中華民國十八年九月印行

膏方大全

一冊 定價大洋三角

編纂者 上海 秦伯未

參校者 普寧方公溥

發所者 四明錢季寅

印刷者 中醫書局印刷部

發行行 上海中醫書局

(山東路A字一號)

分售處 台灣嘉義西門前市場街  
蘭記圖書公司

版權所有 禁止翻印

中國書局