

遠西醫方名物考

安

卷十五

武  
857  
45-15

學大田稻早	館書圖
庫文田內者托寄	號七六一第書托寄
號	冊
冊	冊



武門  
857  
卷 45-15



遠西醫方名物考標目

卷十五

安質沒扭謨

安質沒扭若波列

暹篤綸安質沒扭

鞞爾答律斯越默室屈私

爽涼催吐飲

潤燥催吐飲

治癩驗方

亞爾瓦碌扶散

赫篤綸安質沒扭

大正七年九月八日  
內田采子氏贈



遠西醫方名物考 卷十五 標目

安質没扭酒

默他兒雜腹蘭

歇巴兒安質没扭

默他兒雜腹蘭酒

亞括別涅實屈多律蘭地

默他兒發汗酒

金硫黃

芙蓉黃龍散

金黃排毒飲

芙蓉黃石散

結爾茂斯密涅刺列

遠西醫方名物考卷十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補



安

安質没扭アンテモニウハ 謨ハ 羅ハ スピースガラスハ 蘭ハ

○按ニ此物 本邦伊豫出羽陸奥等其他諸州ノ  
礦坑ヨリ多ク出ル一種ノ礦ナリ伊豫ノ方言マ  
テガラスト云。火ニ投メ硫黃臭ノ烟氣アリ○榕按  
ニ銻石。和漢ノ産數種アリ多クハ方形ヲ爲ス或  
ハ稀ニ扁ナル者アリ其他形狀一ナラズ鐵色或  
ハ銻色或ハ鉛色或ハ綠色アリ右ノ諸品ヲ火ニ

遠西名物考 卷十五 風雲堂藏

投スレバ皆青焰ヲ發シ硫黃氣アリ故ニ安質没  
 扭謨ノ類トス然レモ安質没扭謨ニ方解石様ノ者  
 アル説ヲ見ズ。故ニ安質没扭謨ヲ以テ直ニ鉛石  
 ニ充ルハ未ダ當否ヲ詳ニセズ。凡ソ物體ノ方形ヲ  
 爲シ或ハ三稜等多少ノ尖稜ヲ爲ス者ハ必ズ然  
 ル所以アリテ各其質ヲ異ニスル説アレバナリ  
 形状安質没扭謨ハ諸鑛坑七金ノニ出ル一種ノ鑛  
 ナリ甚ダ諸金類ニ近シ然レモ其質破碎スベキガ故  
 ニ諸金ニ屬セズ半金ノ屬トス諸金ト石トノ間ニ  
 大小塊片ヲ爲シ形チ一ナラズ重クノ石ノ如ク

鉛色ニノ束鍼紋ヲ爲シ光輝アリ堅固ニノ破碎シ  
 易シ或ハ岩石ニ著ク者アリ或ハ透明ノ紋理及ビ  
 鑛様ノ石英ヲ夾ミ或ハ琢磨セル鐵及ビ鉛ノ如ク  
 或ハ銀色ノ光彩或ハ黑色ノ光澤アリ或ハ光輝ア  
 ル葉片ヲ爲シ脆ク碎ケ易ク或ハ破碎スレバ氷裂  
 紋ヲ爲シ或ハ帶黃若クハ帶赤ノ斑點アル者アリ  
 ○坑ヨリ出テ未タ煨煉セザルヲ子子ラアンチモ  
 ニト名ク純潔ニノ他物ヲ雜ヘザルヲ上品トス然  
 凡多クハ純潔ナラザル故ニ坑戸是ヲ熔トカノ土石等  
 ノ汚物ヲ去リ尖形ノ塊ヲ爲ス此即チ尋常藥用ノ

遠西名物考 卷十五

風雲堂藏

品ニノ是ヲ生安質沒扭謨ト名ク其製法左ノ如シ  
**製法** 一個ノ陶壺ヲ取り其上端マデ土中ニ埋メ鐵  
 版ニ許多ノ小孔ヲ穿テ其壺上ニ置キ安質沒扭ノ  
 礦ヲ碎キ他ノ陶壺ニ内レ是ヲ倒ニメ鐵版上ニ載  
 セ其周圍炭火ヲ積ニ燒クハ其礦熔テ土石等ノ汚  
 物ハ版上ニ残り精粹ノ者ハ版ノ小孔ヨリ流下リ  
 テ下壺ニ聚リ塊ヲ成シ鉛黑色ニメ光彩アリ束鍼  
 紋微細ニ錯綜シ重ク堅クメ破碎シ易ク淨潔ナリ  
**又法** 安質沒扭ノ礦ヲ坩鍋ニ内レ火ニ上セテ焔化  
 シ網杓子ニテ其汚物ヲ抄ヒ去リ放冷ノ其壺ヲ破

リ純潔光輝ノ束鍼紋アル者ヲ擇ミ取ルナリ○製  
 煉術ニテ安質沒扭ヲ焔シ其質ヲ研究スルニ是レ一  
 種ノ元素補卷ナリ然レ山坑ニ出ル者ハ必ス硫黃ヲ  
 含ム是ヲ製煉ノ硫黃ヲ脫スレハ純粹トナル是ヲ  
 安質王ト曰フ安質王ハ原名コレギアアンテモニ凡  
 二含所ノ夾雜物ヲ脫ノ純粹ノ○安質沒扭ヲ焔炒  
 金屬ト爲者是ヲ總テ王ト稱ス  
 スレバ灰色ニメ石灰様トナル烈火ニ上セ燒ケバ  
 溶テ遂ニ淡赭色ノ硝子トナル  
**主治** 製煉術ニテ安質沒扭ニ含メル硫黃ヲ分チ去  
 リ純粹ノ質ト爲ス片ハ一種ノ毒トナリ是ヲ服ス

本草綱目卷之五 風雲堂藏

レバ烈ク吐ス。但、硫黄ヲ分<sup>カ</sup>タズ唯溶<sup>トカ</sup>ノ汚物ヲ去ル  
ノミナレバ硫黄ヲ混和スルニ由テ本性ノ毒ヲ發  
スル<sup>ト</sup>能ハズ。一二錢内服スト雖モ惡心嘔吐ヲ發  
セズ唯輕ク發汗シ粘液ヲ稀釋ノ驅除ス。○一月ヨ  
リ二錢マデ水煎シ或ハ末トシ或ハ是ヲ<sup>子リ</sup>砥劑ニ加  
ヘ毎日用テ粘痰ヲ疏釋シ稠厚ノ血液ヲ稀解シ表  
發ノ蒸氣ヲ驅發シ頑癬諸惡瘡惡厲ノ頭瘡等總テ  
酷厲液ヨリ發スル經久ノ皮病ヲ治ス。但、水煎ニハ  
薩撒弗刺斯。土茯苓等ノ粘稠ヲ稀釋スル藥ニ加ヘ  
煎湯トシ用テ尤<sup>モ</sup>良。發汗ノ諸瘡ヲ治シ殊ニ微毒ノ

諸症ニ効アリ。○酸敗液多キ症或ハ多ク酸味ノ飲  
食ヲ用ヒテ此藥ヲ服スレバ其酸性ヲ以テ是ニ含  
メル硫黄ヲ分離シ其毒性ヲ逞<sup>フ</sup>ノ劇ク嘔吐下利  
スル<sup>ト</sup>アリ故ニ生安質沒扭ヲ用ヒテ絶<sup>タ</sup>テ害ナシ  
ト言<sup>イ</sup>ガタシ。○此物ハ製劑トシ用ヒテ奇効ヲ奏ス  
ル藥トス。次ニ記ス諸<sup>ニ</sup>製劑<sup>ヲ</sup>云。故ニ多ク製シ用フ。○膏藥ニ  
加ヘ外敷ノ潰瘍ヲ乾<sup>カ</sup>シ洗藥トシ<sup>テ</sup>焮腫眼ヲ治ス。○  
畜類ニ用レバヨク肥腴セシム。<sup>痲</sup>瘋<sup>痲</sup>瘋<sup>痲</sup>  
安質沒扭。若波列。<sup>ア</sup>ン<sup>テ</sup>モ<sup>ニ</sup>ツム<sup>、</sup>デ<sup>ア</sup>ポ<sup>レ</sup>チ<sup>キ</sup>ム<sup>、</sup>シ<sup>ム</sup>ガ<sup>ラ</sup>  
ス<sup>、</sup>發<sup>汗</sup>安<sup>質</sup>沒<sup>扭</sup>ノ<sup>義</sup>

本草綱目卷之五 風雲堂藏

製法

安質沒扭

消石

極細末トシ火モ光彩  
ナキニ至ル者 一比  
精製者極細末トス  
二比半

右研和ノ黒色ト爲ルニ至リ。坩鍋ヲ火ニ上セテ通  
紅ナラシメ。右ノ細末一匙ヲ取テ其坩ニ投スレバ  
爆聲ヲ發ス。鐵篋ニテ是ヲ攪セ爆聲止ニヨク燒テ  
赤色トナルニ至テ又其末一匙ヲ投ノ前法ノ如ク  
シ數斯ノ如クメ其末ヲ燒盡シ融化ノ後尚火上ニ  
置テ八分時ニメ放冷スレバ白色ノ凝塊トナル。是  
ヲ末トシ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。否ラザレバ濕  
リテ酷厲ノ性トナル。○此劑一比ニ蒸餾水十比

ヲ加テ溶化シ是ニ綠礬油ヲ滴シ加テ火モ沸騰セ  
ザルニ至リ又沸湯ヲ加ヘ攪セ靜定ノ上清ヲ傾ケ  
去リ數回斯ノ如ク沸湯ヲ加ヘ洗淨ノ其液必モ味  
ナキニ至リ其末ヲ取リ乾シ貯フ是ヲ洗淨安質沒  
扭ニ。ゴヤホレ若波列ト名ク○蒲爾花歇ブルハハ人ノ説ニ是ヲ洗淨ス  
レバ安質沒扭ニ含ム剥篤亞斯ヲ脫除スル故ニ此  
劑良効ナシト云晩近ノ説ハ其加所ノ綠礬油ト剥  
篤亞斯ト親和抱合スル故ニ剥篤  
亞斯毫モ水ニ溶解セズノ安質沒扭流散セ  
ズ故ニ是ヲ洗ト雖モ其効少モ減セズト云  
主治 發汗ノ良劑トス啻ニ汗及ビ蒸氣ヲ發スルノ  
ミナラズ小便ヲ利シ閉塞ヲ開キ血中ノ諸毒ヲ排

泄シ酷厲液ヲ消散シ水腫。諸頑固ノ腫病。傷冷毒。流走痛。頭痛。痘瘡。下利等總テ汗解ノ治スベキ病ニ用ヒテ其鬱毒ヲ驅泄スルニ大効アリ○服量一ノヨリ半錢マデ温液ニ和シ臨卧ニ用ヒ兼テ熱飲ヲ服シ温覆ノ發汗ヲ助クベシ醫國

**暹篤綸** 安質沒扭 羅 「ニットリムスチビアテム」 羅

**製法** 安質沒扭若波列ノ細末ヲ温湯ニテ數回

淘洗シ其湯終ニ味ナキニ至リ其液ヲ硝子壘ニ内レ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾白ノ塊ト爲シ貯フ或ハ右ノ液ヲ蒸散ノ半ヲ減シ冷處ニ置テ芒ヲ結

バシメ其芒ヲ取り硝子壘ニ收メ貯フ

**主治** 壯熱ヲ清凉シ閉塞ヲ開達シ發汗利尿ノ良効アリ壯熱病。炊衝。痘疹。胸脇焮痛。間歇熱。黃疸ヲ治ス○服量十氏ヨリ一ノマデ飲液ニ和シ用フ醫

**韃爾答律斯** 越黔室辟松 羅 「ブライク左インステイン」 蘭

**製法** 亞爾瓦碌扶散 九錢 後ニ出ツ

酒石 二ノ半

蒸餾水 五比

右二味末トシ硝子壘ニ入レ蒸餾水ヲ加ヘ火ニ上セ煮テ四分時。或ハ其末盡ク溶化スルニ至リ瀝テ其



液ヲ取り文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ上面膜ヲ結ブ  
 ニ至リ更ニ微火上置テ漸次ニ芒ヲ結バシメ其芒  
 ヲ取り乾シ末トシ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ○此  
 劑右ノ如ク製スレバ蒸餾水ニ投メ盡ク溶化ス  
 ○默他兒雜腹蘭或ハ赫篤綸安質沒扭共ニ後ヲ以  
 テ亦ヨク此劑ヲ製スト雖モ其坩ノ土氣ヲ浸洩ス  
 ルノアル故ニ此製法ヲ用ルナリ然レ默他兒雜腹  
 蘭ヲ以テ製スル方ハ其効穩ニノ瞑眩セス亞爾瓦  
 碌ロツチ扶散ハ多ク海鹽ノ酸性ヲ含ム故ニ此劑甚ダ酷  
 烈ニメ湧吐ノ功殊ニ峻ナリ因

又法

赫篤綸安質沒扭極細末 三弓

酒石英 六弓

水 六北

右二味各別ニ研末シ合和メ磁罐ニ入レ水ヲ加ヘ  
 文火ニテ煮ルノ六時水減スレバ數温湯ヲ加ヘ酒  
 石英ヲメヨク溶化セシメ紙ニテ漉テ其液ヲ取り  
 淺ク潤キ磁鍋ニ入レ火ニ上セ手ヲ住ズ攪セ速ニ  
 煮テ乾シ白色ノ鹽ト爲シ放冷メ研末ニ硝子壺ニ  
 入レ固封シ貯フ亞

又法

默他兒十六錢雜腹蘭ノ條ニ出

酒石英 八考

水 適宜

右磁罐ニ入レ煮ル<sub>レ</sub>四時半許ニ<sub>レ</sub>瀝<sub>シ</sub>テ汁ヲ取リ  
火ニ上セ煮テ乾シ白末ト爲ス<sub>○</sub>

**又法** 默他兒雜腹蘭

酒石英 各四考

右磁罐ニ入レ水適宜ニ加ヘ煮テ酒石英盡ク溶化  
スルニ至リ温ニ乗シ紙ニテ瀝シ又其液ヲ火ニ上  
セ煮テ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷ノ芒ヲ結バシ  
メ其芒ヲ取<sub>リ</sub>乾シ貯<sub>フ</sub>其餘殘ノ液モ前法ノ如ク煮

テ芒ヲ結バシム<sub>○</sub>劑中ノ酒石英ヲ以テ默他兒雜  
腹蘭中ニ含メル硫黃ト安質沒<sub>ト</sub>扭<sub>ト</sub>ヲヨク溶化ス。  
故ニ紙ニテ瀝<sub>ト</sub>雖モヨク透過<sub>メ</sub>少<sub>シ</sub>モ其性能ヲ滓  
ニ遺ス<sub>ト</sub>ナシ<sub>○</sub>此劑ハ安質沒<sub>ト</sub>扭<sub>ト</sub>酒石ノ酸性  
ト混和抱合<sub>ノ</sub>成所<sub>ノ</sub>一種ノ中和鹽ナリ其結芒ス  
ル者ハ三稜ヲ爲シ乾テ微黃白色。味微酸ニ<sub>レ</sub>礦氣  
アリ。氣ニ觸<sub>テ</sub>容易風化セズ透亮ナラズ然<sub>レ</sub>水ニ  
濕セバ透徹シ熾炭ニ投スレバ爆聲ヲ發ス<sub>○</sub>此劑  
ヲ貯テ灰色ノ末トナル者ハ氣ニ觸<sub>テ</sub>濕<sub>リ</sub>其質溶  
解ノ純粹ナラズ其効力モ劣弱ニ<sub>レ</sub>藥用ニ充<sub>テ</sub>難シ

主治 此劑ハ捷効アル吐藥トス。其効穩ニノ瞑眩劇シカラズ一切胃中ニ鬱蓄スル膠粘敗穢ノ汚物ヲ快吐ス或ハ下利スルヲアリ故ニ腐敗熱膽液熱 胃腸熱赤痢。間歇熱等ノ初發其毒滯著ノ患者惡心嘔氣アルニ用テ尤効アリ○乙百葛格安那ハヨク吐スレモ下利ノ効ナシ此藥ハ下利スルヲアル故ニ下利ノ宜キ症ニハ此藥ヲ用ベシ若シ下利ノ害アル者ハ乙百葛格安那ヲ用ベシ○小兒乙百葛格安那ノ苦味ヲ嫌フ者ハ是ヲ用ベシ水ニ溶シ稀クノ用レバ瞑眩ノ害ナシ○一頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セ

シムベキ症ハ是ヲ適宜ノ飲液ニ溶シ少許宛與フベシ假令バ左ノ方ノ如シ

爽涼催吐飲

韃爾答律斯タルタイリス越默室屈私エメチキス 五瓦

薔薇露 七瓦

覆盆舍利別 一瓦

右攪和シ四分時ニ二匙宛用ヒ吐スルヲ度トス○左ノ方亦良

潤燥催吐飲

韃爾答律斯タルタイリス越默室屈私エメチキス 五瓦

大麥煎 二匕半

右攪和シ一麥酒盞宛用フ○右ノ二劑。膽液熱ノ熱  
 勢劇クメ煩渴アル症ニ尤効アリ○服量。通例此末  
 一匁ヲ蒸餾水四錢ニ溶シ一服トシ八分時毎ニ用  
 ヒテ吐スルヲ度トス。小兒ハ半匙宛用フ尋常ノ水  
 ハ石灰土。其他汚物ヲ含テ藥効ヲ妨ル故ニ蒸餾水  
 ヲ用ベシ○或ハ此末二匁ヨリ六匁マデ水六匁ニ  
 溶シ若クハ適意ノ飲液ニ和シ用ヒ或ハ此末二匁  
 若クハ三匁ニ沙糖少許ヲ研和シ用フ○壯實ノ人  
 感動少キ者ハ此末三匁或ハ四匁ヲ用フ中毒等ニ

テ快吐ヲ取ルニハ五匁ヲ温湯一盞ニ溶シ用フ神經  
 衰弱ノ觸知鈍ク精神朦昧セルガ如キハ十匁若ク  
 ハ十五匁マデ用テ吐ヲ取ラリ○是ヲ用テ吐ヲ  
 發スルキハ微温湯或ハ微温湯ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ  
 雞肉煮汁等數碗ヲ與フベシ是ニ因テ胃中ノ粘液  
 ヲ稀釋シ吐シ易クノ苦悶ナカラシム但脂油ノ類  
 粘稠ノ飲液ヲ用ルト勿レ却テ藥力ヲ妨ゲ且胃中  
 ノ粘液ヲ稀釋セザレバナリ○吐劑ノ服量少クノ  
 吐ザレバ徒ニ患者ヲノ惡心乾嘔ニ罷勞セシムル  
 ノミニテ寸功ナシ或ハ服量度ニ過レバ嘔吐止マズ

若クハ吐血搐搦ヲ發シ或ハ胃ノ熾衝ヲ生スル  
 アリ○若シ此劑ヲ用ヒテ嘔吐止マザル者ハ硫黃  
 精或ハ綠礬精ヲ水ニ滴ノ適意酸美ノ味ト爲シ用  
 ベシ是安質沒扭ノ毒ヲ制スルト阿芙蓉ニ勝レリ  
 ○吐血ノ患アル人ハ吐劑ヲ禁ス。是ヲ用ヒテ吐血  
 ヲ發スルトアレバナリ。孕婦及ビ内部熾衝アル者  
 モ是ヲ禁ス。是ヲ用レバ胃ニ搐掣ノ運動ヲ發シ其  
 症ヲノ増劇セシムレバナリ○此藥服量甚ダ些少  
 ナレバ吐ヲ發セズノ專ラ解凝發汗ノ良藥トシ胃  
 腸ニ滯著セル粘液ヲ溶化シ吐痰ヲ進メ大小便ヲ

利シ諸竅脉管ノ排泄ヲ進輸シ殊ニヨク蒸氣ヲ發  
 泄スルニ由テ諸内鬱セル酷厲毒ヲ驅發ス。故ニ病  
 毒潛伏内攻ノ發スル諸病ニ用テ大効アルトシ百  
 葛格安那ノ如シ凡ソ安質沒扭製ノ吐劑ノミナラ  
 ズ總テ吐藥ハ大抵服量八分氏ノ一ヨリ加テ半氏  
 ニ至ルマデ飲液ニ加ヘ用レバ吐ヲ發セズノ解凝  
 ノ峻効アリ○此劑ヲ金硫黃後ニ出ツニ比スレバ功力  
 峻ニノ危懼ナク切實トス○此劑四分氏ノ一或ハ  
 半氏ニ阿芙蓉等分ニ加テ湧吐ノ効ヲ抑制シ數用  
 レバ汗ヲ發メ惡性ナル傷冷熱等ノ毒ヲ發散メ治

ス。即チ拈歇爾私發汗散那ノ百葛格安ノ如シ。傷冷毒  
 ノ熱病ハ殊ニ皮中ノ蒸氣管拘強セル故ニ此發汗  
 劑ヲ用ヒテ尤モ的當トス然レ患者ノ天質病性ノ夾  
 併。病毒排泄ノ時節ヲ察シ用ルト肝要ナリ但シ此藥  
 ニ發汗劑及ビ阿芙蓉ヲ加ルト片ハ久ク連服スルト  
 勿レ動カモスレバ血液甚ダ稀薄ニナリテ其醇厚ノ  
 質ヲ失ヒ終ニ焔解泛濫ノ水腫ヲ發シ其他荏苒々  
 ル虛羸ノ病ニ罹レバナリ○痢疾ノ傷冷毒ヲ夾テ  
 重墜努責ノ甚キ症ハ此藥ヲ吐劑トシ用テ徑ニ其  
 毒ヲ除クノミナラズ亦服量些少ニ用ヒテ汗ヨリ

發散シ其他諸竅ニ排泄ノ大効アリ○間歇熱ニ吐  
 劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ノ病毒汚液ヲ淨刷スレレ  
 其熱仍荏苒トノ解セザル症ハ毎日少許宛數是レ  
 用レバ其熱漸ク解散ノ治ス。或ハ幾キ那ナヲ用レレ疔頑  
 固ニメ治セザル症ハ此藥ヲ兼用ノ幾キ那ナノ驅熱ノ  
 性功ヲ扶ケ其毒ヲ排除ノ治スル者甚ダ多シ。又是  
 ヲ幾キ那ナニ加ヘ用レバ服量較多シト雖モ嘔吐ヲ發  
 セズ假令バ幾キ那ナ一トニ水三十二トヲ加ヘ煮テ半  
 ヲ減シ其煎汁ニ此藥十二ト氏ヨリ十五ト氏マデ加ヘ  
 用ルニ少シモ惡心ヲ發スルトナシ是レ幾キ那ナノ收瀟

ノ性功ニテ是ヲ抑制スレバナリ○凡ソ間歇熱ハ  
初メ此藥ヲ用ヒテ吐シ若クハ瀉下セシメ爾後半  
氏或ハ一氏許吐セザル許ホトヲ一服トシ毎日亭午ノ  
一時前ニ一服用ヒ。夜分一服用レバ大抵五日許ニ  
ノ治ス。是ヲ服メ吐スレバ効ナシ。故ニ服量ニ意ヲ  
用ル。肝要ナリ。是レ飲液ニ和シ服スルヨリハ丸  
藥トシ用テ効多シ○是亦鎮痙ノ良藥トスヒ百葛 格安那  
モ吐劑ニ少許用レバ鎮痙ノ効アル。此藥ト同シ。少許宛用レバ痙瘈搐掣  
ヲ治スルニ偉効アリ。是此藥ノ神經及ビ諸筋ノ失  
常ノ運動痙攣 搐掣ヲ鎮定スル一種ノ殊能ニメ曾テ病

毒ヲ排除スルノ効ニ非ズ○一小兒屢劇キ搐搦ヲ  
發ス其發作ノ時此藥ヲ用テ頓ニ治シ爾後連用數  
日ニメ其症全愈ス○一小兒痙ヲ患フ。初メ此藥ヲ  
吐劑トシ用テ吐セシメ爾後吐セザル程ニ少許宛  
用ルニ總身小瘡ヲ發メ快復セリ○女兒姊妹共ニ  
痙ヲ患フ此藥ヲ用テ前法ノ如クニメ總身臭汗ヲ  
發シ是ヨリ病毒漸ク排除ノ遂ニ治ス○一小兒痙  
ニ因テ搐搦ヲ發スル。一時半許。左ノ方ニ匙ヲ與  
テ速ニ醒復シ爾後是ヲ連用メ其痙モ亦全愈セリ

治痙驗方

菩提樹花水 ハ多 ○其製法薄荷水ノ條露水製  
法拈套第十三 橙花水製法ト同シ  
韃爾答律斯越默室屈私 四氏

右調勻ス ○疫效ハ初メ此藥  
韃爾答律斯越默室屈私ヲ用テ  
粘液ヲ吐セシメ次ニ少許宛用ヒテ汗ヲ發シ大便  
ヲ利メ其餘毒ヲ驅除シ且其鎮痙ノ効ヲ以テ咳嗽  
ノ發作ヲ靜止スレバ多ク治ス ○失血モ亦此藥少  
許宛用テ捷効アリ吐血及ビ崩漏等ニ用テ驗多シ  
是血脉諸管ノ痙攣搐掣ノ運動ヲ鎮定スルニ因ル  
○黑障眼及耳聾ハ此藥ニ韃爾答律斯越默室屈私  
用テ治スル者甚多シ又左ノ方黑障眼ニ奇効アリ

治障驗方

瓦爾枝奴謨

撒瓦百奴謨

石鹼 勿擗奈亞

甘草膏 各一錢

大黃 一錢半

韃爾答律斯越默室屈私 十六氏

右研和シ一氏ヲ一丸トシ朝夕十五丸宛服ス大抵  
四週ヨリ七週ノ間ニ効ヲ奏ス ○韃爾答律斯越默  
室屈私ハ中和鹽 批歇爾私發汗散ニ孕 ヲ等分ニ加



へ。殊ニ硃砂ヲ研和シ水ニ溶シ用テ尤良。是ニ由テヨク溶化シ其功切實ナリ。○此藥外敷ノ刺戟衝動シ鑽透開達ノ凝結ヲ疏散スル功アリ。是ヲ水ニ溶シ皮膚ニ塗レバ小胞ヲ發ス。○此末一匁。芫菁<sup>テイキ</sup>丁幾<sup>トカ</sup>去爾<sup>テトル</sup>一匁。水二匁研和シ溶シ是ヲ胃ノ部ニ塗<sup>ル</sup>下日數次。劇キ欬嗽ヲ治シ又小便ヲ利シ水腫ニ良効アリ。○此末半錢ヲ水一匁ニ溶シ六十滴許ヲ取テ毎日經久ノ流走痛ニ擦スレバヨク蒸發氣ヲ排泄シ治ス。但是ニ由テ睡ヲ催シ或ハ嘔氣ヲ發スル者アリ。○此末十五匁ヲ取テ家猪脂一錢ニ調和シ肌膚

ニ塗レバ發泡ス。稟賦薄弱ニノ感動シ易キ人及ビ小兒ハ是ヲ以テ芫菁發泡膏ニ代用シ瘡疹類ノ潛伏内攻セルヲ發越シ或ハ内部ノ疼痛ヲ表面ニ發散ス。  
天(収) 依(収) 福(収)  
 亞爾<sup>ア</sup>瓦<sup>ワ</sup>礮<sup>カ</sup>扶<sup>フ</sup>散<sup>サン</sup> プ<sup>プ</sup>ド<sup>ド</sup>ル<sup>ル</sup>・ハ<sup>ハ</sup>ン<sup>ン</sup>・ア<sup>ア</sup>ル<sup>ル</sup>カ<sup>カ</sup>ロ<sup>ロ</sup>ツ<sup>ツ</sup>チ<sup>チ</sup> 蘭

製法

黙<sup>メ</sup>他<sup>タ</sup>兒<sup>エ</sup>雜<sup>ザ</sup>腹<sup>フ</sup>蘭<sup>ラン</sup> 一匁

綠礬油 二匁

海鹽 炒乾者 三匁

雨水 四匁

右合和シ硝子ノ格兒弗<sup>コル</sup>ニ内<sup>イ</sup>レ温沙火ニ上セ時々

攪セ温メ浸ス<sub>一</sub>六時ニ<sub>一</sub>火ヲ下シ<sub>一</sub>漚テ其液ヲ取  
是ニ其四十倍量ノ沸湯ヲ加テ溶シ<sub>一</sub>静定ノ灰色ノ  
逆ヲ取り<sub>一</sub>亞兒加利鹽液<sub>一</sub> 剝<sub>一</sub>篤<sub>一</sub>亞<sub>一</sub>斯<sub>一</sub>或<sub>一</sub>ハ酒石鹽<sub>一</sub>少許  
ヲ以テヨク是ヲ洗淨ノ乾シ貯フ<sub>一</sub> 按

至ル<sub>一</sub> 獨 **主治** 峻吐ノ劑トシ又瀉下ス服量二匁ヨリ四匁ニ

**赫篤緇安質沒扭** 羅 加ラス・ハン・スピスガラス<sub>一</sub> 蘭

**製法** 安質沒扭<sub>一</sub> 適宜

右研末シ底ノ平ニノ潤キ陶器ニ撒シ文火ニ上セ  
硝子管或ハ磁棍ニテ手ヲ住メス攪テ粒塊トナル

一無ラシメ若塊トナラバ速ニ火ヲ下シ再ビ極細末  
ト爲シ復火ニ上ス片ハ硫氣上升ス其氣止<sub>一</sub>片ハ又  
火ヲ加<sub>一</sub>硫氣ヲ上升シ終ニ器底<sub>一</sub>通紅トナリ烟氣消  
メ後<sub>一</sub>是ヲ坩鍋ニ入レ蓋ヲ覆ヒ火屑ヲ入<sub>一</sub>一無ラ  
シメ<sub>一</sub>燒テ遂ニ熔化流動ノ烱タル硝子ノ如クナル  
ニ至リ磁漉或ハ硝子篋ヲ入レテ攪セ試ルニ流動  
ノ透明ナル液其漉ニ著テ絲ヲ引<sub>一</sub>ニ至ル片ハ是ヲ  
温メタル銅鉢或ハ熱セル石上ニ寫シ漸ク放冷ス  
冷ル器ニ寫セ<sub>一</sub>ハ其<sub>一</sub>乃チ赤色透明堅剛ニノ破碎ス  
液逆散スレ<sub>一</sub>ハナリ<sub>一</sub> 安質沒扭<sub>一</sub> 熔テ後<sub>一</sub>火上ニ置<sub>一</sub>一久キ  
ベキ質トナル<sub>一</sub> ○安質沒扭<sub>一</sub> 熔テ後<sub>一</sub>火上ニ置<sub>一</sub>一久キ

ホド逾、透明トナルナリ初メ煨クキ安質没扭ニ合  
メル硫黄ノ毒烟蒸升ス。故ニ意ヲ用ヒテ其烟氣ヲ  
避クベシ〔抜〕

**主治** 峻吐ノ劑トス或ハ瀉下ス。服量一匁ヨリ三匁  
マデ用フ。但其効劇キ故ニ一味末ニテ用ヒズ。此末  
十匁ヲ取テ白葡萄酒ニ多ニ浸ス一一夜。紙ニテ漉  
シ其酒ヲ空心ニ温服ス。壯實ニノ頑固ノ病アル人  
ニ用フベシ。虚人久病。羸弱ノ者ハ是ヲ禁ス〔抜〕

**安質没扭酒**

**製法**

赫篤綸ヒツト、安質没扭アンシテモ、極細末極細末  
一多一多

葡萄酒 二比

右硝子燻ニ入時、攪ヒ浸ス一十二日ニノ上清ヲ  
取り紙ニテ漉シ硝子燻ニ收メ固封シ貯フ〔抜〕

**主治** 峻吐ノ劑トス然レバ服量少許。大抵二三十滴ヨ  
リ五六十滴許用レバ發汗劑及ビ衝動解凝劑トナ  
リ。發汗ノ諸酷厲毒ヲ驅泄シ。諸器脉管ノ排泄ヲ進  
メ粘稠液ヲ稀釋ノ一切壅滯ノ病毒ヲ疏解シ驅除  
ス。故ニ肝。脾。腸間膜腺ノ壅塞。痛風。肢節痛。頑固ノ瘡  
瘍等ニ大効アリ此酒ノニ用ヒ或ハ失鳩答。越幾斯  
劑。阿芙蓉液。石鹼等ヲ加ヘ用フ○服量吐劑ト爲ス

ニハ一錢ヨリ漸ク加テ吐スルニ至ル解凝劑ト爲  
スニハ二十滴ヨリ漸ク加ヘ患者惡心ヲ覺ルニ至  
テ差其量ヲ減シ用フ。小兒ハ三四滴宛用フ

默他兒雜腹蘭

蘭 コロクスメタルロルム

製法

安質沒扭

消石 乾淨者 各等分

右ニ味各別ニ極細末トシヨク混和シ坩鍋ヲ熾炭  
ニ上セ通紅トナル片右ノ末ヲ取テ少許宛坩ニ投  
スレハ爆聲ヲ發ノ焚燒ス。遂ニ其末ヲ燒キ盡シ。爆  
聲ナキニ至レバ赭黃ニシテ雜腹蘭色ノ塊トナル是

ヲ歌巴兒安質沒扭

ト名ク 歌巴兒ハ肝ナリ是亦是  
肝藏ノ色ヲ以テ名ク是

ニ雜ル帶白色ノ渣屑ヲ分チ去リ極細末トシ沸湯  
ニテ數洗ヒ其湯少味ナキニ至リ消石ヲ洗ヒ微  
火ニテ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ○亞爾瓦碌  
扶散ヲ製スルニ用ル默他兒雜腹蘭ハ安質沒扭ニ  
多。消石三弓ヲ用テ前法ノ如ク製ス

主治 峻吐ノ劑トス服量二匁ヨリ六匁ニ至ル○眼

ニ點ノ翳膜ヲ去リ細絡ノ凝血ヲ散シ角膜及ビ瞼  
ノ潰爛ヲ治シ眼中ノ小胞汚點ヲ消ス

默他兒雜腹蘭酒

インヒシイコロクスメタルロ  
ルム又ヒヒムエメチキス羅

製法

黙他兒雜腹蘭 一錢

葡萄酒 一坩

右調和シ硝子壘ニ入テ溶化シ微火上ニ置テ時々振蕩シ藥氣ヲ出ス一二三日ニノ滲過シ貯フ○服量四錢ヨリ三弓ニ至ル

又法

黙他兒雜腹蘭 一弓

葡萄酒 三十弓

右硝子壘ニ入レ溶化シ浸ス一二時ニノ紙ニテ滲シ貯ヘ用フ此劑一ニ亞拈別涅實屈多律蘭地ト名ク○服量三錢ヨリ四錢ニ至ル

主治

安質沒扭製ノ吐方中ニテ此劑尤峻ナリ○安質沒扭ハ葡萄酒中ノ酸性ニテヨク溶化ス故ニ酒劑ト爲シ尤効アリ○癲狂ニハ患者ノ強弱ニ隨ヒ一日ニ八弓ヨリ十弓マデ與ヘ吐セシメテ効アリ但仔細ニ意ヲ用ヒ酌料ノ漸ク服量ヲ加フベシ○服量少許ニノ數用レバ凝結ヲ疏散シ粘液ヲ溶解スル良藥トス故ニ内藏ノ壅塞ヲ兼ル諸病ニ殊効アリ○肺焮衝ニ用テ痰ヲ豁シ咯出シ易カラシム○此液三錢或ハ四錢ニ芙蓉液四分一ノ量ヲ加ヘ數用テ頑固ノ下利或ハ乾效傷冷毒痛總テ痛風様

ノ病ヲ治ス○又此藥發汗ニ峻効アリ左酒劑尤良

黙他兒發汗酒

黙他兒雜腹蘭酒 四十滴或五十滴

阿芙蓉液 二十滴

右調和シ一服トス服法主治總テ托歇爾私發汗散

ノ條ニ出ツト同シ但劑中ノ阿芙蓉液ハ病症ニ

隨テ漸ク増加フベシ（依）（揭）

金硫黃 ソルフルアウラチムアンテモニ羅

製法 安質沒扭細末 二弓

硫黃華細末 三弓

蹙乙典埵羅偶

雨水 各三十二弓

右蹙乙典埵羅偶ニ水ヲ加ヘ鐵壺ニ内レ攪テ煮沸

セシメ安質沒扭ト硫黃ヲ加ヘ手ヲ住ズ攪セ煮其

液減スレバ適宜ニ蒸餾水ヲ加ヘ煮テ二品盡ク溶

化スルニ至リ放冷シ紙ニテ瀝テ其液ヲ取り綠禁

精ヲ以テ徐々ニ其液ニ滴シ加テ硫黃盡ク其底ニ

沈ムニ至リ又是ヲ紙ニテ瀝テ紙上ニ留ル硫黃ヲ

取り數水ヲ注テ洗淨シ微火ニテ乾シ貯（亞）○此藥

ハ安質沒扭ト硫黃ヲ煮テ混和セシメ酸精ヲ加テ

安質沒扭アツテモイノ硫黃ヲ分チ取リタル者ナレバ即チ安質沒扭アツテモイニ含メル硫黃ナリ

**主治** 金硫黃及ビ結爾茂斯密涅刺列ケルメスミ出ツニハ稍多ク服シ或ハ胃中ニ酸敗液アル者ニ與レバ嘔吐シ或ハ瀉下ス。少許用レバ汗及ビ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利ノ血中ノ惡液ヲ排除シ凝結ヲ疏解ス。約ノ言ハ病毒惡液ヲ諸竅ニ排泄スルノニ。即チ韃爾答律斯タタル越默室屈私メチキス出ツノ如シ。○吐ヲ取ルニハ四五瓦ヲ用フ發汗解凝等ノ効ヲ取ルニハ半瓦ヨリ三瓦ニ至ル小兒ハ四分瓦ノ一ヨリ半瓦マデ沙糖ヲ加ヘ或

ハ丸藥トシ用フ。○丸藥トシ用レバ吐セズ。散劑ハ水。葡萄酒。玫瑰昆コシセル設爾弗等ニ和シ或ハ適宜ノ飲液ニ溶シ用フベシ然レバ空心ニ服スレバ吐スルアリ。胃ノ感動シ易キ人ハ沙糖ヲ加ヘ食後一時許ヲ經テ用フベシ。○胸ノ諸病ニ用ヒテ粘痰ノ肺ニ壅滯セルヲ稀豁ノ咯出セシム。故ニ喘息欬嗽。胸水。及ビ燄衝ナキ傷冷毒ノ諸症ニ用ヒテ痰唾ヲ湧起シ良驗ヲ奏ス。○胸脇燄衝。肺燄衝ノ劇キ諸症燄熱等既ニ解散シ唯其滯著セル病毒ヲ衝動ノ疏散シ治スベキ時節ニ用ヒテ良効アリ。麗春花ノ泡湯或ハ

葡萄酒ニテ送下ノ殊ニ良<sup>レ</sup>或ハ冒寒傷冷毒ヨリ胸脇痛ヲ發シ較著ノ炊衝ナク唯發汗ノ治スベキ症ハ此藥ニ龍腦少<sup>ク</sup>許ヲ加ヘ用レバ微汗ヲ發メ治ス。乾欬劇<sup>シ</sup>キ者ハ阿芙蓉少<sup>ク</sup>許ヲ加フベシ○傷冷毒ノ乾欬甚<sup>ク</sup>キ者或ハ酷厲ナル粘液肺氣管ニ壅滯メ欬ヲ發シ或ハ腹中諸藏ノ壅塞アルヨリ頑固ノ欬ヲ發スル症ハ是ヲ用テ痰ヲ湧起シ汗ヲ發シ凝結ヲ解キ大小便ヲ利メ殊効アリ。即左ノ方尤<sup>ク</sup>良

芙蓉黃龍散

金硫黃

四匁

阿芙蓉

一匁

龍腦

二匁

消石

精製者  
二匁

右研和ノ散劑トシ分テ四服トシ舍利別或ハ適宜ノ飲液ニテ一服宛用ル<sup>ル</sup>日四次○金硫黃ハ表發ノ蒸氣ヲ驅發シ血中ノ惡液ヲ排泄スルヲ以テ輕キ痛風傷冷毒痛及ビ瘰癧等總テ腺ノ壅塞ヲ疏散シ治スルニ良驗アリ○喉風ノ炊衝既ニ退クキハ左ノ劑ヲ用ヒテ咽喉ニ凝聚スル粘液ヲ疏散ノ捷効アリ。又痛風及ビ傷冷毒ノ諸症瘰癧等ニ用ヒテ其毒ヲ驅除シ治ス



金黃排毒飲

海葱蜜

過爾託亞舍利別

邁護安沒尼亞幾

金硫黃

各六錢

半錢

七瓦

右研和シ初ハ四分時一卵匙宛用ヒ爾後漸ク服度  
ヲ減ス○荏苒タル間歇熱ハ金硫黃半瓦或ハ一瓦  
宛日三四次用ヒテ良驗アリ或ハ亞爾鮮鹽若クハ  
孕礬酒石少許加ヘ用ヒテ殊ニ良○間歇熱及ビ頑  
固ノ三日熱發作時刻少モ變セサル症左ノ方尤良

芙蓉黃石散

金硫黃

阿芙蓉

螞蛄石

各二瓦

一月

右研和シ分テ二服トシ發作ノ半時前ニ一服ヲ取  
テ適宜ノ飲液或ハ舍利別少許ニ加ヘ用ヒ。又發作  
ノ四分時前ニ一服ヲ用フ。間日ニモ右ノ如クニノ  
毎日用レバ發作ノ時刻漸ク變ノ熱解散ス○金硫  
黃ハ發汗ノ功アルヲ以テ頑固ノ瘡瘍疥癬等總テ  
皮病ヲ治ス或ハ水銀劑ヲ加ヘ用ヒテヨク其毒ヲ驅

發ス○發斑熱或ハ痘瘡麻疹等ノ快發シ難キニ用  
 ヒテ血液ノ泡釀ヲ進メ蒸氣ヲ發シ涎唾ヲ湧泄シ  
 ヨク其瘡ヲ驅發ノ煩躁ヲ解シ安眠セシム或ハ瘡  
 疹類ノ酷厲毒潛伏内攻ノ發スル水腫ニ用テヨク  
 其毒ヲ驅逐シ治ス○頑固ノ萎黃病ハ此末一匁格  
 碌屈斯マールナス鐵ノ條出孕礬酒石酒石ノ條ニ出各十匁研  
 和シ一服トシ毎日二服宛用テ良驗アリ。處女此病  
 ニ罹カル者ハ殊ニ良○痢症ニ用ヒテ間大効アリ。金  
 硫黃一匁ヨリ三匁マデ銀朱少許ヲ加ヘ一服トシ  
 毎日適宜ノ飲液ニテ服ス○健質亞那越幾斯劑甘

汞ヘチチア勿搦祭亞石鹼ヲ適宜ニ加ヘ用テ肝。脾。腸間膜等  
 ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ粘液ヲ稀釋シ留飲ヲ驅除シ  
 久腹痛嘔吐。腹脹等ヲ治シ胃ヲ健ニス○内藏ノ閉  
 塞ヨリ起ル羸瘦病及ビ粘液留飲ノ壅滯セル經久  
 頑固ノ諸病ニ用テ間大効アリ然レ内藏ニ膿瘍ア  
 ル症肺瘍及ビ肝脾腸間膜等膿瘍アリニハ害アリ。  
 斯ノ如キ衝動解凝ノ藥ハ其膿ヲ血中ニ驅逐ノ膿  
 熱ヲ釀シ危篤ニ至レバナリ或ハ胸腹諸藏ノ輕キ  
 壅塞ヨリ發スル水腫ニ間大効アリ。是ニ鐵屑ト消  
 石ヲ加テ殊ニ良。然レ其壅塞頑固ニテ解シ難ク或

ハ血液甚ダ酷厲ナル症ニハ効ナシ○患者多血ニ  
 ノ壯熱焮衝アル者ハ是ヲ用テ害アリ。此症ハ清涼  
 ノ下劑ヲ與ヘ或ハ刺絡ノ血液ヲ減スベシ。此藥ハ  
 血中ノ硫黃質ヲ融解シ血液ヲノ沸釀セシムル故  
 ニ焮衝病ニ用レバ血液更ニ沸騰シ血脉逾充脹シ  
 諸症ヲノ増劇セシムレバナリ○此劑ヲ製スル片  
 紙ニテ瀝シタル刺水ハ外敷ノ乾癬。白禿瘡。其他小  
 胞浸淫蔓延スル皮病ヲ治ス

結爾茂斯密涅刺列

製法 安質沒扭

剥篤亞斯精製者 各四弓

硫黃華洗淨者 一弓

右件極細末トシ合和ノ坩鍋ニ内レ文火ニ上セテ  
 溶シ是ヲ鐵壺ニ内テ速ニ研末シ。沸湯五十弓ヲ磁  
 罐ニ盛リ是ニ右ノ末ヲ加ヘ手ヲ住ズ攪セ煮ル  
 八分時ニ火ヲ下シ。暫ク靜定シ布片ニ漉紙ヲ襲  
 テ熱ニ乘ノ瀝過シ滓ヲ去テ放冷シ赤末其底ニ沈  
 ムヲ候ヒ紙ニテ瀝テ其末ヲ取り。又其刺水ニ前ノ  
 滓ヲ加ヘ煮テ前法ノ如クシ。水減スレバ適宜ニ加  
 ヘ放冷シ瀝テ復其赤末ヲ取り。斯ノ如ク數回ニシ

終ニ赤末少シモ沈マザルニ至ク其末ヲ取り集メ冷水ニテ數洗ヒ微火ニテ乾シ貯フ

又法 安質沒扭極細末 十錢

躑躅鹽 二百二十五

水 二貫五百錢

右躑躅鹽ヲ鐵罐ニ内レ水ヲ加ヘ煮沸シ安質沒扭ノ末ヲ投シ煮ルコハントキ四分時餘ニテ瀝テ其液ヲ取り磁盃ヲ沸湯上ニ置テ熱セシメ是ニ其液ヲ内レ靜定スルコシ十二時ニテ瀝テ其底ノ末ヲ取り水ニテ洗ヒ微火上ニ乾シ貯フ

又法

安質沒扭極細末 四錢

剥篤亞斯精製者 十六錢

水 適宜

右調和シ鐵壺ニ内レ煮ル一時半。其液ヲ八比ト爲シ温ニ乗ノ紙ニテ瀝テ滓ヲ去リ放冷スレバ其底ニ赤末沈ム。又紙ニテ瀝テ其末ヲ取り。其剩液ニ前ノ滓ト水ヲ加ヘ煮テ末ヲ取ルコシ前法ノ如クシ數回斯ノ如クメ終ニ其末少シモ沈マザルニ至リ。其末ヲ取り集メ水ニテ數洗ヒ乾シ貯フ

主治 金硫黃ニ比スレバ安質沒扭ヲ含ムコシ多クメ

性功尤峻ナリ。故ニ服量稍多ケレバ吐シ或ハ瀉ス。感動シ易キ人ハ少許用ヒ。或ハ先ヅ金硫黄ヲ與テ効ナキ片ハ此藥ヲ用フベシ。○此藥二瓦マデ用フベシ。胃ノ感觸シ易キ人ハ半瓦ヲ用ヒテ吐スルアリ。但シ亞刺比亞護謨ヲ加ヘ用レバヨク其毒ヲ抑制シ服量多シト雖モ吐スルナシ。(依)(疾)(福)(摺)

遠西醫方名物考卷十五終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 標齋宇山先生著 全三冊 理學入門 植學啓原 宇山榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完 自初篇至七篇

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療正始 中齋伊東先生著 每篇三冊完 自初篇至七篇

遠西醫方名物考 同上 全五冊 泰西名醫彙講 蘇川箕作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄幹先生著 全三冊


瘍醫新書 玄澤大楓先生著 全四冊 醫方研幾 無涯足立先生著 每篇三冊完 初篇二篇

蘭學階梯 同上 全二冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄幹先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著 每篇三冊完 初篇二篇 病學通論 洪菴緒方先生譯述 初篇三冊出末二篇三篇四篇 地三出初

濟生三方 杉田成卿先生譯 全四冊 青藜閣 江戸淺草茅町二丁目 須原屋伊八



榛齋宇田川先生著

五篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

新刊