

遠西醫方名物考

安四

卷十八

武  
857  
45-18

學大田稻早	館書圖
庫文田內者托寄	號七六一第書托寄
號	冊
8	18





武門  
號 857  
卷 45-18

大正九年九月廿四日  
贈  
內田 滋子氏

遠西醫方名物考標目

卷十八

阿芙蓉

下

精製說  
阿芙蓉製劑說  
精製阿芙蓉

阿芙蓉液

舍電發謨阿芙蓉液

芙蓉薄荷飲

阿魏

盧會驅蟲丸

阿魏丁幾去爾

安息香華

亞鉛

亞鉛華

鎮痙定嗽丸  
皓黃膏  
掃蟲銀華丸

大正九年九月廿四日  
贈  
內田 滋子氏



亞兒尼加アールニカ 亞兒尼加排毒飲アールニカハイドク

亞爾箇兒アールコホニ 燒酒ヤク

亞的兒アールニ 綠礬キナ

亞括別涅實屈多律蘭地アクトベニシキクダリランヂ 安質浸アノシキ

亞括扒瓦埤尼加アクトハカテニカ 升シヨウ

亞括忽爾扶斯アクトコトルホス 消石シヨウシ 亞爾瓦碌扶散アールカルクホサン 安質沒アノシキ

亞兒加歌私篤瓦老別利アールカカガシツカラベリ 消石シヨウシ

過兒加奴謨需百利加アールカカヌモスヒカリカ 點謨テンモ 消石シヨウシ

嬰粟オウソ 白嬰粟オウソ 利別リベツ 條ジョウ 嬰粟子オウソ 上ジョウ

遠西醫方名物考卷十八

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕菴校補



阿芙蓉 下

精製說 阿芙蓉ヲ服ノ惡心嘔吐ヲ發スル等其他瞑眩ニ堪ザル人ハ是ヲ精製ノ用ベシ是ニ由テ其瞑眩ヲ爲ス所ノ華爾斯質脫ノ趨謨質トナル故ニ性緩和トナリ且其雜ル所ノ塵土汚物去テ淨潔トナル。是ヲ以テ感觸ノ甚キ人ト雖モ嘔吐ヲ起スナク生阿芙蓉ニ比スレバ危懼ノキ催睡止痛ノ良藥



トス。内服外敷ノ其効。前ニ説所ノ如シ。○服量一匁ヨリ二三匁ニ至ル。○然レ生阿芙蓉ヲ用テ嘔氣ナキ人ハ上好淨潔ノ生阿芙蓉ヲ用ベシ峻効アル。精製ノ者ニ勝レリ。或醋橙汁。綠礬精。鹽類等ノ性功相反スル者ヲ加製ノ其悍烈ナル毒ヲ抑製スル者アリ然レ此皆其峻効ヲ奏スル所ノ主能ヲ減損スルナリ。故ニ眼眩ヲ恐ル人ハ服量少許用ルヲ良トス。

精製阿芙蓉

ゲソイフルデヘウルサフ蘭

阿芙蓉 一匁

沸湯 二匁

右阿芙蓉ヲ湯ニ浸ノ溶化シ布片ニテ絞リ瀝シ渣ヲ去リ文火ニ上セ乾シ貯フ醫

又法 阿芙蓉 適宜

右硝子壘ニ内レ水三倍量ヲ加テ文火ニ上セ。烱解ノ蜜ノ稠トナルニ至リ。温ニ乗シ絞瀝シ滓ヲ去リ復微温火ニ上セ乾固シ貯フ亞。○疾云。多ク湯ヲ加テ溶シ瀝過スレバ華爾斯ノ質多ク分テ渣トナリ。布片ニ殘留ルナリ湯少キハ華爾斯多ク分離セズ。是ヲ瀝スト雖モ趨謨ト混和ノ布片ニ透漏スト。又法 ラウダニム。オッピアム。芙蓉ノ華爾斯質ヲ



去ラス、唯塵土等ノ汚物ヲ除クナリ

阿芙蓉 上好者、細判

雨水 半北 或ハ蒸餾水ヲ用フ

右格兒弗ニ内レ固封シ沙火ニテ煮ル一小時許。温

ニ乗ノ瀝シ液ヲ取り其布片ニ殘ル阿芙蓉 華爾斯 質ナ

リ陶器ニ内レ文火ニ上セテ乾シ是ヲ硝子壘

ニ内レ燒酒ヲ加テ阿芙蓉ノ上。四指横徑ニ至リ。其

口ヲ固封シ是ヲ少温ノ沙火ニ内レ置一小時許ニ

ノ其壘ヲ取出シ。其液ヲ傾ケ寫セバ粘穢土沙等其壘底ニ殘ル。是ヲ棄去リ其液ト前ニ取タル液ヲ各

別ニ硝子ノ鉢ニ入レ沙火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ蜜

ノ稠ト爲シ此兩個ノ液ヲ合和シ文火ニ上セ煎熬

ノ乾シ貯フ 〇或云。右ノ諸法ノ如ク是ヲ精製ス

ト雖モ其嘔吐ヲ起ス所ノ華爾斯質ヲ脱スル一能

ハズ。盡ク其華爾斯ヲ脱メ純粹ノ麴謨質ト爲シ感

動甚キ人ニ用テ少モ妨害ナキ者ト爲シ一ヲ欲セ

バ左ノ如ク製スベシ。其法。前ニ説ク如ク是ヲ沸湯

ニ浸メ溶シ微温火上ニ置テ泡醸スル一二月許。其

間ニ液減スル片ハ時々温湯ヲ加フベシ。是ニ由テ

華爾斯質ハ盡ク其底ニ沈ミ麴謨質ノニ其湯ニ烱



化ス。即チ其底渣ヲ除キ上清ヲ取テ文火ニ上セ乾固スルナリ。又法。阿芙蓉ヲアス亞爾箇兒アル燒酒ノ條ニ出脱ノ純精ナニ浸ス。三四日則チ其華爾斯質ハ盡ク溶化シ。越コ護質ハ溶解セズ。是ニ於テ瀝テ其溶化セザル者ヲ取り乾ス。片ハ即チ純粹ノ越コ護質トナリ。其性効殆ト罌粟球ノ越エ幾斯劑ノ如シ。是レ罌粟熬固ノ膏ト爲ス者ナリ。白按布福叔伍罌粟ノ條ト參考スベシ。疾依淑過亞

**阿芙蓉製劑說** 古人カモ以爲阿芙蓉ハ性大寒ニシテ生

活ノ温煖氣ヲ撲滅ス。故ニ過服スレハ肢體厥冷ノ死スト。是ヲ以テ其寒性ヲ抑制スルガ爲ニ多ク熱

性香竄ノ藥ヲ加ヘ以テ的テ里亞加リ及密篤利カ太多實リ亞斯格爾ア需ス謨ム共ニ阿芙蓉共ニ阿芙蓉劑ノ名ノ如キ多味繁雜ニシテ性功相及スル藥品ヲ調和シ是ヲ以テ汗ヲ發シ下利ヲ止ル等ニ用フ。晚近ニ至テハ的テ里亞加リ劑中ノ刺長無用ノ藥品ヲ除テ簡徑適實ノ方ト爲シ是ヲ阿芙蓉コ昆設爾弗コト名ケテ局方ニ載ス。天部出ス按ノ

○阿芙蓉液次ニ製スルニ精製阿芙蓉ヲ用フ。是劑中香竄ノ藥品ナキ故ニ生阿芙蓉ヲ用レバ動モスレバ惡心嘔吐ヲ發スレバナリ。舍電發謨阿芙蓉液次ニハ劑中香竄ノ藥品アル故ニ生阿芙蓉ヲ



用フ。其香竄ノ品アルハ阿芙蓉ノ寒性ヲ抑制スル  
為ニ非ズ。其生阿芙蓉ノ嘔氣ヲ起スヲアルヲ靜止  
スルガ為ナリ

阿芙蓉液

即チ阿芙蓉アヘンヲ幾キ去キ爾ニナリラウダニムリ  
グイテルム又テイキテウラオッピウムヒノサ  
羅ステルケウエンハンヘウルセフ蘭  
又フルイバレヘウルセフ蘭

製法

阿芙蓉 精製者 二匁

葡萄酒 十六匁

燒酒 十五度者 四匁

右硝子壺ニ内レ浸テ二日。漉過ノ其液ヲ取、硝子壺  
ニ内固封シ貯フ此液十匁ニ阿芙蓉一匁ヲ含リ亞技

又法

阿芙蓉 精製者 一匁

燒酒 尋常者 十匁

右長キ硝子壺ニ内レ微温火ニ上セテ溶シ紙ニテ  
漉シ硝子壺ニ内レ固封シ貯フ疾

主治 大抵舎電發謨阿芙蓉液出次ニ及ヒ精製阿芙蓉ノ

如シ○服量十八滴マテ用フ是ニ慣ル者ハ三十滴  
許モ用フ○此液ニ硃砂精或羯布羅油ヲ加ヘ胃瘧  
前ニ疝痛頭痛等ノ患部ニ塗テ其痛ヲ止ム○焮腫  
眼ニ此液ヲ取テ二三滴宛眼ニ點ス。毎日二次或三  
次其症ニ隨テ増減ス。初ハ痛ニ堪ス淚多ク出レ凡



其後痛止ム。焮腫劇キ者ハ此液ニ水ヲ加、稀クシ施  
ベシ。○瘰癧毒、焮腫眼。及經久ノ傷冷毒ノ眼疾ニ亦  
良驗アリ。○角膜星翳曇暗症ニ是ヲ點ノ殊効アリ

舎電發護阿芙蓉液

一名香竄阿芙蓉液  
ラウダラムリギユイデラムセイ  
又「オンキヲラホ、ピラムコロ  
カタ又「ピラム、ホ、ピラム、アロ、マ、チ、キ、ム  
羅スベセレイゲ、ウイン、ハン、ヘウル  
セ、フ、蘭

製法

阿芙蓉 上好者 二弓  
雜腹蘭 一弓  
桂 上好者  
丁香 各一錢

葡萄酒 一北

右件硝子壘ニ内レ時々振蕩シ浸ス。四日。漉シ絞  
テ液ヲ取り。硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法

ラウダラムリギユイデラムセイデラムハムス  
エッセンチアアノデイナ「羅ペイン「スチル  
レン「デア「フ「テ「レ「キ「セル「又「フル「イ「バ「レ「ヘ  
ウル「サ「フ「ハン「セイ「デン「ハム「蘭  
阿芙蓉 二弓  
桂露 葡萄酒ヲ以テ蒸餾スル者  
雜腹蘭 一北  
和蘭藥鏡 出

右件硝子壘ニ内レ微温沙火ニ上セ阿芙蓉溶化シ  
其色ヨク出ルニ至リ漉テ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ



固封シ貯フ<sup>〔依〕</sup>

〔又法〕

「ティンキタル、テバイカ」<sup>畢</sup>

阿芙蓉

精製者

桂精

十八弓

右硝子壘ニ内レ浸ス<sup>〔一〕</sup>四日、瀝過ノ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ○此液十匁ニ阿芙蓉一匁許ヲ含メリ<sup>〔依〕</sup>

〔主治〕鎮痙、催睡、止痛、發汗、驅風ノ良藥トス。嘔吐下利ヲ止メ痙攣搐掣子宮衝逆、疝痛等ヲ治スル<sup>〔一〕</sup>阿芙蓉ノ如クニメ嘔吐等ノ妨害ナシ。劑中香竄ノ品ア

レ<sup>〔一〕</sup>阿芙蓉ノ効減セズ。又虛冷ノ病ニハ尤<sup>〔一〕</sup>驗アリ○服量四五滴ヨリ二十滴ニ至ル○阿芙蓉ヲ服ノ嘔吐ヲ發スル患ヒアル者ハ左ノ劑ヲ用フベシ

芙蓉薄荷飲

桂露

薄荷舍利別

各二錢

阿芙蓉液 二十滴

右調和ス○痙攣ノ運動ニ因テ嘔吐休マズ藥汁咽ニ下リ難キ者ハ舍電發謨<sup>〔一〕</sup>阿芙蓉液ヲ温メテ毛布ヲ蘸シ心窩ニ貼メ効アリ頭痛ニハ顛顛ニ塗リ咬



牙ニハ顯ニ擦ノ良○大便秘閉セル者ハ先ヅ下劑ヲ用ヒヨク通利ノ後此劑ヲ用フベシ。否ラザレバ諸症解散シ難シ(依) (按) (亞) (邊) (疾) (叔)

阿魏 「アサフチダ」 羅 「ドイフルス」 デレキ 蘭

是ハ百兒西亞等ノ熱國ニ産スル草根ノ脂液ヲ取曝乾ノ凝固シ大小碎塊ヲ成者ナリ。上品ハ黄色ニメ赤色或赭色ヲ帯ビ。是ニ白色若クハ帶赤色ニメ透亮光澤アル顆粒。間錯シ或淡紫ノ斑アリ。乾ケハ粘潤アリ嚼タバ齒ニ粘著ス誓キク手ニ握タハ軟ナル

蠟ノ如シ。然レ年ヲ經レバ稍固クメ赭黑色ヲ帯フ。其氣蒜ニノ如ク甚ダ竄透ノ嘔噦スベキ烈臭アリ。火ニ投スレバ臭氣殊ニ甚シ。其臭烈キホド逾上品トス。固封シ貯レバ數年ヲ經レハ臭氣及効力減セス。味辛苦。舌ニ鑽透ス此物黯黑色ニメ汚物ヲ雜ヘ或軟ニメ脂膏ノ如ク或枯燥ノ粘潤ナク臭氣微クキハ藥用トセズ○或白色ノ華爾斯類ニ蒜ノ絞汁ヲ加搗テ乾シ下品ノ阿魏ニ雜ヘ偽者アリ是ハ疏脆ニメ碎易ク光滑多ク燒酒ニ浸ハ盡溶化スルヲ以テ知ベシ○此草ノ生汁ハ臭氣極ニ甚シ生汁一錢ノ



臭氣ハ乾固ノ者百北ヨリ甚シト云○其質ハ麩ゴム 華爾斯ナリ大約オヨソ 華爾斯二分麩ゴム 三分アリ故ニ燒酒ニ浸セバ溶化スレモ渣脚多シ水ニハ其麩ゴム 質盡ク溶化ス。醎醋ニ浸バ盡ク乳白色ノ液トナル。油ニ浸バ少許溶化ス。此皆麩ゴム 質多キノ微ナリ。又精微ノ油及揮發鹽アリ○此脂液ヲ取草ハヘルラ。アサフチダペルシア 羅ペルシア ンス。ホルストク蘭 ト名ク。百兒西亞リ 西里亞ア 其ニ 亞細 洲名 其他印度地方ニ産ス。初根ヨリ葉生シ長一尺五寸許。粗糙ニ ノ形芍藥ノ如ク。質刺發ハ 斯葉ニ似タリ葉ノ梗大指ノ如ク殆ト圓ク

是ヨリ小梗ヲ分チ小葉生ス。其後莖ヲ抽キ年ヲ經レバ高五六尺許。太腕ノ如シ。中實ノ髓充ツ。莖頭ニ大ナル繖花ヲ開キ子ヲ結ブ。此草生ノ四年ヲ經バ根長五尺許太人脚ノ如ク或、極ヲ爲ス。外面栗殼色。裏白色ニノ蘿蔔ノ如シ。是ニ乳白色ノ汁多ク。蒜臭極テ烈シ。根年ヲ經ニ隨ヒ其汁多ク且、粘稠ナリ。氣ニ觸テ自ラ凝固シ黃褐色トナル。此草多年枯レズ。土人初夏ノ頃。莖葉ヲ截去リ。根ニ土ヲ被フ。一月餘。復新芽ヲ生スルヲ候ウキ 根ノ頂ヲ截斷スレバ白汁滿溢シ大陽ノ暖氣ニテ自ラ乾固ス。是ヲ取復其



頂ヲ截斷ノ其汁ヲ乾固セシメ取ル。斯ノ如ク逐次ニ  
 截取テ終ニ少モ其汁ナキニ至ル。是ヲ取曝乾ノ凝  
 固セシム。土人は是ヲ飲膳調理ニ加フ葱蒜ノ如ト云  
 主治 竄透ノ壅塞ヲ開達シ刺戟衝動ノ凝結ヲ疏解  
 スル効尤峻ナリ。又ヨク表發ノ蒸氣ヲ排泄ス。○子  
 宮衝逆及痙攣ノ諸症ヲ治スル一良藥トス。又經閉  
 及痔血壅滯ヲ通スルニ峻効アリ。○此藥粘液ヲ疏  
 解シ輕ク瀉下シ且臭氣烈キニ由テ殺蟲ノ峻効ア  
 リ。其臭味ニ由テ蟲ヲ侵刺シ遂ニ其巢ヲ剿絶ス。此  
 物三錢ニ藤黃二月ヲ加三匁ヲ一丸トシ三丸宛日

四次瀉下ノ多少ニ隨テ加減シ用フ。又是ヲ長服ノ  
 ヨク條蟲ヲ殺ス。○或一味丸トシ用テ亦ヨク蛇蟲  
 ヲ殺ス。是ヲ用レバ蟲其藥氣ニ堪ズノ騷擾シ腹痛  
 搐掣神經ノ諸症ヲ發スルヲアリ。然レ虫死スレバ  
 其症頓ニ治ス。胃弱キ者ハ苦味ノ越幾斯劑健質亞  
 里幾那葛爾等或ハ鐵劑ニ加用フ酸敗液ノ症ニ  
 ノ越幾斯劑蚶石云或ハ鐵劑ニ加用フ酸敗液ノ症ニ  
 ハ制酸劑蚶石云等或ハ鐵劑ニ加用フ酸敗液ノ症ニ  
 硬腫ニハ其症ニ隨テ中和鹽霸王鹽孕水銀劑安質  
 沒扭等ニ加蟲症ニハ驅蟲劑瀉下劑ニ加ヘ用ヒ或  
 ハ吉利詞爹兒ヲ兼子施スベシ又鼓脹ノ一良藥ト



ス。毎日二錢許用ヒ時々大黃ノ丸藥ヲ用ヒ大便ヲ順  
利ノ治スル者多シ。此病粘液鬱積シ或ハ蟲アルニ  
因テ發スル者亦少カラズ。此症ハ左ノ方殊効アリ

盧會驅蟲丸

阿魏 三錢 格失亞丸料 一錢半

右研和シ三丸ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛  
用<sub>レ</sub>一日三次瀉下多キ片ハ服量ヲ減ス

○格失亞丸方

盧會 蘇甘沒担謨 各二 格碌堇篤 一  
霸王鹽 丁香油 各二

右細末トシ丁香油ヲ和シ亞刺比亞趨謨漿ヲ加テ  
泥ト爲シ三丸ヲ一丸トシ金箔或ハ甘草末ヲ衣ト  
シ三丸宛用ル<sub>レ</sub>一日三次但大便ノ多少ニ隨テ加減  
ス阿魏過服スレバ吐シ或瀉下ス。寒粘液質ノ人ハ  
瞑眩少シ○腹部諸藏ノ壅塞頑硬腫并ニ是ヨリ起  
ル腹脹水腫ニ阿魏峻効アリ。但癩瘡毒瘰ノ硬腫ハ  
効ナシ○疝腹痛ヲ治シ風氣痞滯ヲ散シ風疝腹脹  
ヲ消ス胃腸ノ運營衰弱ニノ疝痛ヲ兼ル症ニ尤良  
○胃中ニ粘液酸敗液鬱滯スル諸症及胃瘞<sub>心腹痛</sub>  
ヲ兼<sub>嘔吐</sub>ヲ治ス○痛風脚痛ニ用テ驗多シ○頑固ノ間



歇熱及是ヨリ起ル水腫ニ阿魏一味丸藥トシ或ハ  
 幾那ヲ加ヘ用テ多ク治ス○痰欬及經久ノ痰欬喘  
 急等ノ胸病ニ効多シ○腐骨疽其他惡厲ノ潰瘍ニ  
 是ヲ内服シ或ハ外敷ノ良驗アリ○服量ニ刃マデ  
 一服トシ用テ害ナシ然レ通例ニ氏ヨリ十氏マデ  
 ヲ丸藥トシ用フ或ハ是ヲ適宜ノ舍利別ニ和シ或  
 ハ芳香ノ露水ニ加ヘ或ハ雞子黃ニ研和シ用ヒ或  
 ハ龍腦麝謨安沒尼亞幾續草等ニ加ヘ丸藥トシ用  
 ヒテ良。但是ヲ用テ四日毎ニ適宜ノ下劑ヲ與フベ  
 シ○諸失血其他脫泄ノ患アル人ニ此藥ヲ用レバ

其症ヲ增長ス○痢ノ發作ニ此烟ヲ嗅シメテ醒復  
 ス○外敷メ寒腫ヲ温散シ且凝結ヲ疏解スル峻効  
 アル故ニ瘰癧等諸頑硬腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。一味  
 膏藥トシ貼メ良○腐骨疽汚穢潰爛ノ瘡瘍ニ此末  
 ヲ摻ケテ腐壞ヲ祛キ膿ヲ排ヒ淨刷ス  
 阿魏アウイ 丁テイ 幾キ 去キ 爾ル

製法

阿魏 搗碎者 一多

燒酒 二十度者 八多

右潤ヒキ格コ兒ル弗フノ半ニ充タシメ厚紙ニテ其口ヲ蓋封  
 シ。鍼ニテ其紙面ヲ穿テ幾多ノ細孔ヲ作シ。格兒弗  
 ヲ微温火上ニ置テ時々振蕩シ浸ス。六日ニノ漚



過シ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ 〔按〕

**又法** 阿魏ニ弓

硝砂加燒酒精 十二

右硝子壘ニ内レ蓋閉シ浸ス<sub>一</sub>六日。漚テ滓ヲ去リ固封シ貯フ。○服量十滴ヨリ十六滴許。葡萄酒或ハ呼<sub>メ</sub>埤等ニ點服ス。或ハ阿芙蓉液ヲ等分ニ加ヘ十二滴或ハ十五滴許用ヒテ尤<sub>モ</sub>効アリ

**〔主治〕** 子宮衝逆及ビ痙攣搐掣等葛<sub>カ</sub>私<sub>スト</sub>多<sub>レ</sub>儂<sub>レ</sub>謨<sub>ム</sub>主治ノ謹症ニ奇効アリ 〔依〕〔成〕

安息香華

フロレス・ベンソイニム<sub>ハ</sub>羅  
ベンソイン・ブルーメン<sub>ハ</sub>蘭

是ハ安息香ヲ升煨ノ汚物ヲ去リ純粹ノ精華ト爲ス者ニノ其質精微ナル酸性ノ揮發鹽ナリ。安息香十比ヨリ華一比出ツ

○按ニ安息香偽品多シ。洋船ノ品ヲ擇<sub>ニ</sub>用<sub>フ</sub>ベシ。藥舖ニ古渡ト稱スル者間<sub>マ</sub>眞品アリ和蘭說<sub>ニ</sub>云。安息香ハ應<sub>シ</sub>帝<sub>デア</sub>亞<sub>ア</sub>地方ニ産スル一種ノ樹ニ生スル華<sub>ハ</sub>爾<sub>ル</sub>斯<sub>ス</sub>ナリ。二種アリ。第一種ハ自然ニ其樹ヨリ流<sub>リ</sub>滴<sub>ル</sub>ノ顆粒ヲ爲シ虚脆ニノ碎ケ易ク。外面黄色。裏ハ白色ニノ紅白ノ條理アリ。甚<sub>ダ</sub>芳香ニノ味淡ナリ是ヲ最上品トス。又一種顆粒ヲ爲シ鮮麗淨



潔。硬固ニシテ黃白色雜リ或ハ赤色ヲ帶ビ白點アリ  
 リ芳香ニシテ甘味ヲ帶ル者アリ此亦上品トス。然  
 左二品左ニ甚稀ナリ○第二種ハ乾固ノ大塊  
 ヲ爲シ淨潔ニシテ汚物ナク硬脆ニシテ破碎シ易ク  
 光澤アリ黃白色及赤褐色ノ碎塊間錯ス。多ク鮮明  
 ナル顆粒ヲ夾ミ且破碎セル扁桃ノ如キ白點多  
 者ヲ上品トス。味油様ニシテ甘ク帶ビ佳香アリ。是  
 ヲ磨シ或ハ温レバ殊ニ香氣多シ。但楮黑色ヲ帶  
 テ汚物ヲ雜ヘ鮮麗ノ碎粒。白點ナキ者ハ下品ト  
 ス○錫蘭セイロン印度島名ノ産ハ楮赤色ノ者多シ暹羅蘇門

答刺タカラ瓜哇ヤバ同上ニ多ク産ス。亞墨利加洲ノ産ハ黑色  
 ナレ左香氣強シ○此脂ヲ生スル樹ハ喬木ニシテ  
 葉。枸櫞葉ニ似テ小。光澤ナク。背白色ヲ帶ビ花四  
 瓣黄色。山茱萸花ノ如ク實大。肉豆蔻ノ如クニシテ  
 扁圓ナリ。或云蘇門答刺ニ於テハ此樹生メ五六  
 年ヲ經テ幹六拇指横徑ヨリ八拇指横徑許ニ至  
 レバ其皮ヲ縱ニ鑽リ。脂液流淌メ皮ニ著キ乾ハ  
 是ヲ小刀ニテ刮リ取ル。其初ニ出ル脂ハ柔ニシ  
 白色。香氣尤竄透ス然レ此品他國ニ輸スナシ  
 其後數。此脂ヲ取ルニ隨テ漸ク黄色トナリ終ニ楮



色トナル又老木ヨリ出ル脂ハ楮黒色ナリ其黄  
 白楮赤等種ノ碎塊間錯スルハ其流滴セル脂  
 ノ前後早晚アル者ヲ集取テ大塊ト爲ニ因ル大  
 抵一樹ヲ鑽刻スル一十年或ハ十二年ニ其脂  
 三比許出ツ○第一種ハ甚ダ稀ナル故ニ多ク第  
 二種ヲ藥用トス黒色燥硬ニシテ香氣ナキハ他ノ  
 樹脂ヲ雜テ偽ル者ナリ○其質華爾斯ナル故ニ  
 水ニ溶化セズ油ト燒酒ニハ溶化ス

**製法**

二法アリ一ハ溶化法一ハ升煖法ナリ

**溶化製法**

安息香

上好者極細末  
適宜

鰾蓬鹽晶

安息香ノ  
四分一

雨水

安息香ノ  
六倍

右磁鍋ニ内レ手ヲ住メズ攪セ煮テ四分時ニ火  
 ヲ下シ靜定ノ上清ノ液ヲ取り其渣ニ水ヲ加ヘ前  
 法ノ如ク煮テ上清ヲ取り其清液ヲ合シ文火ニ上  
 セ水氣ヲ蒸散ノ遂ニ安息香ノ一倍ノ量ト爲シ火  
 ヲ下シ是ニ綠礬精ヲ滴シ加テ其液黄色ヲ帶ビ乾  
 酪ノ如ク凝固スルニ至リ是ニ數沸湯ヲ加テヨク  
 溶化セシメ冷處ニ置片ハ柔ニシ薄キ芒ヲ結ブ是  
 ヲ取り紙上ニ撒シ乾ノ硝子壘ニ收メ固封シ貯



升煨製法

安息香

上好者粗末  
適宜

右陶壺ノ長ク筒ノ如クシテ口窄キ者ニ入レ厚ク  
硬キ紙ニテ△形ノ蓋ヲ作り是ヲ以テ固ク壺口ヲ  
覆ヒ氣ヲノ透漏セザラシメ。其壺ヲ沙火或ハ熱灰  
ニ入レ華爾斯ノ烱ル程ノ火候ト爲ス片ハ安息香  
融解ノ其精華升騰シ其蓋ニ著テ銀白色ノ芒ヲ爲  
ス。乃チ一時毎ニ蓋ヲ換テ其華ヲ拂ヒ取り終ニ其  
華赭褐色ニノ粘リ油ノ如クナルニ至テ火ヲ下シ  
速ニ其華ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

又法

安息香

極細末  
五弓

沙

乾淨者  
安息香ノ四分一

右攪和シ陶壺ニ内レ蓋ヲ覆ヒ文火ニ上セ華ヲ取  
前法ノ如ス ○安息香華ハ白色ニメ灰色ヲ帶ビ  
光澤アリ味初甘ク後酸ヲ帶ビ頗瓊珀鹽ノ如シ

主治是安息香ノ酸性鹽ナリ安息香ニ比スレバ功  
力尤峻ニメ揮發鑽透スルノ龍腦ニ似タリ ○粘痰  
敗液等ノ肺ニ凝滯スルヲ稀豁ノ疏散シ喘急肺傷  
欬嗽及ビ肺瘍等總テ肺病ニ殊効ヲ奏シ又腦及ビ  
神經ヲ強壯ニス但肺炊衝等ノ危険ノ欬ハ寛解シ  
難シ ○服量五瓜ヨリ八瓜ニ至ル

叔依  
伍



亞鉛 「シ」ンキム又「シ」ンキ羅  
「ス」ピアウテル又「ピ」アウテル蘭

亞鉛ハ其性諸金類ニ屬スル一種ノ元素補ナリ。鉛ニ比スレバ堅固ニ破碎シ難シ。其色鉛ノ如クニ青色ヲ帶ビ。銀様ノ光澤アリ。稍打展スベシト雖モ鍛鍊シ難シ。火ニテ熔易シト雖モ鉛ノ如ク流動セズ故ニ鎔鑄シ難シ。燒煨スレバ淡綠ノ焰ヲ發シ輕虚鬆疏ニ綿絮ノ如ク白毛モシ若クハ蜘蛛絲ノ如クナリテ其質盡ク消散ス。是ニ硫黃夾雜ス即是ヲ坩鍋ニ内レ煨ケバ熔解シ鐵筋ニテ攪レバ火屑ヲ發シ白烟生スルヲ宛モ硫黃ト消石トヲ合和ノ燒

が如シ○此物一切酸液ニ溶化ス。水及ビ油ニハ溶化セズ○亞鉛ハ多ク愕斯刺盧獨歐羅巴洲ノ鉛坑ニ出ヅ。然レ下品トス。東方諸國ニ産スル者ハ美白ニノ大塊ヲ爲シ上品トス。銅鐵等ノ雜リタルハ殊ニ下品ニノ用ヒ難シ○亞鉛ハ醫藥ニ供セズ唯是ヲ製ノ華ト爲シ藥用トス

亞鉛華 「ア」ロレス。シ「ン」キ又「シ」ンキム。カルシナテム。羅  
シ「ン」キブルム。又「ス」ピアウテル。オキセイ。テ「蘭

製法 亞鉛ヲ適宜ニ取潤シ深キ坩鍋ニ内レ火ニ

上セ初蓋ヲ覆ヒ亞鉛熔ル頃ニ蓋ヲ去リ。上面ニ焰ヲ生スルニ至テ他ノ坩鍋ヲ倒ニメ覆ヒ緊ク閉ルヲナ



ク稍蒸氣ノ漏ル許ニシ其焰盡ク熄ヲ候ヒ上坩ヲ  
 取去レバ輕虛ニメ白絮ノ如キ華其坩及熔タル亞  
 鉛ニ著ク。悉是ヲ取り其坩ノ渣塊ヲ去リ。新ニ亞鉛  
 ヲ投シ熔ス。前法ノ如クニメ華ヲ取。數斯ノ如ク  
 ノ多少適意ノ量トナルニ至リ。是ヲ陶壺ニ内レ冷  
 ルヲ候ヒ水ヲ加テ溶シ濾過メ其最モ輕虛ナル者  
 ヲ取意ヲ用テ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。亞鉛  
 ハ少許宛坩ニ投メ熔スベシ一頓ニ多煨クキハ火  
 氣徹セズ溶化シ難クメ華ヲ得テ少ケレバケリ

主治 發汗劑トス或ハ吐劑下劑トシ用テアリ。服量

四匁ヨリ十二匁ニ至ル。○又鎮痙ノ良藥トシ痙痙  
 搐掣ノ諸症ニ奇効ヲ稱ス。近世名哲ノ經驗說甚ダ  
 多シ。胃腸ノ粘穢汚液ヲ驅除ノ後。二匁ヨリ五六匁  
 マデ用フ。然レハ煨衝ノ疝ヲ兼ル者。是ヲ用テ勿レ  
 腹部諸藏ノ壅塞及神思ノ感動等ヨリ發スル痙攣  
 搐掣。子宮衝逆其他神經ノ諸症ヲ治ス。○小兒蛇蟲  
 及酸敗液ヨリ起ル搐搦ニ捷効アル。鹿角精ニ勝  
 レリ。○痘ノ初熱ノ搐搦甚キニ用テ速ニ解ス。○一  
 婦人二十四歳。痙ヲ患ル。三年。其症二十四日毎ニ  
 一發ノ卒倒ス。治痙鎮痙ノ諸藥寸効ナシ。因テ亞鉛



華五匁宛用ル<sub>レ</sub>日<sub>二</sub>兩次<sub>一</sub>漸ク加テ十二匁ニ至レ<sub>レ</sub>氏  
 瞑眩セズ唯服後稍惡心ヲ覺ル<sub>レ</sub>之。是ヲ用ヒテ後  
 兩回ノ發作ハ以前ヨリ甚シ<sub>シ</sub>。然レ氏爾後漸ク減シ稍  
 筋惕肉瞤ヲ覺ル<sub>レ</sub>之ニテ卒倒ニ至ラズ。是ヲ用ル  
 一<sub>レ</sub>半歲許ニ全愈シ既ニ一年ヲ經レ<sub>レ</sub>氏微恙ナシ  
 ○亞鉛華ヲ綠礬精ニ溶シ結芒セシメテ皓礬ヲ製  
 ス。一ニ是ヲ亞鉛礬ト名ク。鎮痙ノ良効アル<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>亞鉛  
 華ト同シ<sub>シ</sub>。皓礬ニ種アリ一ハ自然生ニ<sub>レ</sub>山坑ニ出  
 條<sub>一</sub>皓礬ノ<sub>一</sub>○一少年大ニ驚怖ノ後心動悸ノ歇マズ  
 下ニ出<sub>ル</sub>。竟ニ神思鬱憂病ニ罹ル。皓礬製造二<sub>レ</sub>月ヲ取テ單方

解毒水四<sub>レ</sub>勺ニ溶シ一匙宛用ル<sub>レ</sub>日三次。一月許ニ  
 ノ回復ス<sub>ル</sub>。解毒水ハ單方復方アリ單方、羅甸名<sub>一</sub>ア<sub>一</sub>多  
 荷葉一<sub>レ</sub>比半<sub>一</sub>亞爾<sub>一</sub>鮮<sub>一</sub>德<sub>一</sub>白<sub>一</sub>並<sub>一</sub>葉<sub>一</sub>各<sub>一</sub>一<sub>レ</sub>比<sub>一</sub>。○頑固ノ傷冷  
 右水適宜ニ加ヘ蒸餾ノ露水ヲ取ル。○頑固ノ傷冷  
 毒痛及ビ是ヨリ發スル喘急小兒疫欬ニ用ヒテ治  
 驗多シ○腹内諸藏ノ壅塞スルヨリ孿急ノ乾欬ヲ  
 發シ荏苒トノ治セザル症ハ左ノ丸藥偉効アリ

鎮痙定嗽丸

著艸。越幾斯劑 一錢半。○著ハ坊間ノコギリサ<sub>一</sub>。  
 德ヲ採リ、越幾斯劑トモサ<sub>一</sub>ト呼ブ。葉及ビ花  
 法、蒲公英、越幾斯劑ト同シ  
 律比丸料 一錢



阿魏 半錢

亞鉛華 十五瓦

右二瓦ヲ一丸トシ刺蝟石ヲ衣トシ五丸宛用ル  
日ニ兩次或ハ其症ニ隨テ四次ニ至ル○小兒蛇蟲ノ  
諸症ハ左ノ丸藥甚ダ驗アリ

掃蟲銀華丸

水銀 二錢

的列竝底那 一錢

亞鉛華 二錢

右汞ト的列竝ヲ研合ノ星ヲ見ザルニ至リ。亞鉛華

及桂末少許ヲ研和シ三瓦ヲ一丸トシ初ニ丸ヲ用  
日ニ一丸宛増シ患者惡心ヲ發スルハ健胃下劑ヲ  
與ヘ。惡心歇ニ至テ稍丸藥ノ數ヲ減シ用ベシ○頑  
固ノ下利。大黃。七白葛。格安那等ヲ用テ効ナキ症ニ  
皓礬一味用テ大効ヲ得テアリ○焮腫眼ノ良藥ト  
ス亞鉛華一錢ヲ薔薇水五瓦ニ溶シ眼ニ點ノ酷厲  
液ヲ消シ痛ヲ止治ス○鴛口瘡ニ皓礬半瓦ヲ水ハ  
瓦ニ溶シ漱藥トシ良驗アリ。舌甚乾燥セズ稍焮衝  
ヲ兼ル症ニ尤良○乳頭圻裂若クハ潰爛腫痛スル  
ニ皓礬ヲ水ニ溶シ稀クシ塗或ハ亞鉛華ノ末ヲ摻



ケテ即効アリ。破爛モ亦是ヲ塗テ良○創傷潰瘍ニ  
摻ケテ痛ヲ止メ乾愈ス此末ヲ布ニ夾ミ貼ノ汚液  
多キ潰瘍ヲ乾シ治ス○疥癬ニ左ノ軟膏殊効アリ

皓黃膏

皓礬

硫黃華

老利兒細末

各等分

阿利襪油

適宜

右調和ノ軟膏トシ少許ヲ取テ掌中ニ擦ル  
次初メ疥癬多ク發出シ爾後速ニ乾治ス  
叔 搗 伍 拔  
布 淑 依

亞兒尼加羅

アルニカモンタナ羅  
ハルコロイド又ウタルヘンイ蘭

形狀 此草春月宿根ヨリ葉ヲ生シ橢圓ニメ末尖リ

三縱理若クハ五縱理アリ肥土ニ生スル者ハ潤ク

メ大車前ノ葉ノ如シ瘠地ノ者ハ狹ク長シ邊ニ鋸

齒ナク滑澤淡緑背ニ毛茸アリ葉間莖ヲ抽ク一ニ

尺傍枝ヲ分チ二葉或ハ四葉對生ス根葉ニ比スレ

バ狹ク長シ莖頭ニ黃花生シ大ナルハ徑一寸餘旋

覆花ニ似テ瓣ノ末三鋸齒アリ每瓣五鬚蕊長クメ

瓣上ニ出ツ瓣枯テ毛絮殘リ每絮一細子著ク根ハ

遠西各物考 卷十八



木ノ如ク乾ク者ハ太<sup>下</sup>甘<sup>下</sup>鶯<sup>下</sup>管ノ如シ鬚多シ。花葉根共ニ味苦クメ辛ヲ帶ビ生鮮ノ者ハ不佳ノ氣アリ。揉<sup>モミ</sup>テ嗅キ或ハ搗テ末トスレバ嚏ヲ發ス。歐羅巴洲諸國ノ原野ニ生ス。

○按ニ此草和產未詳ナラズ舶來ノ品ヲ用ベシ。主治花ヲ藥用トス。葉モ亦効アリ。根ハ吐ヲ發スル故ニ用ル<sup>下</sup>稀ナリ或云根モ亦花ト同シ下利及腐敗諸病ニ殊効アリ。末トシ沙糖ヲ加ヘ或ハ泡劑トシ用フ。○是ヲ嗅<sup>ク</sup>キハ嚏ヲ發シ。多ク服スレバ吐スル<sup>下</sup>煙草類ノ如シ。故ニ鑽透刺戟ノ經久ノ壅塞ヲ

開通シ惡液ヲ分利シ汗ヲ發シ小便ヲ利シ月經ヲ通ス。○脉管纖維及神經ノ弛弱虛衰ノ血液壅滯シ或ハ血中粘液多クノ醇精ノ質ヲ失フ諸病ニ是ヲ用レバ刺戟衝動ノ壅滯ヲ疏解シ惡液ヲ分利ノ排泄ス。故ニ總テ虛弱ニ屬スル熱病。神經熱。腐敗熱。粘液留飲過多ノ熱病ニ偉効アリ。○痰ヲ疏解メ吐セシムルニ殊効アリ。故ニ肺及ビ胸脇焮衝熱ノ劇症退キ。病勢衰ヘ唯專ラ粘痰ノ吐出ヲ要スル症ニ甚驗アリ。又虛弱ニ屬スル咽喉焮腫。久效痰喘等ニ是ヲ泡劑トシ蜜ヲ加用テ良。○扶歇蘭度<sup>ヒュヘランド</sup>名云。惡性ノ

遠西各物考

卷十八

風雲堂藏



神經熱ニ於テ患者虚脱シ危篤ノ諸症ヲ發スルニ  
 至テハ揮發衝動ノ藥劑幾那ノ條ニ註スヲ法ノ如ク片テ  
 其垂絶ノ元運カヲ挽回スル一大緊要タリ是ヲ  
 用テ脉漸緩ニシテ生シ諸器ノ機轉漸次ニ故ニ  
 復スルノ時ニ至テハ更ニ亞兒尼加根一錢ヨリ二  
 錢許ヲ取、纈草、攝爾扁答利亞世部ヲ等分ニ加泡劑  
 トシ用テ良効アリ。若シ其罷極危劇ノ時ニ當テ亞  
 爾尼加ノ刺戟シ幾那ノ收固スル藥劑ヲ用レバ虚  
 憊ノ胃腸。是ヲ消化スル一能ハズノ壅滯シ生氣揮  
 發セズノ逾、危篤ニ至ルナリ○凡、熱病ノ患者虚衰

シ生氣ノ運行怠慢ニシテ病毒排泄シ難キ症ハ此藥  
 ヲ幾那ニ加用レバ其鑽透衝動ノ効力ヲ以テヨク  
 壅塞ヲ開達シ病毒ヲ驅逐ノ排泄ス○胃腸ノ虚弱  
 ニ因リ或ハ腸間膜。壅塞スルヨリ發スル經久ノ下  
 利ヲ治ス○赤痢ノ惡性ニシテ腐敗ヲ兼ル症腐敗熱ノ症アリ  
 ルヲハ此藥尤効アリ其刺戟衝動ノ功力ニ由テヨ  
 ク病毒ヲ排泄ス。否ザレバ其毒鬱積ノ腸ヲ侵蝕シ  
 寒壞疽トナリテ救、レザル者アリ。此症ハ左ノ方殊  
 ニ良驗アリ

亞兒尼加排毒飲



亞兒尼加花 三錢

右沸湯九勺ニ浸ス、七八分時漚過ノ滓ヲ去リ、次ノ二品ヲ加フ

醋 三勺

過爾託亞舍利別 二勺

右調和シ四分時ニ二匙宛用、每次大麥煎汁ニ綠礬精ヲ滴シ加テ適意ノ酸味ト爲與フ○痲痺及各部痲痺殊ニ半身不遂ノ症ニ効アリ、是ヲ服ノ患部搔痒或刺痛或筋惕ヲ發スルハ良候トス或經久ノ傷冷毒痛、痛風或痙攣ニ亞兒尼加ヲ内服外用ノ効多

シ○黑障眼ニ多ク治驗ヲ稱ス、數日は用テ眼痛ヲ發スルハ善徵トス、是ヲ以テ視神經ヲ衝開シ壅塞セル粘液ヲ驅除スレバナリ○打撲傷ニテ内部ノ血脉破裂ノ吐血、衄血、尿血等ヲ發シ或其血内部ニ凝滯ノ諸症ヲ發シ或皮下ニ泛溢ノ青斑トナル者ハ皆此藥ヲ内服外用ノヨク其瘀血ヲ驅散シ治○凝血ヲ疏解スル効アルニ由テ經閉ニ用テ効多  
**服量**花一錢ヨリ二錢マデ沸湯八勺ヲ加テ泡劑トシ服ス、或香竈揮發ノ藥ヲ加用フ、甚濃ク泡出スレバ吐ヲ發ス或花一錢ヲ取、泡劑若クハ浸劑トシ朝



夕一服宛用ヒ漸加テ二錢ニ至ル感動少キ人ハ四  
 錢マデ用。或末トシ二錢若<sup>モ</sup>ハ三錢ニ蜜ヲ加煉膏ト  
 シ毎日服ス○或越<sup>エ</sup>幾<sup>キ</sup>斯<sup>ス</sup>劑<sup>ト</sup>製法蒲公英<sup>ト</sup>越<sup>エ</sup>  
 二錢ヨリ六錢ニ至ル或花若<sup>モ</sup>ハ葉四錢ヲ取麥酒葡  
 萄酒等四十弓ニ浸用フ○此花ニ麴<sup>ク</sup>及<sup>ハ</sup>華爾斯<sup>ス</sup>多<sup>シ</sup>  
 ○胃ノ感動シ易キ人ハ此藥ヲ服ノ嘔吐腹痛等ヲ  
 發スル<sup>ト</sup>アリ此症ハ初少許宛用<sup>テ</sup>漸<sup>ナ</sup>慣<sup>ル</sup>レバ大抵  
 自ラ止<sup>ム</sup>或緩和ノ効アル藥ヲ加用フ。然<sup>レ</sup>ハ過服スレ  
 バ其症ヲ發スルノミナラズ或胃腸<sup>ノ</sup>嗽衝<sup>ノ</sup>煩悶<sup>ノ</sup>失血  
 眩冒<sup>ノ</sup>麻痺等ヲ發スル<sup>ト</sup>アリ。若<sup>モ</sup>此症ヲ發セバ醋<sup>ヲ</sup>橙

汁ノ如キ酸味ノ液ヲ用レバ速ニ解ス或此花ニ微  
 細ノ毒蟲著<sup>リ</sup>アリ誤テ是ヲ服スレバ右ノ症ヲ發  
 ス。ヨク意ヲ用<sup>テ</sup>是ヲ除<sup>ベシ</sup>○此藥ハ熱性ニノ鑽  
 透刺戟スル故ニ一切壯實多血ノ症<sup>ノ</sup>嗽衝病<sup>ノ</sup>内因ヨ  
 リ發スル諸失血<sup>ノ</sup>胃腸ノ感觸シ易キ者ニハ皆害ア  
 リ○外用ニハ濃煎ノ蒸湯劑トシ或燒酒少許ヲ加  
 温<sup>テ</sup>施シ或<sup>ハ</sup>琶<sup>布</sup>トシ外敷ス殊ニ麻痺不遂或膀胱  
 ノ麻痺ヨリ起ル小便閉及打撲傷ニ良効ヲ稱ス或  
 花及<sup>ハ</sup>葉ノ末ヲ嚏藥トシ鼻ニ吸入ノヨク頭中ノ惡  
 液ヲ排泄ス○特伊滿<sup>人</sup>ノ經驗說ニ云<sup>ハ</sup>間歇熱ハ初



發其症ニ隨テ吐劑或下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨刷シ飲  
 食ヲ節慎ノ幾<sup>キナ</sup>那ヲ用レバ大抵治ベシト雖モ極テ  
 頑固ノ症ニ至テハ多<sup>キナ</sup>幾<sup>キナ</sup>那ヲ連服スレバ効ナク或  
 腹部ノ諸器壅塞硬結ノ塊腫ヲ生シ諸液腐敗ノ日  
 虛羸ニ就ク者アリ。是病性頑固ニシテ神經勞弊シ内  
 藏ノ諸管壅塞ノ敗液滯積スレバナリ。此症ハ專<sup>ラ</sup>壅  
 塞ヲ通シ腐敗ヲ除<sup>キ</sup>神經ヲ強壯スルニ非レバ全功  
 ヲ收難シ故ニ幾<sup>キナ</sup>那ノ功ナキ症ニ亞<sup>アル</sup>兒<sup>ニ</sup>加<sup>カ</sup>ヲ用テ  
 殊効ヲ得ル者甚多シ左ニ其治驗ヲ舉<sup>ル</sup>一婦人年三  
 十五。四月下旬ニ三日熱ヲ患フ。初<sup>ニ</sup>下劑ヲ與テ胃腸

ヲ淨掃シ次テ幾<sup>キナ</sup>那ノ濃煎劑ヲ用ヒ或安<sup>イ</sup>質<sup>シ</sup>沒<sup>ト</sup>扭<sup>ニ</sup>劑  
 ヲ加<sup>フ</sup>與<sup>フ</sup>レバ効ナシ。因テ幾<sup>キナ</sup>那ノ末ヲ取テ其間日ニ  
 一<sup>ツ</sup>弓<sup>ツ</sup>宛<sup>ツ</sup>用<sup>レ</sup>レバ治セズ淹滯ノ翌年六月ニ至ル。終ニ  
 亞<sup>アル</sup>兒<sup>ニ</sup>加<sup>カ</sup>花四錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ服セシム。  
 次ノ發作以前ニ比スレバ遲<sup>キ</sup>一時。且諸症劇盛ニ  
 ノ終ニ大ニ粘汗ヲ發ス。爾後此劑ヲ用ルニ次ノ發  
 作ノ後小便多ク逆ヲ生ス。是ニ於テ其花三弓ヲ取  
 テ泡劑トシ間日ニ盡<sup>ク</sup>服セシム。是ヨリ其熱再發セ  
 ズ諸症脫然タリ一婦人年四十二。初冬日發熱ニ罹<sup>ル</sup>  
 リ下劑及對症ノ藥劑ヲ用テ其熱治ス。然<sup>レ</sup>爾<sup>ニ</sup>後<sup>ニ</sup>飲



食ヲ慎マズ藥劑ヲ怠ニ由テ黃疸ヲ發シ食進マズ  
 腹脹右脇鈍痛ス。因テ解凝劑及下劑ヲ用テ腹脹減  
 シ食稍進メ凡黃疸及脇痛荏苒トメ治セズ。翌年三  
 月下旬ニ至リ又三日熱ヲ兼發ス。因テ亞兒尼加花  
 ヲ以テ間日ニ用テ前法ノ如クシ黃疸漸減スレ凡  
 熱ノ發作更ニ增劇シ患者虛憊甚シ。故ニ幾那煎ヲ  
 用テ數日ニメ精力稍復スレ凡其熱減セズ。黃疸亦  
 增長シ遷延替留ノ七月中旬ニ至ル。是ニ於テ又亞  
 兒尼加花六錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ用フ。是ヨリ  
 第八日ニ當テ又三弓ヲ取テ泡劑トシ與フ。其後熱

ノ發作並ニ黃疸大ニ減シ時粘痰ヲ吐シ或發汗シ  
 發作ノ終リニ於テ殊甚ク且臭氣アリテ粘著ス。爾後  
 此藥ヲ連用スルテ三週ニメ其熱發セス諸症盡治  
 ス一婦人年十八。四月下旬三日熱ヲ患ヒ諸藥効ナ  
 ク六月下旬ニ至ル。因テ此花ノ泡劑ヲ用テ其發作  
 殊甚ク且患者湯液ヲ嫌ヒ惡ニ因テ此花ヲ未トシ  
 二錢ヲ取テ蜜一弓半ニ和シ間日ニ服セシム。是ヨ  
 リ其熱漸減シ第十發ニ至テ悉平復ス一婦人年七  
 十二。三日熱ニ罹リ多幾那ヲ服スレ凡驗ナシ。因テ  
 輕下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃シ。此花六錢ヲ泡劑トシ



間日ニ用フ。是ヨリ漸發汗ノ熱減スレ<sub>レ</sub>臣患者甚勞倦ノ舉動ニ堪<sub>ス</sub>。爾後此藥ヲ連進スル<sub>レ</sub>十四日ニ<sub>レ</sub>總身夥ク斑疹ヲ發ス。是ヨリ勞倦頓ニ治シ其熱モ亦再發セズ。是其酷厲ナル熱病毒驅發セラレテ斑疹トナリ排泄スル顯微トス一婦人年六十一。資稟薄弱ニ<sub>レ</sub>子宮衝逆ノ患アリ。偶頑固ノ間日熱ヲ患ヒ發作スレバ痙攣ヲ發<sub>シ</sub>言<sub>フ</sub>能ハズ。予是ヲ診<sub>シ</sub>ノ以爲是<sub>レ</sub>其熱病頑固ニ<sub>レ</sub>神經大ニ罷勞シ子宮衝逆ヲ兼ルナリ。故ニ其發作ニ隨テ神經ノ諸症<sub>痙攣</sub>ヲ發スルノ<sub>レ</sub>ニ。乃<sub>チ</sub>神經劑並ニ幾那<sub>ヲ</sub>投シ或龍腦<sub>ヲ</sub>加

與<sub>レ</sub>臣寸効ナシ。是ニ於テ亞兒尼加花ノ泡劑ヲ用ルニ嘔吐ノ服スル<sub>レ</sub>能<sub>ズ</sub>。因テ左ノ丸藥ヲ製用<sub>ス</sub>

**幾那亞兒尼加丸**

亞兒尼加花 末

幾那 各二錢

拔爾撒謨 亭露

適宜

右調和シ三瓜<sub>ヲ</sub>一丸トシ銀箔<sub>ヲ</sub>衣トシ發作ナキ時。半時ニ五丸宛用<sub>ス</sub>。其後多發汗シ是ヨリ第四發ニ至テ痙攣ノ症減シ。言語<sub>ヲ</sub>妨<sub>ズ</sub>。調治二十餘<sub>日</sub>ノ熱病全治シ爾後暫<sub>ク</sub>此藥ヲ服<sub>メ</sub>痙攣ノ症悉愈<sub>ス</sub>



○右ノ經驗說ニ因テ考レバ血液中酷厲毒アルヨ  
 リ發スル經久ノ諸病或腐敗ヲ兼ル熱病及腐敗熱  
 ノ如キハ此藥ヲ用テ其酷厲毒及腐敗液ヲ分利排  
 泄ノ殊効ヲ得ベキヲ類推ノ知ベシ或ハ胃腸ニ汚  
 物敗液鬱滯スル者ニ是ヲ用レバ嘔吐ヲ發スルヲ  
 アリ故ニ預メ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ清刷ノ用ベシ但  
 胃腸淨潔ナレバ吐ヲ發スル者ハ服量ヲ減シ用テ  
 漸ク慣シムレバ吐スルヲナシ

叔叔  
依福

遠西醫方名物考卷十八終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱

棟澤幸川先生著

全三冊

理學植學啓原

宇田川掃庵先生著

全三冊

同 内象銅版圖

同上

全一帖舍密開宗

同上

每篇三冊宛  
白初篇三篇

增補和蘭藥鏡

同上

全一冊醫療正始

沖齋伊東先生著

每篇三冊宛  
白初篇至七篇

遠西醫方名物考

同上

全一冊泰山名醫彙講

藤川實作先生著

全八冊

同 補遺

同上

全九冊要術知新

大塚實隆先生著

全三冊

瘍醫新書

玄澤大龜先生著

全四冊醫方例幾

藤澤足草先生著

每篇三冊宛  
初篇二篇

蘭學階梯

同上

全三冊同方劑篇

同上

全三冊

蘭學佩觿

同上

全一帖西音發微

大塚實隆先生著

全二冊

幼幼精義

素齋齋内先生著

全三冊

病學通論

此書醫方彙講宛

初篇三冊宛  
二篇三冊宛  
三篇四冊宛  
四篇出妙

濟世三方

松田成卿先生著


全四冊

青藜閣

江戸淺草茅町三丁目

須原屋伊八







榛齋字田川先生著

六篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌