

遠西醫方名物考

之三

卷二十六

蔵 9
857
45-26

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9
號 8 第
册 26 第



門城
號 857
卷 45-26

遠西醫方名物考標目

遠西醫方名物考標目

卷二十六

失歇篤

靈貓

失鳩答

產地

性情

食料

香囊

採香

香質

主治

形狀

性

解毒法

主治

失鳩答膏

失鳩答越幾斯劑

服量

內
五年九月
田糸二氏
贈寄

藏書

遠西醫方名物考標目

附 荳蔻

形状 性 主治

服量

荳蔻散

龍麝荳蔻散

荳蔻越幾斯劑

蒸餾醋

製法 試法 醇精醋

性 主治

雙酸清涼飲 香竄醋

香醋飲

外敷諸法



遠西醫方名物考卷二十六

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

失歇篤シハト蘭ラン シベテウムシベテウム 羅

○按ニ失歇篤ハ靈貓ノ兩陰間ニアル囊中ノ香液ナリ靈貓一名香狸。和蘭ニモスクス。カト又シヘット。カトト名クモスクスハ麝香ナリカトハ猫ナリ失歇篤ノ氣麝香ニ似タルヲ以テナリ 本邦ニテ是ヲジャカウ子コト呼ブニ相符ス和産詳ナラズ薩州及ヒ長崎ニハ稀ニ舶來アリト云

靈貓形ヲ猫ニ似テ稍大。鼻端ヨリ尾ノ端マデ二尺餘。頭短ク鼻長ク眼小。稍長シ。耳小。貓耳ニ似テ尖ラズ。牙尖利ニメ狗ノ如シ。脚短小。前脚殊ニ短ク五指横徑許。五指アリ。爪直ニメ尖リ黒シ。全軀ノ毛ニ様アリ。一ハ長ク硬粗ニメ黑白茶褐ノ三色雜リ。黒斑及ビ條紋ヲ爲ス。一ハ短ク柔細。灰色ニメ赭色ヲ帶ビ。縷縮ノ長毛ニ間ル。頭ノ兩脇ニ大ナル黒斑アリテ眼ヲ圍ム。體軀。頸及ビ尾ハ毛長ク硬粗ナリ。頭ハ毛短ク灰色ニメ黒色間ル。鼻灰白。其端黒色。耳ノ外面黒ク。裏白シ。頸。黒白ノ斑ヲ爲シ。吻ト腹ハ黒シ。

尾ノ上面ハ黒色。兩側及ビ下面ハ白毛雜リ。或ハ黒白ノ輪紋ヲ爲ス。脚ハ毛短ク頭ノ如シ。

產地此獸ハ亞弗利加洲ノ諸國殊ニ加依魯。厄日多。爲匿亞。亞墨利加洲ノ伯西兒。新伊。斯把泥。亞。字露。或ハ支那。其他亞細亞洲諸國ノ山野ニ穴居ス。多ク子ヲ産ム。小獸諸鳥ヲ食トシ。缺レバ果類。菜草ヲ食フ。係蹄ヲ以テ捕ヘ。鐵檻ニ内レ。他邦ニ貨ス。

性情性兇悍ニメ馴レ難ク。人是ニ觸レハ。抓破シ。或ハ咬傷ス。但幼ヨリ畜テ。檻ヲ放テ。漸ク慣レシムレバ。馴レテ。戯ル。猫ノ如シ。然レハ。少ク怒レバ。動モスレ

バ人ヲ咬ム其狀貌柔弱懶惰ナル如シト雖モ蟲鼠鳥類ヲ捕ルニハ奔跳飛越ノ輕敏ナルヲ貓ニ減セズ。夜視眼光アルヲ亦貓ト同シ

〔食料〕牛乳及ビ雞卵ヲ最良トス。肉類及ビ穀果蔬菜等ニテ畜ヘバ失歇篤ノ性能香氣劣弱ナリ是ヲ他國ニ輸ルト雖モ意ヲ用テ良食ヲ與ヘ畜ヘハヨク生育ノ失歇篤ヲ取ルト產地ニ異ナラズ然レ元來暖國ノ産ナル故ニ寒地及ビ寒暖中和ノ國ニ來レバ精力稍減ノ子ヲ産セズ

〔香囊〕牝牝ニ陰具ト肛門トノ間ニ一披溝アリ内

ニ短毛被^{オホ}フ其左右ニ膜囊アリテ皮上ニ隆起シ。溝ノ唇ヲ爲ス。其囊長三拇指橫徑許。濶二拇指半橫徑許。其内。鴿卵ヲ容ルベシ或云此囊牝ハ大ニノ牝ニ倍スト囊ノ内外幾多ノ腺アリ又溝内ノ左右ニ二腺アリテ共ニ失歇篤ヲ分泌シ囊中ニ藏ム。溝内ノ兩側ニ各一孔アリテ兩囊ニ通シ失歇篤ヲ溝ニ流泄ス

〔採香〕失歇篤ヲ取ルニハ其檻ノ前ヨリ棍ヲ入テ是ヲ後邊ニ逐行リ檻後ノ格子ノ間ヨリ其尾ヲ把住シ板二枚ヲ檻ニ入レ此獸ノ兩脇ヲ夾テ動搖セザラシメ。後脚ヲ格子ニ結縛シ小匙ヲ以テ徐々ニ溝内

ヲ刮^コケ其液ヲ抄^スヒ取ルナリ。或ハ時候ノ寒暖ニ隨テ其液出ル^ルト多少アリ故ニ毎日或ハ隔日或ハ三日ニ^{イナド}一次取り大抵二日ニ一錢許出ツ。此獸山野ニ在テハ自ラ木石ニ觸^レテ此液ヲ剔出スト云

香質 失歇^{シト}篤^トハ其質蜜ノ如ク牛酪ニ似タル稠厚ノ液ナリ新鮮上好ノ品ハ白色及^ヒ黃白色。其氣烈ニノ麝香ノ如ク且^ツ琥珀油ノ如キ臭ヲ帶ブ。味苦シ。上品ハ白色ナレ^レ時ヲ經レバ漸ク黃色トナリ終ニ赭色トナル。或ハ帶黃灰色或ハ赤色ヲ帶ル者アリ。凡^ソ赭色多キホド逾^レ下品トス是ヲ紙ニ攤^クテ平等ニノ

粒塊ナク脂ノ腐敗セル如キ臭氣ナキヲ上品トス此液ニ酪及^ヒ脂類ヲ雜ヘ偽リ販ク者多シ○乳汁及^ヒ雞卵ヲ以テ畜フ者ハ失歇^{シト}篤^ト白色ニノ上品ナリ。肉類果菜ヲ以テ畜フ者ハ其液赭色ニノ其香及^ヒ性功劣レリ

主治 油氣揮發鹽多シ。鎮痛。解凝。緩和ノ良効ヲ奏シ神經ヲ強壯ス。疝痛。小兒腹痛。子宮硬腫及^ヒ衝逆等ニ是ヲ臍ニ擦テ偉効アリ。但^シ婦人ハ此香氣ヲ嫌フ者多シ○多ク香料ニ用フ。少許ヲ取テ他ノ香料ニ加^レレバ佳香ヲ生^メノ麝香ノ如シ○此物燒酒ニハ溶

化セズ。油脂類ニハヨク溶化ス 依叔 裴伍 叔

失鳩答羅 シキウ タ

ゴニウム。マモラ。チム。羅。ゲ。フ。ネ。ク。テ。シ。ケル。リ。ク。蘭。レ。ケル。アル。又。ゲ。フ。ネ。ク。テ。シ。ケル。リ。ク。蘭。

形状 此草高二三尺許。圓莖滑澤ニシテ中虛。苗香ノ莖ニ似テ太ク。節アリ。是ヨリ傍枝ヲ生メ逐次ニ小椹ヲ分ツ。淡綠色ニシテ紅紫若ハ赭色ノ斑アリ宛モ蛇皮ノ如シ。葉ハ芹葉ニシテ粗糙。光澤アリテ羊齒狀ヲ爲シ面綠色ニシテ背淡綠色。揉テ嗅ゲバ嫌ヒ惡ムベキ毒様ノ臭氣アリ。猫尿若ハ芫菁ノ臭ノ如シ。味辛苦ニシテ微甘。莖枝共ニ莖衣アリ。葉柄ノ著ク處ハ凹

ニシテ莖ヲ包圍ス。莖枝頭ニ五瓣ノ小白花ヲ開キ大ナル繖ヲ爲ス。花後子ヲ結ブ。過泥子テ差大ニ似テ白ク五縱道アリ。根太サ指ノ如ク二三寸。若ハ七八寸許。白色。其氣苛烈ニシテ味微甘ヲ帶ブ。嫩根ハ乳白色ノ汁ヲ含リ平原荒野ノ陰地。路傍。溝池ノ邊ニ生シ二年ニシテ枯レ新苗生ス。園生ノ者ハ藥用トセズ。○此草種類多ク相似テ真ヲ亂ル。ヨク擇ムベシ。莖ニ斑アレハ臭氣ナキハ本種ニ非ズ。斯篤爾窟名ノ説ニ此根ノ生汁ヲ舌ニ滴スレバ苦辛ニシテ舌麻痺シ次テ腫痛拘強ノ言フ能ハズ。本種ニ非レバ

漢西各物考 卷二十六 風雲堂

此苛烈ノ味ナシト云リ一種ギフチヘ。ワートルシケ
 ルリングト名ル草アリ全形失鳩答ノ如クニノ莖
 ニ斑ナク葉ノ臭氣微ナリ。莖ニ稜及ビ條理アリ。根
 ニ近キ處赤色ヲ帶ビ葉差長ク鋸齒アリ。根黑色。拇
 指大ニノ末尖リ鬚根アリ。截レバ焦黄色ノ汁出ツ。
 味苦シ榕按ニ是レ本邦ニ和蘭及ビ勿能泥亞都
 産スル毒芹ト呼フ者ニ於テモ誤テ是ヲ失鳩答ニ充テ用テ効驗ナシト
 スル者多シ一種ベドウルクムデトイフ。シケルリン
 グト名ル者ハ葉黒綠色ニノ背光澤アリ一種ベド
 ウルクムデ。パイプロコロイドト名ル者ハ莖葉共ニ毛

茸アリテ粗糙ナリ又一種根太クノ卵圓形ノ者ア
 リ此皆其種類ニノ藥用トセス○凡ノ野草ヲ食フ
 獸類ハ自ラ此草ノ毒アルヲ知テ是ヲ避ク
 ○榕按ニ本邦ニ大芹オホセリトクベリ毒芹クサノハ葉鈎吻ト呼ブ草。
 毒アリテ形狀失鳩答ニ似タリ故ニ失鳩答ニ充
 ル者アレ其莖ニ斑ナク。葉ニ猫尿ノ如キ苛烈
 ノ臭氣ナシ。是右ノ譯説ニ舉ル一種ニノ藥用ニ
 充ザル者ナリ。和蘭ニ於テモ誤テ是ヲ本種トシ
 用テ効ナシトスル者アリト云江戸郊外ニ於テ
 未本種ニ充ベキ者ヲ見ズ故ニ姑ク其形狀ヲ記

ノ後來充當ノ考證トス。福云失鳩答。越幾斯劑ノ
効用雙蘭菊越幾斯劑前ニ出ツノ如シト。又苒若モ一
種ノ毒草ニシテ瘰癧毒。腺腫ヲ治スル効失鳩答ノ
如シ。故ニ是ヲ失鳩答主治ノ後ニ附メ參考ニ備
性失鳩答ハ一種ノ酷厲毒アリテ過服スレバ眩暈
昏冒麻痺搐掣精神錯亂或ハ吐利心腹痛胃腸炊衝
ヲ發シ速ニ救療ヲ加ヘザレバ死ス其麻痺酷厲毒
ノ性。苒若。番木鱉ノ類ニ屬シ凝體諸器ヲ溶解シ血
液ヲ渙崩シ神經ヲ虛衰セシムルヲ自餘ノ酷厲ナ
ル麻痺毒アリテ解凝ノ効ヲ爲ス諸藥ノ如シ。故ニ

虛弱ノ人及ビ神經感動シ易キ者ニ是ヲ用フレバ
兼用ノ藥ヲ以テ其害ヲ防クベシ

解毒法 若シ是ヲ過用メ瞑眩烈キ者ハ微温湯ニ油

若ハ蜜ヲ加ヘ與テ吐セシメ或ハ吐劑ヲ用テ其毒
ヲ除ケバ治ス。或ハ橙汁。醋等酸味ノ液ヲ與フベシ
ヨク其毒ヲ解ス。海葱蜜モ亦良。又清凉緩和ノ吉利
詞參兒ヲ施メ腸ノ炊衝ヲ治スベシ

主治 刺戟衝動シ麻痺セシメ疼ヲ止メ睡ラシメ血
中ノ酷厲毒ヲ驅除ス。○凝結ヲ溶解稀釋スル峻藥
トス。癰樣ノ硬腫。頑固ノ腺腫瘰癧ヲ消散ス。○斯篤

爾窟^ル名^人此藥ヲ用テ癌腫ニ奇効ヲ奏シ其經驗說甚多シ。然^レ在^レ醫家或ハ是^レヲ用テ効ナク或ハ潰破ノ癌瘡ニハ却テ腐敗ヲ增長ノ害アリトシ是^レヲ詆誹スル者少カラズ。是^レ究竟癌腫ト腺腫トノ區別明白ナラザレバナナリ。眞ノ癌腫ハ失鳩^シ答^タ及^レ莨菪等ニテ治スル^コ稀ナリ。唯癌ニ似タル腺ノ硬腫。瘰癧腫ニハ効驗アル^コ毫疑ナシ。患者甚ダ衰弱スレ^レ在^レ較著ノ酷厲毒鬱蓄セル候ナク其腺劇キ炊衝ナキ者ハ是ヲ用テ殊効アリ○酷厲ナル瘰癧毒ヨリ來ル腺ノ硬腫ハ此藥ヲ用テ治スル^コ古今明哲ノ經驗甚ダ

多シ^レ傑^カ泄^セ兒^ル名^人云。一患者乳房ニ瘰癧毒ノ硬腫ヲ發シ宛モ乳癌ノ如シ。諸醫多ク不治トス。此藥ヲ内服セシメテ其腫半消散シ半善膿ヲ釀ノ潰破シ治スト。其他瘰癧腫及其毒ヨリ發スル諸惡症或ハ乳癌ノ如キ症ヲ治シ或ハ幾^ヤ那^ナヲ加ヘ用テ効アル經驗說甚ダ多シ○頑固ノ腺腫。瘰癧腫ハ外敷藥ニテ愈ス^コナク唯此藥ヲ内服セシメテ消散シ或ハ潰破シ善膿ヲ生メ治スル者多シ○或云。癌瘡様ノ潰瘍。臭氣近^クグベカラズ劇痛。燒^カ如^キ症ニ此藥ヲ内服外敷シ其酷厲稀涼ノ敗血漿ヲ和解メ善膿ト爲シ

治スルコトアリ。内服ニハ是ヲ越幾斯劑トシ用ルヲ
 良トス。小兒ハ沙糖ヲ加、舍利別トシ或ハ昆設爾弗
 ト爲シ用ベシ。○子宮口ノ硬結腫痛ノ漸、癌瘡ノ如
 ク臭穢ノ汚液流泄ノ惡性ノ白帶下トナル者ハ此
 越幾斯劑ヲ用テ全治スル者多シ。○瘰癧毒ニ因テ
 唇ニ癌様ノ腫ヲ發スル者多シ。其症。下唇ヨリハ上
 唇多ク腫起シ中間圻裂ノ疼痛シ其毒漸、眼ニ浸淫
 シ焮痛メ潰爛ス。便チ此越幾斯劑ニ越謨安沒尼亞
 幾ノ乳劑製法扁桃乳ト同シヲ加、用テ多ク治ス。是尋常失苟
 兒陪苦ノ毒ヨリ發スル症ト異ナリ。○癌様ノ硬結

セル腺腫ニ此藥ヲ外敷メ消散シ其痛ヲ甘解ス或
 ハ此草ヲ末トシ玫瑰蜜ニ和シ癌様ノ硬腫潰瘍等
 ノ邊圍ニ塗テ劇痛ヲ解散ス或ハ頑固ノ乳房硬腫
 ニ此越幾斯劑ノ膏藥ノ如クシ貼メ消散スル者多
 シ。乳房ニ乳汁凝結メ發スル硬腫ハ殊ニヨク消散
 ス。或ハ打撲傷。其他外傷ニ因テ硬腫トナリ疼アル
 者右ノ諸症何モ是ヲ貼メ發泡スルコト火傷ノ如キ
 者ハ其泡自乾マデ其膏ヲ貼メハ消散ス。若シ發泡
 セザル者ハ數是ヲ貼メ發泡セシメ乾シ愈スベシ
 ○内藏諸腺ノ壅塞硬腫ニ峻効アリ。ヨク其凝結ヲ

溶解シ壅滯ヲ疏散ス小兒ノ肝脾腸間膜等ノ腺壅塞ノ腹肚臍脹硬滿シ肢體羸瘦スル症ニ良驗アリ
○瘰癧毒ヨリ發スル勞效ニ間偉効アリ然レ疔病勢既ニ增長スル者ハ驗ナシ○肝脾腸間膜等ノ硬腫ニ此藥ヲ蒸溺劑トシ或ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ貼メヨク消散ス○或云眞ノ癌腫ハ固ヨリ治スベカラズト雖モ古今ノ醫家此藥ノ治驗ヲ稱スルヲ甚ダ多シ或ハ癌ト腺腫ト相似テ混同スル故ニ癌様ノ腫ト雖モ未增長セズ甚ダ危險ニ至ラザル症ハ先此藥ヲ試用ベシ縱ハ良効ヲ得ズト雖モ

他ニ治スベキ藥ナケレバナリ是ヲ用テ諸症逾増進スルキハ唯緩和鎮痛ノ劑ヲ投メ當時ノ患苦ヲ安撫シ劇症ヲ甘解シ其酷厲稀涼ノ液ヲ化熟ノ稠膿トナラシメ腐敗ヲ防護シ精力ヲ保續セシムベシト○或云醫家此藥ヲ用テ良驗ヲ得ザル所以ノ者數件アリ是レハ眞ノ失鳩答ヲ鑒識セズノ誤テ其種類ヲ充用ルニ因リ一ハ患者虛羸シ此毒藥ニ堪ズメ久服スルヲ能ハザルニ因リ一ハ病毒極テ猛惡ニメ藥力是ヲ剋制スルヲ能ハザルニ因ル是猶水銀幾那阿芙蓉等モ百發的當ノ効ヲ得難キガ

如シ。或ハ患者ノ稟賦異常ニ峻攻ノ藥ト雖モ効
 ナキコアリ譬ハ徽毒ニ水銀ヲ用テ寸効ナク又毫
 モ瞑眩セザル者アルガ如シ○此藥ハ酷厲毒ノ各
 部ニ凝結ノ牢固頑滯スルヲ溶解シ疏散スルノ峻
 効アリ故ニ痛風傷冷毒痛經久治セズ腫痛甚ク諸
 藥効ナキ症ニ用テ捷効ヲ得ル者多シ或ハ頑固ノ
 臂痛諸藥効ナキ者初ニ此越幾斯劑少許ヲ用ヒ漸
 加テ日ニ半錢ニ至リ三週ニメ全治スル者アリ或
 ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ腕股等ノ痛風ニ貼
 ノ消散スル者多シ○徽毒ニ因テ諸部疼痛荏苒ト

ノ解セズ或ハ徽毒經久ノ潰瘍瘰癧硬腫鼻中潰爛
 ノ骨ヲ腐蝕スル等。其他諸惡症水銀劑升汞等ヲ多
 グ用テ効ナキ者ハ此越幾斯劑ヲ與テ大効ヲ得ル
 コ多シ。或ハ越幾斯劑効ナキ者ハ此葉ノ末一錢ヲ
 取テ蜜一弓ニ和シ用テ速ニ治スルコアリ其劇痛
 休マザル症ハ此越幾斯劑ニ阿芙蓉ヲ加用テ捷効
 アリ○此藥ハ凝結ヲ溶解シ蒸氣ヲ發泄シ疼痛ヲ
 止ル効アル故ニ徽毒ノ潰瘍ノミナラズ總テ經久
 惡厲ノ潰瘍腐骨疽等ニ内服外敷ノ間偉効アリ或
 ハ脚ノ癩瘡諸藥効ナキ者ニ是ヲ用テ速ニ治スル

トアリ○惡厲ノ疥癬。頭瘡。經久ノ瘡瘍。頑固ノ皮病。尋常ノ藥劑ニテ治セザル者ハ是ヲ用テ驗多シ○經久ノ瘡瘍。一切頑固ノ皮病ニ左ノ方。殊効アリ

失鳩答膏

失鳩答シキウタ末 二錢

白蜜 二弓

右調和シ一卵匙宛服スルト日二次○痘瘡後。其毒滯著ノ諸惡症ヲ發シ或ハ小兒尙儂或ハ頑固ノ黃疽。水腫。癩。久効。惡性ノ白帶下。黑障眼ノ初發。經久ノ陰痿等解凝ノ諸藥寸効ナキ症ニ左ノ越幾斯劑ヲ

用テ間奇効ヲ得ルトアリ

失鳩答。越幾斯劑

エキスタラクト。ハン。ドルレケルフル蘭

失鳩答シキウタ 生鮮者

右花候前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布袋ニ内レ絞テ汁ヲ取リ磁鍋ニ内レ火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煎熬ノ蜜ノ稠ト爲シ放冷シ此膏二十弓ニ失鳩答乾葉ノ細末五弓ヲ攪和シ丸藥ト爲ベキ稠ト爲シ固封シ貯フ後○或ハ乾葉ノ末ヲ加ズ絞汁ノニ煎熬ノ膏ト爲モ良大約絞汁六比ニテ此劑一比ヲ製ス液
服量 此越幾斯劑ハ日一瓦ヲ用ヒ漸加テ一錢ニ至

ル或ハ二日ヲ一丸トシ朝夕一丸宛茶湯ニテ送下
 シ三日毎ニ一丸宛増加テ患者頭目困重昏暈惡心
 等。瞑眩ノ症アルヲ度トシ服量ヲ減シ若ハ暫ク休
 其症治ノ復用ベシ。此藥ハ瞑眩スル許ニ用テ諸器
 血液ノ運動ヲ變化セシムルニ非レバ頑固ノ壅塞
 ヲ溶解スルヲ能ハザレバナリ或云。日一錢或ハ一
 錢半宛用テ瞑眩セザル者アリ或ハ日三錢宛一年
 半用或ハ日一弓宛數月用テ必モ害ナキ者アリ又
 一婦人病中此劑五十比許用テ必モ惡症ヲ發セザ
 ル者アリト。是漸此劑ニ慣テ瞑眩セズ又越幾斯劑

ハ煎熬ノ製スル故ニ苛烈ノ藥氣蒸散スレバナリ
 ○服量度ニ過ギ或ハ患者ノ資稟此毒ニ堪ヘズ或
 ハ病性ニ的當セザレバ是ヲ用テ惡症ヲ發ス○丸
 藥ヲ嫌フ者ハ此越幾斯劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ煉
 膏トシ用ベシ○或ハ花候前ニ生草ヲ取り火氣ニ
 テ速ニ乾シ太キ莖ヲ去リ末トシ硝子壘ニ内レ貯
 用フ。服量越幾斯劑ト同シ。但越幾斯劑ニ比スレバ
 藥力差峻ナリ或ハ乾葉一握ヲ取テ沸湯二十弓ニ
 投シ泡湯トシ朝夕小茶碗ニ二碗宛用フ生草ハ尤
 酷烈ナリ○或云。此草ノ花ヲ越幾斯劑トシ用テ利

水ノ峻効アリ。殊ニ肢節ノ水腫ニ良○或云。此越幾
 斯劑ノ性功大約。雙鸞菊越幾斯劑ノ如シト○外敷
 シ腫瘍。堅硬腫ヲ消散シ潰瘍ヲ淨刷シ治ス。此草ノ
 濃キ泡湯ヲ蒸溺劑トシ或ハ此草ヲ煮テ芭布トシ
 貼シ或ハ越幾斯劑ヲ膏藥ノ如ク貼シ或ハ是ヲ石
 灰水ニ溶シ布ニ濕メ貼シ或ハ生草ノ絞汁ヲ取テ
 硬膏。軟膏トシ貼シ或ハ生絞汁ニ蜜ヲ和シ煮テ稠
 膏トシ外敷シ。或ハ此草ト花ヲ採リ蒸餾ノ露水ヲ
 取り施ス等ナリ

度物淑依按
叔布伍福

荑若
ベルラドンナ又アトラバベルラドンナ羅ドル
 マーケンデナクトシカーデ蘭○和名ハシリトコロ

形状 此草。圓莖叢生シ高廿二三尺許。直立シ黯赤色
 粗糙。枝多シ。葉龍葵葉ニ似テ大ナルト三倍。柔ニ
 汁多シ粗糙ニノ毛茸アリ短梗著ク。葉間數梗ヲ抽
 テ花生ス筒様五出。黯紫或ハ黄白色。萼五出。花後圓
 子ヲ結ブ大サ葡萄ノ如シ熟スレバ黑色ニノ光澤
 アリ。裏ニ汁アリ味甘ヲ帶ブ。數核アリ。根太ク長ク
 塊節様ニノ極アリ淡白色或ハ黄色ヲ帶ブ。葉根子
 共ニ較著ノ氣味ナシ或云。葉根共ニ臭氣是龍葵ノ
 一種ナリ山林原野及ビ垣籬ノ陰地ニ生ス

性 葉根子共ニ大毒アリ少許服スレバ咽喉乾燥。舌

拘強煩悶シ。次テ眼昏眩運。睡眠ノ後大ニ蒸氣ヲ發
 泄ス。多ク服スレバ精神錯亂發瘧。咽喉胃腸劇痛シ
 次テ皮膚及ビ肺肝腸間膜等焮衝ノ内外壯熱耐忍
 ビ難ク。大渴ノ嚙下ス。能ハズ。食ヲ惡ミ。肢體頑麻
 不遂昏睡搐搦ヲ發メ死ス。其屍速ニ腐壞シ肢體各
 部紫黑色。肌皮坼裂シ諸竅ヨリ敗血汚液漏泄ノ臭
 氣甚シ。或云此草四錢ヲ服スレバ死ス。此草ハ酷烈
 ナル麻痺毒ヲ含メリ根殊ニ甚シ。或云此子五六個
 ヲ服スレバ發狂シ口眼掣引ノ大ニ笑ヒ。總身漸ク
 搐搦シ。發熱燠クカ如シ速ニ治療セザレバ十二時

中ニ死ス。○此毒ヲ解スルニハ酸味ノ液。醋。橙汁等
 ヲ多ク飲シムベシ。失鳩答解毒法ト同シ。

主治 葉ヲ藥用トス。或ハ根ヲ用フ。揮發鹽及油アリ
 葉ノ内服ノ解疑緩和ノ藥トス。或ハ生葉ノ絞汁一
 沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ用テ鎮痛催睡ノ効ヲ稱シ
 外敷メ焮腫ヲ消散ス。生葉ヲ貼メ止痛消散ノ効アリ
 ○癌様ノ硬腫ニ内服外敷メ焮痛等ノ惡症ヲ緩
 解ス。然レ眞ノ癌腫ハ効ナキ。失鳩答ノ如シ。○腺
 ノ硬腫。瘰癧様腫ニ試用ルニ少シモ害ナク。毎ニ良驗
 ヲ奏ス。其腫。癌瘡トナラズ。ノ惡性ノ潰瘍トナル症

モ此根ヲ用レバ腐蝕セズ增長スルヲナシ總テ腺ノ腫瘍瘰癧様ノ壅塞ヨリ發スル諸症ハ皆峻効アリ是ヲ用テ驗ナキハ此草ノ陳久脫性ノ者若ハ園生及ビ肥土ニ培養セル者ヲ用レバナリ然レ患者甚ダ薄弱ニノ病毒極テ惡厲ナル者ハ此藥モ効ナク漸ク惡症ヲ發スベシ故ニ仔細ニ診察ノ是ヲ施スヲ肝要ナリ○子宮口ノ硬腫ノ初發ニ用テヨク其腫ヲ消散ス此症增長スレバ瘡瘡様ノ白帶下トナリテ治シ難シ子宮ヨリ惡性ノ汚液漏泄ノ頑固ノ白帶下トナル者ハ此葉ノ末一味用ヒ或ハ水銀

劑ヲ加用テ治驗多シ一婦人子宮口ニ惡性ノ硬腫ヲ生シ交媾ヲ妨ルヲ數年此葉ノ末ヲ用テ全治セリ○葉ヲ水煎メ内服外敷シ或ハ乾葉ヲ末トシ少許ヲ取テ水ニ和シ服シ或ハ葉ヲ搗貼ス腺ノ硬腫ヲ溶解シ惡性ノ潰瘍ヲ治ス○發狂及ビ神思鬱憂病ハ腹部諸藏ノ壅塞若ハ痔血月經產後惡露等ノ閉滯及ビ瘡瘍ノ内攻ヨリ發スル者甚ダ多シ皆此藥ヲ用テ間大効アリ○鬱憂悲悶シ人ヲ避テ沈黙獨處ヲ好ム狂症ハ此藥多ク良効アリ然レ狂躁暴亂大甚キ症ニ用レバ搗掣ヲ發スルヲアリ或云此

本草綱目

卷二十六

風雲堂藏

子ノ絞汁ニ沙糖ヲ加ヘ舍利列トシ發狂ニ用テ奇効ヲ得ルコトアリト○癩ヨリ發スル狂ハ此藥ヲ用テ治スル者多シ癩モ亦良驗アリ但此藥ニ慣ル片ハ再發スルコトアリ○瘧攣搐掣ノ諸症及ビ痲不遂モ亦治驗必カラズ或ハ疫效ニ間奇効ヲ得ルコトアリ○子宮水腫ヨリ發スル小便閉ニ甚ダ驗アリ○微毒頑固ノ諸症ニ効多シ或ハ甘汞ヲ加用フ殊ニ其侵蝕スル潰瘍ヲ治ス○乾癬ニ尤効アリ大黃ヲ加用テ殊ニ良又總テ頑固惡厲ノ皮病ヲ治ス○黑障眼ニ効アルコト失鳩答ノ如シ

服量多ク越幾斯劑トシ用フ葉ノ末ニ比スレバ効差緩ナリ日一匁ヨリ四匁マデ用フ或ハ初ハ日半匁若ハ一匁ヲ用ヒ漸加テ瞑眩スルニ至ル○或ハ葉半月ヨリ一月マデ沸湯十考ニ浸スコト八分時瀝テ其液ヲ取り毎朝二匙宛服ス○服量少許與ルニハ根末良トス葉ニ比スレバ其効差峻ナリ○漸ク服量ヲ加テ患者咽喉乾燥頭眩暈眼花閃發スルヲ覺ルハ藥力充足ノ良効アル徵トス是ヨリ服量ヲ増ス勿レ但其症甚キ者ハ服量ヲ減シ或ハ暫休テ温乳汁ヲ與ベシ若シ服量ヲ加用レ右ノ諸症

ヲ發セザルハ此藥ノ性力脱セル者ヲ用ルカ或ハ
 服量仍足ザル候トス。故ニ其新鮮ノ草ヲ採用ヒ或
 ハ其三分一ノ量ヲ増與ベシ。○或ハ生草ノ絞汁ヲ
 煎熬ノ蜜ノ稠ト爲シ或ハ此草ヲ蒸餾ノ露水ヲ取
 一匙宛用フ或云根二錢マデ用テ瞑眩セザル者ア
 リ此葉ノ末ヲ醋ニ加ヘ服スレバ吐劑トナル。○近
 來。犬咬傷。其他諸獸咬傷ニ此根ヲ經驗ノ奇効ヲ奏
 ス。是ヲ用レバ其症增長セズ狂躁等ノ惡症ヲ發セ
 ズノ治ス。又宜ク的當ノ外治法ヲ兼施スベシ。是ヲ
 用テ瞑眩甚キ者ハ三四日モ此藥ヲ休テ復用ヒ斯

ノ如クノ數週用ベシ。此病既ニ發狂シ飲液ヲ服シ
 難キ等ノ症ヲ發スル者ハ差其服量ヲ増シ數日服
 セシムベシ。發汗利尿吐涎等ニ因テ速ニ其毒ヲ排
 泄シ治ス。此根ヲ細末トシ野生者ノ宿根ヲ採リ陰乾ス四歳以下
 ノ兒ハ二晝夜ニ一匁ヨリ三匁マデ用フ。四歳ヨリ
 六歳マデノ兒ハ五匁マデ用フ。大人ハ五匁ヨリ十
 五匁マデ大黃ヲ加用ヒ或ハ阿芙蓉麝香ヲ加テ良
 効アリ。或ハ初半匁ヨリ一匁マデ用ヒ漸加テ患者
 咽喉乾燥。眼花閃發スルヲ度トシ其量ヲ増ス勿レ
 或云大人ハ五匁ヨリ十六匁マデ一服トシ二晝夜

過テ復^ス其量ヲ用^フベシ。其後咽喉大ニ乾燥スルハ服量過度ノ候トス。動^カモスレバ是ニ次テ精神錯亂眼昏等ヲ發スル^{コト}アリ。若^シ此症ヲ發セバ吐劑ヲ用^フヒ。吐^キヲ發セバ水若^クハ乳汁ヲ多ク冷飲セシムレバ速ニ治ス。○荏苒タル間歇熱ハ左ノ方偉効アリ

荏苒散

荏苒葉 末 八匁

沙糖 二匁

右調和シ分テ四服トシ間^日ニ朝夕一服宛飲液ニテ送下ス。○左ノ方亦良

龍麝荏苒散

荏苒葉 末 十六匁

麝香

龍腦 各四十匁

沙糖 四匁

右調和シ分テ八服トシ一服宛用^フ日ニ三次。○總テ荏苒ヲ用^フ片ハ大便ヨク通スルヲ肝要トス故ニ右ノ散劑ヲ用^フ間ハ時々大黃或ハ梅那等ノ末ヲ用^フベシ。荏苒越^ス幾斯劑製法失^シ鳩^タ答^タ越^ス幾斯劑ト同^シ。

福 布

叔 叔 湯 伍 按 依

蒸餾醋

アセラム、ディスティルラテム、アセニ、
フシタル又、オフルゲハイルデ、アセイン、蘭

○按ニ西洋ニ於テハ通例葡萄酒ヲ以テ醋ヲ造
ル但、葡萄ヲ産セザル國ニテハ穀類ヲ以テ造釀
シ日用飲膳及ビ藥劑ニ供スト云然ハ米醋亦藥
用ニ供スベシ

製法

醋 適宜

木炭 極細末 醋ノ十六分一

右攪和シ硝子若ハ磁製列篤兒多ニ内レ兜及ビ承
餾壘ヲ接合シ沙火ニテ慢緩ニ蒸餾シ或云、重湯ニ
セ焦著初ニ出ル淡薄ノ液ヲ除キ亞云、醋四十比ヲ
蒸餾ノ初ニ出ル

淡薄ノ液ハ此ヲ除クト、但、醋ニ強弱アレバ承餾壘
其氣味ヲ試テ是ヲ除クニ多少アルベシ
ヲ換ヘ火ヲ増シ蒸餾ノ焦臭生スレバ速ニ火ヲ下
シ蒸餾醋ヲ取り硝子壘ニ收メ固封シ貯フ此醋ヲ
餾スレバ氣味淡薄トナリ格兒弗ニ殘ル醋ハ醇厚ナリ

試法

蒸餾醋ニ鹹蓬鹽晶ノ末八分一ノ量ヲ加テ其
沸騰止ニ少シモ滾動セザルハ上好適宜ノ醋トス亞
右ノ如ク鹹蓬鹽晶ヲ加ヘ少シモ滾動セザルニ至テ
放冷シ透明ノ芒ヲ結ブハ其醋上好適宜ノ候ナリ
ト依云、蒸餾醋ニ多ニ剥篤亞斯一錢ヲ加ヘテ沸騰
止ニ少シモ滾動セザルハ其醋尤悍烈ノ候ナリト
鹹蓬鹽晶ヲ加ル一錢ニ至ラズノ沸騰止ム者ハ
其醋薄弱ノ候トス是ヲ加ル一錢ニ至レテ沸騰

仍止ザルハ其醋過大ダ悍烈ナル候トス。故ニ其薄弱ナル者ハ醇精醋出次ニヲ加テ悍弱クシ。悍烈ニ過ル者ハ初餾ノ淡薄ナル液ヲ加ヘ若モハ水ヲ加ヘ復メ前法ノ如ク鹽晶ヲ加ヘ試テ適宜ノ度トナルニ至リ硝子壘ノ口マデ滿シメ固封シ貯フ按

醇精醋

「アゼラム・ラデカール・アゼイン・シウル」又「ボグストフルステルケンデアセイニ蘭是醋ノ極テ悍烈ナル者ノ義

製法

鹽蓬鹽晶亞精製剝篤 蒸餾醋亞斯ニ作ル 各適宜

右鹽晶ヲ取リ少許宛醋ニ加テ少シモ滾動セザルニ

至リ磁壺ニ入レ文火ニ上セ煎熬ノ乾固ノ鹽ト爲シ是ヲ列篤兒多ニ内テ半ニ充シメ。再餾綠蓉油石膽ノ條ヲ取テ徐々ニ是ニ滴シテ右ノ鹽蓬鹽量ノ半ヲ加ルニ至リ。潤大ナル硝子ノ承餾壘ヲ其列篤兒多ニ接合シ。其合際ヲ塗封ノ沙火ニ内レ。初メ文火トシ漸ク火ヲ加テ武火ト爲シ蒸餾ノ終ニ霧ノ如キ蒸氣承餾壘ニ透見セズ且列篤兒多ノ頸ニ少シモ蒸露ヲ見ハスヲナキニ至テ火ヲ下シ承餾壘ヲ放テ其醋ヲ取リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ是醋ノ極テ悍烈ナル者ナリ○其列篤兒多ニ殘リタル渣塊ヲ取

水ニ溶シ是ニ剥ボツ篤ト亞斯ノ末ヲ加テ火モ沸騰セザルニ至リ紙ニテ漚コシテ其液ヲ取り文火ニ上セ煮テ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷ノ芒ヲ結バシム。是即孕礬酒石ナリ。因是酒石ノ條ニ舉ル孕礬酒石ト同シ依云醋ハ酒石酸性鹽燒酒水ヲ合和ノ成ル即チ酒石一北燒酒再餾者一北半沸湯十六北右酒石ヲ湯ニ溶化シ放冷ノ燒酒ヲ和シ硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ蓋ヒ上ニ小孔ヲ穿テ處ニ置テ化釀セシムレバ醋トナルヲ以テ知レベシ

性醋ノ性ハ酒ト相反ス酒ヲ蒸餾スレバ初ニ銳烈ノ精液燒酒出テ後ニ淡水出ツ。醋ヲ蒸餾スレバ初ニ淡水出テ後ニ銳烈ノ醋出ツ。燒酒ニ火ヲ點スレバ燄ヲ發ス。醋ニ火ヲ點スレバ撲滅ス。酒ハ血ノ運行

ヲ増盛シ熱ヲ生シ人ヲノ醉眠セシム。醋ハ血ノ強盛ナル運行ヲ靜止シ清涼ニシ酩酊ヲ解ス。燒酒ヲ血中ノ汚イ乙刺絡ノ出ルニ加レバ忽チ凝固ス。是ニ蒸餾醋ヲ加レハ速ニ溶解スル等ヲ以テ知ルベシ

主治 清涼滋潤シ津ヲ生シ渴ヲ止メ汗ヲ發シ凝血ヲ稀釋シ腐敗ヲ遏メ精神ヲ爽快ニシ燥熱ヲ解スル良藥トス。○蒸餾醋ハ尋常ノ醋ニ比スレバ氣味緩和ナレ其質精微ニノヨク竄透シ味好クノ服シ易ク諸飲劑ニ加ヘ用ルニ宜シ。○醋ニ水ヲ加テ稀クシ或ハ砂糖ヲ加ヘ甘美トシ諸熱病ノ飲料トシ

渴ヲ止メ燥ヲ潤シ熱ヲ解ス○虛憊ニ屬スル諸疫
 熱腐敗熱惡性熱ヲ治ス○焮衝病ノ膽液過多及腐
 敗ヲ帶ル症ニ尤良但尋常壯實多血ノ焮衝病ハ初
 發ニ發汗ノ害アリ故ニ初發ハ是ヲ斟酌スベシ○
 清涼ノ血液腐敗ヲ遏ルニ峻効アリ故ニ膽液熱膽液
 腐敗ノ發血液膽液腐敗ヨリ發スル諸症及腐敗熱血液
 スル熱病病ニ尤驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施ハシ兒ル前ニト
 爲シ膽液熱ニ多ク用フ○膽液熱及膽液腐敗ノ酷
 厲ナルヨリ發スル腹痛下利ニ左ノ方尤驗アリ

雙酸清涼飲

蒸餾醋

二勺

密涅刺爾鎮痛液

二勺
綠礬ノ條

酒石鹽

一錢

舍利別

四錢

沸湯

四勺

右調和シ半時ニ一匙宛用フ○發斑熱及ヒ冒寒傷
 冷毒ノ諸症ニ醋ヲ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解シ腐敗ヲ
 防テ良効アリ。殊ニ龍腦ヲ加テ發汗防腐ノ功尤峻
 ナリ。腐敗熱ニハ胃腸ヲ淨刷ノ後是ヲ用ベシ。又右
 ノ諸病ニ於テ專ラ蒸氣及ヒ汗ヲ發スベキ症ハ左

ノ方良効アリ

香竄醋

アゼナムアンチセペチモム
スペセレイアゼイン蘭

菖蒲根

白芷

各六錢

亞爾鮮

二弓半

撒爾非亞

三弓半

芸香葉

二弓

府利

二錢

蒸餾醋

八北

右硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ固封シ慢火上ニ置テ

浸ス一ニ日。絞テ其液ヲ取り紙ニテ漚シ左ノ藥液

ヲ加フ

羯布羅丁幾去爾

四錢

右合和シ固封シ貯フ。又此劑傳染疫毒ヲ驅散シ

腐敗ヲ防ク効アル故ニ傳染病流行ノ時。毎日數一

匙宛内服シ或ハ鼻孔ニ塗り或ハ是ヲ温メ蒸氣ヲ

居室ニ薰スレバ其病ニ傳染スルヲ無シ。○發斑熱。

惡性熱。冒寒傷冷毒等ノ蒸氣及ビ汗ヲ發スベキ症

ハ左ノ方亦良効アリ

香醋飲

香竄醋

二勺半
前二出

接骨木花傑列乙

二勺

密涅刺爾鎮痛飲

一錢半

沸湯 一坵

右調勻シ半時ニ二匙若ハ三匙宛服ス^依○傳深腐敗熱惡性熱ハ醋ヲ一匙宛飲液ニ加用テ精神ヲ清爽シ汗ヲ發メ病毒ヲ排泄シ血液ノ腐敗ヲ防護ス凡熱病ノ患者虛罷ノ煩渴シ津液燥涸スル症ハ醋一匙ヨリ二勺マデ一服トシ用テ良○痘瘡麻疹ノ腐敗ヲ帶ル症及狂犬蝮蛇等ノ咬傷ニ醋ヲ用テ峻

効アリ或ハ的里亞加ニ加ヘ内服ノ解毒ノ効ヲ稱ス○腐敗熱痘瘡等ノ血液腐壞焯崩ノ酷厲トナリ血脉ヲ穿蝕メ下血吐血衄血尿血ヲ發スルニ用テ腐敗ヲ遏メ血液ヲ收斂メ其症ヲ治ス○血液運行怠慢ニ腐敗セルヨリ發スル失苟兒陪苦ヲ治ス航海ノ徒ノ如キ身體ヲ運動セズメ此症ヲ發スル者多シ○醋ハ氣味竄透シ清涼收斂スルヲ以テ鎮痙ノ良効アリ蒸餾醋ニ舍利別ト密涅刺爾鎮痛液少許ヲ攪和シ用テ諸痙攣ノ症及上衝頭痛不寐或ハ神思鬱憂病狂癩ニ良驗ヲ奏シ又爽涼降鎮ノ効アルヲ以テ阿芙蓉劑ノ用ヒ

難キ諸症ニ尤^モ効アリ○醋橙汁及醋ノ製劑ハ皆過酒ノ沈醉スルヲ解ス。醋ニ水ヲ加テ服シ或ハ鼻孔ニ塗テ良^レ又阿芙蓉毒ノ瞑眩ニ内服メ速効アリ其他亞兒加利性ノ辛熱酷厲ニメ麻痺昏睡發狂セシムル諸藥即チ雙鸞菊^{トリカブト}失鳩答^{シヤウマ}巔茄^{トリスチカネハシリ}菘蓂等及甲介類ノ毒ヲ解ス。但^レ中毒ノ甚キ者ハ初^メニ先ツ吐劑ヲ與ヘ快吐セシメテ後醋劑ヲ用ベシ。又烟氣ニ咽^ヒテ呼吸窒塞スルニ即効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解スト雖モ乳汁及ビ脂油質ノ液ニ加レバ忽チ凝固ス故ニ乳汁ヲ服スル人或ハ乳養ノ兒ニ是ヲ與フレバ乳

汁胃中ニ凝固メ消化セズ停滯ノ酸敗液トナリ病患ヲ發ス

外敷頭眩暈或ハ昏冒卒倒等ハ患者ニ醋ヲ嗅^カシメ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ面ニ噴^{ハキ}テ醒解ス。是ニ用ルニハ悍^{ソコ}キ醋ヲ良トス。ヨク竄透スレバナリ。醋ニ銅精ノ末少許宛加テ必^シモ沸騰セザルニ至リ磁製ノ格兒弗^{コル}ニテ蒸餾スレバ其醋甚ダ悍烈ナリ是ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯テ聽用スベシ。是諸金ヲ腐蝕スルニ用フ○劇^シキ頭痛ニハ醋ヲ温メテ嗅^カシメ或ハ醋ニ水ヲ加ヘ消石ト硃砂各少許ヲ研和シ布片

ニ蘸^{ヒキ}ノ貼シ或ハ頭ニ匝^{マキ}テ捷効アリ○醋ハ竄透刺戟ノ脉管ヲ收斂シ止血ノ効アリ。是ヲ緋^{ヒキ}ニ浸シ深ク鼻孔ニ挿^{サシ}テ衄血ヲ止ム。是ヲ布片ニ蘸^{ヒキ}シ頭ヲ縛スルモ良○醋ニ水ヲ加ヘ温メ含漱ノ斷頸等ノ出血ヲ止ム。外傷ノ輕キ出血モ是ヲ貼メ効アリ○婦人崩漏。孕婦及產後ノ崩血ハ醋ニ水ヲ加ヘ稀^{ウス}クシ温メ水銃ヲ以テ子宮ニ注輸メ治ス或ハ產後子宮收縮セズノ崩血止ザル症ハ冷醋ヲ布片ニ蘸^{ヒキ}シ腹部ニ貼メ効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解ス。故ニ打撲傷ニテ血絡破裂シ其血。皮中ニ泛濫メ青斑ヲ發スル

者。及ビ諸焮腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。醋ニ水ヲ加テ稀^{ウス}クシ温メテ布片ニ蘸^{ヒキ}メ數換貼ス或ハ燒酒或ハ消石硃砂各少許ヲ加テ研和シ施スモ良○金創ヲ洗フニハ醋ニ多ク温湯ヲ加フベシ否ラザレバ大ニ刺戟ノ焮熱ヲ發ス○醋ハ骨ヲ軟ニシ硬骨ヲノ軟骨ノ如クナラシム。故ニ骨傷ニ久ク是ヲ外敷スレバ骨ノ堅剛ノ質ヲ失ヒ回復セザラシム。又尙僂病アル小兒ニ酸味ノ飲食ヲ與フレバ諸骨逾軟弱ニメ其病增長ス但胼胝樣ノ硬腫ハ是ヲ外敷メヨク軟化シ消散ス骨ハ土質ヲ以テ成ル。酸物ハ土質ヲ溶化ス故ニヨク骨ヲ軟化ス。魚骨等

ヲ醃醋ニ淹セバ軟ナルヲ以テ知ルベシ。是ニ及メ焼
 酒ハ纖維ヲ硬固シ軟肉ヲノ脍肌様ノ硬肉トナラ
 ム。○醋ニ苦味收溜ノ藥品ヲ加テ外敷スレバ殊ニ
 ヨク腐敗ヲ遏ム。幾那ノ末ヲ加レバ其効尤峻ナリ。
 諸潰瘍ノ腐壞ヲ遏ルニ用フ。或云夏月肉類ヲ醋ニ
 アルヲ以テ防腐ノ効。○真珠。蜾蛄石。珊瑚。蠟殼。卵殼等
 ヲ醃醋ニ淹セバ軟化ス。○疫熱流行ノ時。石ヲ焼テ
 醋ヲ撒ケ其蒸氣ニテ居室ヲ薰シ傳染惡氣ヲ驅逐
 スルノ効ヲ稱ス。

叔 淑 布 揭
 依 福 伍 技

遠西醫方名物考卷二十六終

