

遠

醫方名物考補遺

卷

十武9特
857
45-37

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
冊 37 第



○引用書符號。名物考藥鏡ニ遺漏セル者ヲ左ニ舉ク

依依百乙舍密全書 篤篤隆母斯獨爾弗舍密局方

宓宓篤爾藥性主治書 涅涅埜爾獨乙都局方

泊泊爾拔烏兒藥性論 葛葛華戾私經驗書

蒲蒲爾母羅埜兒經驗書 昆昆斯蒲律倨內科書

別別爾林治療書 呂呂乙詞物產說

施施迄蒲斯治療經驗書

撰重訂內科撰要鏡和蘭名遠西醫方補同上

○客歲甲午仲冬 榛齋先生病篤シ 湯藥ニ左
右ニ侍ス病間 章ヲ召テ囑曰名物考凡例載ル所

藥品ノ分量ハ家藏亞謨斯的爾達謨ノ藥秤ニ據
テ考定スト雖モ其法馬各少差アリ意フニ其製
未夕精巧ヲ盡ス者ニアラズ加之彼邦近來ノ著
書往々新ニ度量ヲ革ルヲ載ス然ハ新舊差異
アルヲ知ベシ是ヲ以テ再ヒ其度量ヲ算ノ從前
ノ脫漏ヲ補フニ意アリ奈セン余算數ニ拙シ子素
リ數學ニ長ス願クハ諸書ヲ考証シ新舊ノ度量
ヲ算定シ余カ志ヲ繼ケト章唯々ス臘月上澣
先生溘焉トノ館舍ヲ捐ツ豈料ヤ先生ノ囑竟
ニ遺命トナラントハ章不才何ソ遺命ノ重ヲ奉

スルニ耐ヤ但薰蒿悽愴復夕辭スベキ所無シ乃
 ホルクスメイトキンデ子デルドイツセ・アポテーキ
 等ノ書ニ據テ度量ヲ算定シ更ニ其要領ヲ略載
 ス天保六年乙未孟春 備中緒方三平 章 謹識
 一千七百九十八年 寬政十年 佛蘭西 伊斯把尼亞 和蘭 意
 太里亞 弟那瑪爾加 雪微 設兒 トスカ 以上ノ學士
 輩大ニ集會ノ盡ク闔國度量ノ舊制ヲ改革シ新ニ
 歐邏巴諸國通用新制ノ度量ヲ建ント議リ一千七
 百九十九年 寬政十一年 竟ニ羣賢ノ衆議決著シ其制全
 成ルト云其法地周ノ四千萬分一ヲ會爾ト名ケ尺

度量衡皆此ヨリ算出ス

會爾

按ニ本邦天學家地ノ一度ヲ二千八百二
 分ト定ム然レバ地周ハ一萬三千一百五十
 六萬九千九百二十尺ニシテ其四千萬分ノ一ハ三尺
 二寸八分九釐ニ毛四弗八ナリ然レバ今船來ノ新
 制尺ト我京都ノ念佛尺ト比較スルニ我三尺二寸
 八分八釐八毛九弗弱ニ當ル念佛尺ハ精密ノ曲尺

耳埵

迷爾

把爾牟

兒母

秘多列比

○凡ソ容器ニ液料乾料ノ別アリ秤量ニ雜貨藥品

ノ別アリ液料ノ容器ハ

罕 把爾牟立方 我五合四勺九才弱

末苴 罕之十分一 我五勺五才弱

寶傑爾弗度 末苴之十分一 我五勺五才弱

發篤 罕之十倍 我五升四合八勺八才弱

○乾料ノ容器ハ

骨弗 罕ト同シ

末苴 液料ノ末苴ト同シ

失結兒百爾 發篤ト同シ

冊屈又繆的 失結兒百爾之十倍 我五斗四升八合七勺九才弱

刺斯篤 三十冊屈 我十六石四斗六升三合六勺七才許

○雜貨ノ秤量ハ坊間商賈ノ通用スル處ナリ蒸餾水把爾牟立方ノ重ヲ封度トシ此ニ基テ其他定ム

封度 前日念佛尺ノ寸立方容器數様ヲ造テ蒸餾水ヲ盛リ自ラ精ク稱リ試ルニ其重ヲ我ヒ錢五分アリ今之ニ據テ算スルニ彼把爾牟立方ノ蒸餾水ハ我ニ百六十六錢八分一釐四毛四弗當

穩斯 封度之十分一 我二錢六分四釐

羅獨 穩斯之十分一 我二錢六分四釐

瓦蘭馬又微苦苴 羅獨之十分一 我二錢六分四釐

古爾列兒 瓦蘭馬之十分一 我二錢六分四釐

○藥品秤量

一千八百十七年文化十四年和蘭王國中ニ令ノ舊制ノ藥秤ヲ改革ス其制商賈通用封度ノ八分三即三百七十五瓦蘭ヲ以テ新制藥秤ノ封度トスト云今左ニ新舊藥秤比較ノ表ヲ載ス

新封度

三百七十五瓦蘭馬

我百錢零零零五釐五毛強

舊封度

三百六十九瓦蘭馬

我九十八錢四分八釐八毛強

新穩斯

封度之十二分一。即三十一瓦蘭馬二五

我八

錢三分三釐八毛許

舊穩斯

三十瓦蘭馬七六

我八錢二分零七毛強

新達刺屈末

穩斯之八分一。即三瓦蘭馬九零六

我一

錢零四釐二毛強

舊達刺屈末

三瓦蘭馬八四五

我一錢零二釐六毛許

新須屈爾百兒

達刺屈末之三分一。即一瓦蘭馬三

零二

我三分四釐七毛強

舊須屈爾百兒

一瓦蘭馬二八二

我三分四釐二毛許

新傑列尹

須屈爾百兒之二十分一。即瓦蘭馬ノ千

分之六十五

我一釐七毛三弗強

舊傑列尹

瓦蘭馬ノ千分之六十四

我一釐七毛一弗弱

右ハ尺度ニ原テ算定スル所ナリ尺度ニ毛弗ノ差無キ丁能ハズ是人目ノ得テ視ベカラザル所ナリ

尺度ニ毛弗ノ差アレハ重量亦必ス差無_ヤ能ハズ
故ニ和蘭新制藥秤ノ如キモ他日精巧ノ器ヲ得テ
始テ其密合ヲ言_{ベシ}尚別ニ證說アリ

○按ニ本編採用スル所篤宓涅泊昆福等ノ如キ一
千八百十七年藥秤改革以後ノ鏤板ニ係ル書ハ其
方法ノ分量新制藥秤ニ憑ルベク其余ハ皆舊制ノ
藥秤ナリト知_{ベシ}

遠西醫方名物考補遺卷一

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

牛膽

ヘルタウリインスピサ
左ム羅オセガル蘭

牛膽ノ性甚人膽ニ近シ。綠色膠粘ニシテ臭氣アリ味
甚苦シ。生鮮ノ者ハ腐敗シ易キ故ニ磁鍋ニ入火ニ
上セ水氣ヲ蒸散メ越_エ幾_ク斯_ク劑ノ稠トシ貯フ。然_レ大
氣ニ觸_レハ濕氣ヲ引テ麝臭ヲ生シ腐敗スル故ニ
固封シ貯ヘシ。○病牛ノ膽ハ臭味不佳ニシテ毒アリ
内服スレハ毒氣侵襲スル_ト宛モ傳_テ深毒ノ如_シ故

ニ無病ノ牛膽ヲ擇ミ用フヘシ

○按ニ藥舖清雅

大坂屋四郎兵衛

云真ノ牛膽ハ近江彦

根ヨリ出ツ。牛膽ヲ取り速ニ竿ニ掛テ日乾ス。四

季共ニ粘潤。甘味ヲ帶ヒ。藥舖ニ販ク。此品闕ニ遇

ハ藥舖ニ甘琥珀ト呼フ熊膽ヲ用ヘシ是牛膽ヲ

壓扁メ乾ス者ナリ

試効性石鹼様ニノ竄透刺戟衝動シ苦味強壯解凝

淨刷ノ効カアリテ鎮痙ノ一良藥トス○諸酸酸味諸物

酸性塩明礬酒石英類硫酸苦土凝水石等金屬塩綠礬皓礬升汞

塩酸加爾幾重土及單寧蘭名「ロイ」ストフ植物含

リヲ含メル液ヲ牛膽ニ加用レハ膽ノ稟性崩壞ノ

効力脱失ス○胃虚粘液過多。酸敗液。風氣痞脹大便

閉ヲ治ス○肝脾及門脉ノ壅塞。黃疸イボ依剝クン昆垚ル兒諸

蟲症。腸間膜腺閉塞。小兒腹脹四肢羸瘦等腹内諸器

ノ病ヲ治ス○諸藏壅塞中殊ニ肝ノ壅塞ヲ疏解シ

膽液ノ虚乏ヲ資補ノ酸敗液ヲ消シ。飲食烹釀消化

ヲ扶ケ又殺蟲ノ効ヲ稱ス○腹内諸藏壅塞アリテ

大便閉ヲ兼ル症ハ牛膽ヲ解凝下劑ニ加用ヘシ。即

牛膽紫堇丸鏡卷十五條或牛膽鹼黃丸次出ノ如シ○肝

壅塞。黃疸。粘液留飲病ハ牛膽鹼黃丸ヲ朝夕半錢ヨ

リ二月マテ與ヘシ此劑殊ニ黃疸ニ峻効アリ

牛膽鹼黃丸

牛膽

石鹼

勿擲祭亞者
各四錢

大黃 一錢

右研末シ二氏ヲ一九トス

人身ノ膽液ハ常ニ腸中ニ通世ノ飲食ヲ溶解シ

粘稠ヲ稀釋シ其刺戟衝動ノ性ヲ以テ胃腸ノ蠕動機ヲ發シ飲食ヲ消化ス故ニ膽液虧損ニ或ハ其性力乏弱ナレハ飲食消化セズ酸敗液粘液風氣等鬱滯シ肝藏漸ク壅塞ノ遷延諸病ヲ生ズ然ハ飲食消劑ニ加用テ膽液ヲ資補シ治スヘシ

胃中酸敗

液刺戟ノ胃痙痛 腹ヲ發シ衆藥効ナク經年不治其

症發動スレハ心胸苦滿心下刺疼痞氣衝逆吞酸懊

悶惡心或酸汁ヲ吐シ大便秘閉スル症ハ牛膽ニ阿

魏大黃ヲ加用テ効多シ即其治驗ヲ左ニ舉ク○一

學士三十六歲諸症前說ノ如ク時ニ發動ノ酸汁ヲ

吐シ大便秘結シ酒ヲ飲ハ頻發シ百藥驗ナク數年

荏苒タリ先左ノ健胃解凝劑ヲ與フ

解凝健胃飲

亞爾鮮越幾斯劑

酒石液

各三錢

薄荷水

四錢

甘消石精

一錢

右調和シ一匙宛服スル一日三次又毎夜麻屈涅失

亞名ヲ一匙宛用ヒ蔬菜類ヲ減シ肉類ヲ許與ハ數

日ヲ經テ諸症漸ク寛解ス因テ後方ヲ與フ

解凝魏膽丸

牛膽

阿魏

上好者
細末

大黃

細末
各四錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ朝夕十九宛用_ル一數週ニ
 ノ心下苦悶刺痛吞酸盡ク治シ大便順利ス。因テ漸
 蔬菜類ヲ許シ酒少計宛與テ病發動セス。然_レ仍_レ此
 丸劑ヲ長服セシメテ全治シ患者精神輕爽面色健
 旺ス。或酸物ヲ食メ稀ニ其症發動スル_レアレ_レ此
 丸劑ヲ用テ即_チ治ス其病原ヲ推究スルニ膽液ノ分
 利匱乏ノ胃ノ消化力ヲ失ヒ酸敗液ヲ釀生ノ便秘
 スルナリ○一婦人三十餘歳胃瘕ヲ患_リ一三年時々

胃痛ヲ發シ飲食消化シ難ク萎黃病胃虚ノ諸症ヲ
 發シ大便每常三四日通セス鎮瘕止痛ノ諸藥阿芙蓉
 液_固等ヲ與_レハ劇痛休_ト雖_モ復發動シ制酸解
 凝ノ諸藥亦驗ナシ。因テ前說ノ魏膽丸朝夕十九宛
 與ヘ連服十四日ニノ胃痛盡ク休_ミ大便日順利シ
 今既ニ半歳ヲ經テ再發セス萎黃病ノ諸症及_レ色澤
 回復ノ精神健旺セリ○一男子五十歳居常大便閉
 ヲ患ヒ其屎灰白色ナリ此症亦膽液ノ分利匱乏シ
 諸管壅急ノ發_ルヲ察シ前方丸劑ヲ用_ル一三週ニ
 ノ全愈ス○牛膽ハ殺蟲ノ殊効アリ峻下ノ藥ヲ加

テ能蟲ヲ驅泄シ且其萌生ヲ制止ス。即藥刺巴名ヲ
等分ニ加ヘ小兒ハ二匁ヨリ四匁ニテ用ヒ大人ハ
量ヲ増ス。或丸藥トシ與フ。後方ノ如シ

牛膽驅蟲丸

牛膽 二錢

藥刺巴名細末 一錢

右研和ノ三匁ヲ一丸トシ五丸宛用テ一日三次或朝
夕十九宛與フ。但諸症ノ輕重ニ隨ヒ増減ス小兒ハ
二味等分一匁ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ四丸ヨリ
八丸ニテ舍利別等ニテ送下ス。右ノ丸劑ニ苦味
健胃ノ藥ヲ加テ尤良。否サレハ瀉下已甚ク。且蟲症

ハ胃腸ノ運營罷弱ノ元力健運充張セリルヨリ生
スル故ニ特ニ胃腸ヲ健運シ一ハ丹藏ノ壅塞ヲ疏
通シ酸敗液ヲ驅除スヘシ喻ハ後方ノ如シ

健胃殺蟲丸

健質亞那名

乾白撒兒末爾扶斯名

括失亞越幾斯劑補

藥刺巴 各細末 各一錢

牛膽 一錢半

薄荷油 十二滴

右研和ノ三匁ヲ一丸トシ喇帖石末ヲ衣トシ四丸
若ハ其餘用ルテ一日四次。或經久遷延ノ神經病。癩
症等ニ牛膽ヲ用テ良効ヲ稱ス然レ蛇蟲若ハ丹藏

壅塞ヨリ發スル症ニ非レハ効ナシ

服量 生牛膽ハ日一錢ヨリ四錢マテ香竄ノ露水或葡萄酒ニ加ヘ服ス乾牛膽ハ丸藥トシ或他藥ニ加日一二錢用フ吉利詞參兒ハ半錢許ヲ藥液一弓ニ溶シ施ス軟膏擦藥ハ二錢ヨリ四錢マテ家猪脂四弓若ハ六弓ニ和シ擦ス○苦味竄透ノ藥ヲ腹部ニ擦ハ殺蟲ノ効アルヲ猶峻下ノ藥ヲ腹ニ擦レハ直ニ腠理ノ喻收管ヨリ腸中ニ吸入ノ劇ク瀉下スル力如シ故ニ左ノ劑ヲ腹部ニ擦テ驅蟲ノ殊効アリ

格磔驅蟲膏

牛膽 二弓

格磔堇篤 細末

盧會 細末

家猪脂 一比

亞爾鮮油 製法

煎油ト同シ列ニ錢

右研合ノ軟膏トス是ヲ腹部ニ擦レハ瀉下スル故ニ大人大便閉ノ症ニ適應ス但小兒感動シ易ク瀉下ノ害アル者ハ左ノ膏ヲ擦スヘシ

盧膽驅蟲膏

盧會 上好者極細末

牛膽

石腦油 各三弓

家猪脂 精製者

右先文火ヲ以テ家猪脂ヲ烱シ盧會牛膽ヲ加手ヲ

休メス攪和シ火ヲ下シ放冷ノ石腦油ヲ和ス○或
 牛膽ヲ水ニ溶シ臍部ニ塗モ亦大便ヲ通シ小兒蛇
 蟲ヲ殺シ下ス或此液ニ多許ヲ吉利詞爹兒トシ施
 スモ良○牛膽ヲ外敷ノ腺ノ硬腫ヲ疏散ス○牛膽
 ニ蜜ヲ和シ角膜斑點ニ擦ノ消散ス○牛膽ニ乳汁
 ヲ研和シ綿絮ニ蘸シ耳孔ニ挿テ耳鳴ヲ治ス○鰻
 鱺膽性効牛膽ノ如シ亦按ニ鰻及鯉ノ膽効アリ
膽液稟性試說分析術ニテ牛膽ヲ剖解スレハ水液
 苦蜜味甘苦是ヲ以テ黃色ノ華爾斯ノ是ヲ以テ膽液
 塩酸燐酸硫酸炭酸ヲ含ル曹達炭塩酸ハ後ニ出テ
 尿酸ハ後ニ出テ硫酸炭酸ヲ含ル曹達尿酸ハ後ニ出テ

ハ綠礬油曹達ハ礬蓬塩燐酸加爾幾少許酸化銕後ニ出テアリ此諸
 物混和抱合ノ膽液ノ石鹼質ヲ結成ス殊ニ曹達ハ
 華爾斯ト水ヲ合和セシメテ石鹼質ヲ成ス故ニ能
 水ニ溶化ス膽液ヲ諸酸酸性ニ加レハ稍滾動ス是
 膽液ニ炭酸曹達ヲ含ムニ因ル依○或云人類獸類
 ノ膽液ヲ試ニ全ク石鹼ト同様ニメ亞兒加利性ノ
 一液ナリ即動物ノ油ト山物亞兒加利塩鹼蓬ヲ基
 資トシ海塩乳糖性塩及少許ノ銕ヲ含ル加爾幾石
 動物ノ傑列乙膠液ナリ○膽液六比少許ヲ混和
 ノ成ル○膽液ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ

煮テ放冷スレハ亞兒加利塩ヲ結フ。其性尋常石鹼
 ニ含ル鹼蓬塩晶名ト同シ。○石鹼ハ鹼蓬塩晶ト生
 石灰ト油ヲ以テ製ス製法。白石鹼ハ初メ水ヲ以テ
 鹼蓬塩晶ト生石灰ヲ合メ煎スル故ニ石灰ヲ以テ
 鹼蓬塩ニ含ル炭酸後ヲ吸收シ去リ鹼蓬塩ノ亞兒
 加利性極テ悍烈トナル。是ヲ濾メ渣石ヲ去リ更ニ
 火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ油ヲ加レハ速ニ亞兒加利
 塩ト抱合メ凝結シ石鹼トナル。故ニ亞兒加利性タ
 ルヲ知ヘシ。○綿布ニ染汚セル油膩脂膏類ヲ膽液
 ニテ洗ハ速ニ淨潔トナリ尋常石鹼一雖モ澡雪シ

難キ污垢モ能除ク。是石鹼質ノ明證ナリ。○凡酸物
 ハ膽液ノ亞兒加利塩性ヲ尅制ス。體中酸敗液アレ
 ハ是ヲ以テ膽液ノ油質ヲ分離シ亞兒加利性虧損
 ノ凝固スルヲ宛モ石鹼ニ酸味ノ液ヲ加レハ其油
 質分離メ凝固スルカ如シ。故ニ胃腸ニ酸敗液アリ
 テ膽液ノ性力虧乏シ發スル諸症ハ牛膽ヲ用テ其
 膽液ヲ資補スレハ酸敗液自ラ消化メ治ス。○或云
 膽液ハ酸性多キ故ニ尋常石鹼性ト異ナリト。然レ
 數膽液ヲ試ルニ曾テ酸性ノ徵ナシ。即左ノ試說ノ
 如シ。○牛ヲ屠テ尚温ナル膽液ニ弓ヲ取テ牛乳十

弓ニ加ヘ能振蕩ノ良久ク靜定スレハ乳汁微ミモ粒塊ヲ生セスラ分泌ノ粒々凝塊ヲ爲スハ稀稠自尚是ヲ火ニ上セ煮沸一時半許ニシテ放冷スレハ凝塊ナシ唯膽液ノ脂油斯爾ニテ酥ノ如キ者ヲ生スルノミ○牛乳ニ蒸餾醋一二滴加レハ忽チ凝聚ノ粒塊ヲ生ス。是ニ牛膽液ヲ加火ニ上セ煮沸スレハ粒塊忽チ消散ス。是膽液ノ亞兒加利性ニテ酸性ヲ制服スル顯徵ナリ或右ノ醋ヲ加タル牛乳ヲ火ニ上セ前說ノ膽液燒灰汁ヲ加レハ其粒塊消散ス。是尋常鹹蓬塩汁酒石塩汁名酒等ヲ加ト同シ或新ニ取タル牛膽液

ニ三四倍ノ水ヲ和シ是ニ青紙藥舖「ア」紙一。名「ハ」縮水ニ浸シ稀キ青汁ト爲シ白ヲ浸セハ綠色トナ紙ヲ深メ用フ是ヲ青紙ト云ル是膽液酸性ナキ徵ナリ。若微モ酸性アレハ青紙必ス赤色トナル即右ノ膽液ハ弓中僅ニ綠礬油一滴ヲ加是ニ青紙ヲ浸セハ忽チ赤色トナルヲ以テ知ヘシ然ハ膽液ハ毫モ酸性ナク亞兒加利性タル明白ナリ然右ノ乳汁酸敗スルカ若ハ膽液腐敗セル者ヲ合スレハ粒塊ヲ生シ酸性ノ徵ヲ見スナリ即陳久變敗ノ石鹼ハ油質酸敗セル故ニ是ヲ乳汁ニ加レハ凝塊ニ新製ノ石鹼ヲ加レハ些モ凝

塊セサルカ如シ○膽液ハ腐敗シ易シ夏月秋初ハ
殊ニ泡釀變敗ノ酷厲トナルヲ猶陳腐ノ石鹼ノ如
シ○無病健康ノ人ハ膽液黃色亞兒加利性ニ石
鹼様苦味甚ク膠粘ニ水ニ溶化シ易ク牛乳ニ加
テ酸性ノ徵ナシ膽液綠色ナルハ膽液變敗ノ酷厲
トナリ且酸敗液アル候トス

實^チ艾答利^{リス}ス ^ロド^ギタ^{リス}ス ^ロド^コロ^イ下^蘭

〔形狀〕此草高二三尺莖太拇指ノ如ク稜様中虛數枝
ヲ分チ微赤色粗糙毛茸アリ葉潤大橢圓黯綠柔ニ

ノ皺糙毛茸及刻缺アリ香臭ナシ或云氣味不佳味辛微苦

葉ノ絞汁ヲ服スレハ口舌咽喉胃焮腫ス夏月鐘様

五出ノ唇花ヲ開キ或云花筒様辨端缺又アリテ圓

如四雄蕊短シハ一雌蕊アリ第十四綱第二目○榕按

ハ心蕊ナリ鬚頭ヲ絲頭ト曰フ絲頭ノ花粉ヲ心

蕊頭ニ受容ノ子實ヲ生ス故ニ雄雌ノ名アリ○西

洋ノ物産家林娜斯雄蕊ノ多少形狀等ヲ分テ十

四トス是ヲ二十四綱ト稱シ又雌蕊ノ有無多少種

子ノ形狀等ヲ分チ其綱ニ屬シテ百十餘目ヲ立ツ此

綱目ニ據テ一切草木ノ種類ヲ分ツ但單辨ノ花ヲ

採テ是ヲ徵ス單辨ノ花ハ重辨ヲ徵ス凡西洋ノ

草木ヲ以テ和産ノ花ハ重辨ヲ徵ス凡西洋ノ

種類ヲ分ツ非レハ確當ノ致證ヲ得ヘカラス故
ニ此編草木花形ノ說アル者ハ毎條其綱目ノ數ヲ
註ス花紫色裏面白點アリ莖梢ノ偏面ニ攢生ノ長穗

ヲ爲シ萼五瓣。萼葉及短梗アリ。花後被子ヲ結草木。
ノ子ニ被子裸子アリ被子ハ其子被室ニ在ルヲ云
喩ハハ胡麻牽牛等ノ子ノ如シ裸子ノ子室ナク直
ニ萼中ニアルヲ云喩ハ紫蘇荊芥等ノ子ノ如
シ第十四綱第二目ニ屬スル者皆被子ナリ 如卵圓
 ニノ細毛アリ熟スレハ破綻分裂ノ二室トナリ幾
 多ノ細子ヲ收ム根鬚多ク味苦シ二年ニノ枯ル。歐
 羅巴洲諸國ノ山地林中ニ生ス。

麻痺毒眼眩 此草酷厲ノ麻痺毒アリテ神經ヲ刺戟
 ス故ニ過服スレハ惡心嘔吐或劇ク吐下シ或口舌
 咽喉胃腸焮腫ノ涎沫ヲ吐キ頭痛眩暈眼昏瞳子散
 大眼花閃發視物綠色ヲ現シ小便過多粘冷汗漏泄。

呃逆肢體顫振厥冷搐搦ヲ發ス○麻痺毒ヲ以テ心
 藏動脈ノ運動ヲ弛弱シ。脈動遲緩滯滯ス故ニ服量
 適宜ニ與レ氏一日或兩三日ヲ經テ脈遲緩トナリ
 休藥後モ尚數日遲脈退カサル者アリ

試効 花前ニ葉ヲ採リ藥用トス 或花及莖 味辛苦侵
 蝕ス。此藥麻痺ト利尿ノ兩効ヲ兼又故ニ醫家はヲ
 麻藥ニ屬シ或利尿藥ニ屬ス○醫家多ク利尿ノ効
 ヲ稱シ水腫ニ用フ或云水腫ニ用テ每常驅水ノ峻
 効アリ或云利尿ノ効アレ氏害アルト少カラス故
 ニ他ノ通藥ニ優リテ殊効ヲ推稱シ難シト但是ヲ

幾多ノ水腫ニ質驗スルニ患者ノ體稟各異ナルニ
 隨ヒ當否功害一樣ナラス。大抵患者體質虛弱ニノ
 黤澹色。脉弱。或間歇之肌膚冷テ弛弱。瘧然トノ浮腫
 スル症ニ効アリ。○水腫ノ腹内諸藏壅塞ヲ兼ル症
 或衰弱ヨリ發スル遷延ノ水腫。經閉ヨリ發スル水
 腫殊ニ胸水ニ効アリ。是利尿ノ効ノミナラス多ク
 右ノ諸病ニ兼ル痙攣ノ運動ヲ降鎮スレハナリ。○
 此藥ノ酷厲毒ヲ以テ諸腺ノ壅塞ヲ疏通シ尿道ノ
 諸器ヲ開達シ又劇ク大便ヲ瀉下ス故ニ水腫ニ用
 テ利尿ノ一峻藥トス。但患者焮衝性ナラス脉亦強

實ナラサル水腫ニ効アリ多ク左ノ方ヲ用フ

實^{ナギ}艾^キ驅^キ水^{スイ}散^{サン}

實^{ナギ}艾^キ答^{タイ}利^{リス}斯^ス 細末 一月 沙糖 一弓半

右研和ノ散劑トシ分テ二十服トシ朝夕一服宛用
 患者資稟薄弱感動甚キ症ハ右服量ノ半ヲ用ヒ。壯
 實ニノ感觸鈍ナル者ハ漸ク服量ヲ増スヘシ。是ヲ
 服ノ嘔氣若ハ下利甚キ者ハ阿芙蓉少許ヲ加テ藥
 氣ヲ抑制スヘシ。○一少年。間歇熱ヲ患ヒ淹滯ノ終
 ニ腹水トナリ患者虛憊ノ瀉水術 腹部ニ針ノ水ヲ
 施ス一能ハス。因テ右ノ實^{ナギ}艾^キ驅^キ水^{スイ}散^{サン}ヲ與レハ小便

速ニ快利ノ治ス^レ或云此藥ヲ服ノ腫脹ノ部ニ規吉^キ
撒爾弗^サ爾弗^ル 圖ヲ擦^ヌレハ利水ノ効更ニ駛捷ナリ○小便
ヲ利シ水腫ヲ治スルニ左ノ數方皆捷効アリ

芟黃驅水散

實芟^チ答^ギ利^タ斯^リ 一^ク匁

金硫黃^圖

半匁

甘汞

四分匁

沙糖

一^ク匁

右研和ノ散劑一服トシ朝夕一服宛與^ルフ

芟姜驅水散

實芟^チ答^ギ利^タ斯^リ 末 一^ク匁

乾姜^末

八^ク匁

沙糖

一^ク匁

右研和ノ一服トシ日ニ三服宛服ス

芟桂驅水飲

實芟^チ答^ギ利^タ斯^リ 一^ク錢

桂^テ丁^シ幾^キ劑^圖

一^ク匁

右先ツ實芟^チ答^ギ利^タ斯^リニ沸湯半比ヲ加^テ浸ス一^ニ時滓
ヲ去^リ桂^テ丁^シ幾^キ劑^ヲ和^シ一^ニ匙宛用^テ一日^ニ兩次○近來海
葱ヲ加^テ用^ヒテ屢^ク奇効ヲ得^タリ卽^チ後方ノ如^シ

芟葱利水散

酒石英^末

三^ク錢

海葱^末

十二^ク匁

實芟^チ答^ギ利^タ斯^リ 末 六^ク匁

右調和ノ散劑トシ分テ六服トシ一服宛用^テ一日^ニ三

次飲液ニテ送下ス海葱ノ驅水劑中。此劑尤著實一
ノ危懼ナシ是ヲ服ノ惡心嘔吐ヲ發スル者ハ半劑
或四分一ヲ與フヘシ

實芟驅水煎

實芟答利斯 一弓 水 一比半

右煮減シ濾過ノ其液三分一トナルニ至リ燒酒再
者四錢ヲ攪和シ貯ヘ。用ルニ臨テ此劑一弓。薄荷水。
洋芹水鏡各二弓過爾托亞舍利別名二錢ヲ和勻シ
一時毎ニ一匙宛服ス

實芟利水飲

實芟答利斯 一錢 沸湯 八弓

右調和シ煖處ニ置テ浸ス一八分時。濾テ燒酒再
一弓ヲ攪和シ朝夕二匙宛服ス

實芟消杜飲

甘消石精名 二錢 杜松實油名 半錢
實芟答利斯名 一錢

右調和シ三十滴宛服スル一日四次○赤癩瘡羅
種種麻疹ニ似テ大ノ後發スル水腫及頭水。腦水ハ此
和蘭名ヨドホシク
藥ニ甘汞及清涼藥ヲ加用テ殊効アリ○頑固ノ黃
疸ハ左ノ方ヲ用テ惡心或嘔吐ヲ發シ或下利ノ諸

症解散シ治スル者多シ

芟翁解凝飲

實芟答利斯葉絞汁

一弓

白頭翁水

莖葉ヲ蒸餾ス製法
薄荷水ト同シ

六弓

舍利別

名 少許

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス○胸水。腹水ニ此葉末二錢ヲ取り水百六十錢ニ浸メ藥氣ヲ出シ一時毎ニ一匙ヲ服シ吐瀉スルニ至レハ小便快利ノ治ス腹水ハ腫脹減スルニ隨ヒ腹部ニ繃帶ヲ施シ水ノ停ルヲ防クヘシ

○此藥ノ麻痺ノ効カハ脉管質ノ抗張力ヲ減損ノ脉動ヲ遲緩シ熱及譫語ヲ減ス故ニ替留熱間歇熱ノ肌膚甚タ熱シ乾燥脉疾數譫語舌燥渴小便稀少或失血ニ傾ク症ヲ治ス然レ數脉減スル片ハ服量ヲ減シ脉六七十動トナル片ハ此藥ヲ休ムヘシ○
焮衝病ノ焮衝中ハ此藥必ス害アリ多ク防焮衝法刺絡清涼ヲ施メ諸症減スレレ血液ノ焮衝荏苒ト劑下劑等ノ遺留シ脉管質ヲ刺戟メ他症ヲ萌發スル危疑アル者ハ此藥劑中ニ水銀劑ヲ加用テ尤効アリ○或云壯熱焮衝病其他劇病ニハ的當セス且瞑眩スレ

ハ其害速ニ除カス數日復シ難シ○凡虚罷衰弱ノ諸病殊ニ神經感觸甚ク諸筋ノ觸動機劇キ諸症ヲ見シ或初血液運行過盛ニノ脉馱數ナル者漸ク減ノ虚衰シ緩和降鎮ノ諸劑ヲ與レ氏治セサル症ハ此藥ヲ與テ間偉効ヲ得ルアリ○此藥ハ心藏ノ觸動機ヲ減除ノ動脈ノ搏動ヲ遲緩ス故ニ心藏或大幹動脈ノ貌^バ僂^ク屈^ク撰百二章息肉塊腫等ヲ生ノ烈キ心動悸ヲ發スル症ハ是ヲ用テ動悸ヲ鎮定スル一良藥トス○神經感觸甚キヨリ發スル欬血吐血等諸失血ヲ治ス○虚症ノ失血脉管痙攣樣急^急ノ衝動ヲ

兼ル脱血殊ニ婦人崩漏及墮胎ヲ恐ル症ヲ治ス○肺藏結腫及吐血ヨリ發スル勞欬ヲ鎮靜ス○肺勞ノ患者天質感觸甚ク或吐血或先天毒ヲ兼子屢冒寒ニ罹^カリ胸痛スル症ヲ治ス然レ既ニ虚憊シ多ク敗膿ヲ咯キ消耗ノ漏汗下利ヲ發スル症ハ害アリ○經久欬嗽癩癩頑固ノ神經病精神錯誤或黑障眼內藏膿瘍頑癬侵蝕瘡等ニ効ヲ稱ス○總テ腺病ニ殊効アリ能水液及沔乙ヲ分利シ腺ノ塊腫^{瘰癧腫}瘰癧腫腸間膜腺腫^{鼠蹊腫等}ヲ消散ス○肺氣管咽喉等ノ腺腫^{腺病}毒^{瘰癧}等ノ喘急或小兒腹膨脹硬滿ノ惡液多キ症ニ

効多シ○瘰癧毒ノ諸症ニ是ヲ内服外敷ノ殊効アリ。一少年瘰癧腫ヲ發シ數處膿潰シ愈サルヲ既ニ十年。又其毒右脚ニ蔓延ノ腐爛劇痛シ衆醫是ヲ不治ニ屬ス終ニ此草ノ絞汁一匙ヲ大麥煎十弓ニ和メ温服シ其絞滓ヲ取テ毎日脚ノ患處ニ換貼ス是ニ因テ患者劇ク吐瀉シ又涎沫ヲ吐キ口中糜爛ス然レ一兩日ヲ經テ其疼止ミ膿減シ諸症輕差ス。十四日ヲ經テ又其絞汁ヲ内服ノ吐瀉ス。是ヨリ諸症漸ク退キ不日ニ全治セリ。其他頑固ノ瘰癧腫二人皆此藥ヲ用テ治ス或云。一少年遺毒ニ因テ險重ノ

瘰癧ヲ發シ此藥ノ煎劑ヲ長服ノ表被剝脱シ全治セリ○近來頑硬腫ニ此草ノ絞汁ヲ用テ殊効ヲ稱ス但乳癌ニハ効ナシ一婦人兩乳房ニ硬腫ヲ生シ乳癌トナルヲ恐テ是ヲ截リ除ントス然レ先試ニ此草ノ絞汁一匙ヲ與レハ大ニ吐ス是ヨリ十二時中數夥ク赭色ノ膠粘液ヲ吐シ隨テ乳房硬腫一ハ盡ク消散シ一ハ縮收ノ移動ス。是其病毒上腹ノ諸器ニ壅鬱ノ發セルヲ灼然タリ○一婦人乳房及頸ニ幾多ノ頑硬腫ヲ生シ又耳下腺腫起硬結スルヲ既ニ二年失鳩答菘若石灰水石鹼水銀劑等ヲ用レ

氏寸効ナシ終ニ實^チ艾^ギ答^タ利^リ斯^スノ花葉根ノ絞汁一匙
 ヲ水十六弓ニ攪和ノ稀シ早朝頻々ニ服ス。是ニ由
 テ夥ク粘液ヲ吐シ眩暈及痙攣ノ諸症ヲ發シ次テ
 劇ク下利シ翌日マテ止マス。糊ノ如ク灰色ニメ宛
 モ黃疸ニ瀉スル如キ汚物ヲ夥ク通利ス。因テ毎日
 其絞汁ノ服量四分一宛與ヘ。是ヨリ十二時中瀉下
 十次吐一次アリ。是ヲ連服スルヲ十八日ニメ大便
 平常ノ如ク。硬腫盡ク消散シ全治セリ。右兩件ノ經
 驗說ヲ熟察スルニ此藥癌性ノ硬腫ヲ消散スルヲ
 信據シ難シ。其初症ハ眞ノ頑硬腫^{性癌}タルヲ分明ナ

ラス。後症ハ瘰癧腺腫ニ近シ然ハ是レ癌腫ヲ治ス
 ルニ非ス。經久硬結ノ瘰癧腺腫ニ効アルナリ故ニ
 諸藥効ナキ經久頑固ノ腺腫ハ是ヲ試用ノ性功ヲ
 推廣スヘシ。殊ニ峻吐下ノ効アル故ニ解凝疏散ノ
 偉効アリ然^レ氏劫擊ノ毒性アル故ニ每^{ツ子}常戒慎ノ妄
 投セス患者資稟ノ強弱。年齢ノ壯衰ヲ料^カリテ服量
 ヲ増減シ瞑眩ニ因テ自然良能ノ機力ヲ損壞セサ
 ルヲ肝要トス。○或云此藥ハ多量ニ與テ吐瀉スレ
 ハ捷効アリト。然^レ氏是ニ由テ胃腸及神經ヲ虚損メ
 復シ難キ者アリ故ニ少許宛與テ漸^ク其量ヲ加ヘシ

服量葉ヲ取り散劑。泡劑。浸劑。煎劑。丁幾劑トシ用フ
 ○散劑。丸藥ハ患者ノ強弱ニ隨ヒ八分氏ヨリ三分
 一テ一服トス。或云初メ四分氏宛日。兩三次與ヘ漸
 加テ日。四氏與ヘ連用ノ功ヲ見スニ至ル但功驗ノ
 多少ニ隨テ増減シ。瞑眩スルキハ暫ク休メ其症退
 テ復用ヘシ。○煎劑。泡劑ハ一月ヨリ一錢マテ水六
 寸ヨリ十寸ヲ以テ製ス。○連服スルニハ香竈揮發
 ノ藥ヲ加テ瞑眩ヲ防クヘシ。○浸劑ハ二十氏ヨリ
 一錢或一錢半ヲ取り水四寸ニ浸メ藥氣ヲ出シ薄
 荷水或桂水一寸若ハ二寸ヲ加ヘ用フ是ニ由テ吐

瀉等ノ瞑眩ナシ或症ニ隨ヒ甘消石精。阿芙蓉。甘朮
 等ヲ擇ミ加ヘシ。○或此葉一錢ヲ沸湯十六寸ニ浸
 ス一ニ時許ニメ滓ヲ去リ一匙宛日。二三次服ス。○
 丁幾劑ハ十滴ヨリ二十滴ニ至ル但單方複方アリ

實艾答利斯丁幾劑

單方

實艾答利斯葉

細剉者 一多

燒酒

十五度者 四多

右硝子壘ニ内レ煖處ニ置テ浸ス一ニ日。搾リ濾テ
 滓ヲ去リ固封シ聽用ス。

複方

實艾答利斯葉

細剉者 二多

燒酒

十五度者

桂水

各三多

右硝子壘ニ内レ煖處ニ置テ浸ス_一四日。搾リ濾テ滓ヲ去リ固封シ聽用ス

外敷 腺腫。瘰癧腫。潰瘍。腐爛ノ浸淫瘡。頑癬等ハ此草生葉ヲ搗テ貼シ或煮テ_{帛布}トシ或乾葉ノ末ニ脂類ヲ和メ軟膏トシ或花葉共ニ家猪脂ニ加煮テ軟膏トシ患部ニ摩擦ノ峻効アル_一多ク先哲ノ試説ニ載ル如シ

華淑淑酒
依福僕潤

薩爾沙根 ガミラクス。サルサパリル。ロ蘭

○榕按ニ薩爾沙根。和産未タ詳ナラス先輩是ヲ

金剛刺或粘魚鬚ニ充レ_一氏確當セス薩爾沙根。羅甸スミラクス。サルサパリル。ラト名ク_一スミラクスハ此類ノ統名ナリ。サルサパリル。ラハ其一種ナリ。此類十三種アリ其中充當スル者四種アリ即チスミラクス。シーナ_一ハ土茯苓。スミラクス。プセウド_一シーナ_一ハ牛尾菜。スミラクス。シホデ_一ハ細葉牛尾菜。スミラクス。ヒルロサ_一ハ和名_一ヒメカガラ_一山兒ノナリ往歲門人_{芬木}牛尾菜根ヲ採リ薩爾沙根ニ_{尚雲}髮髯タルヲ以テ予ニ當否ヲ質ス。予應テ曰。牛尾菜ト薩爾沙ト固ヨリ同屬異種ナレ_一氏今此

根ノ形質氣味ヲ熟察スレハ薩爾沙根ト殆ト差
 異ナシ是ヲ以テ薩爾沙根ニ代用スル片ハ効驗
 必ス相伯仲ノ薩爾沙ノ下ニ在サルヘシト云

〔形狀〕蔓生ノ灌木。數莖叢生シ綠色硬靱。小柔刺アリ。
 葉互生。橢圓ニノ未微尖リ長三四寸或六七寸。黯綠。
 三縱道アリ葉梗ノ本ニ兩卷鬚アリテ傍木ニ絡ヒ。
 小莖ニ小白花攢簇シ瓣ナシ。萼六瓣アリ。此木雌雄。
 株ヲ異ニス。雄木ハ雄花ノミ生シ雌木ハ雌花ノミ
 生ス雄花ハ雄蕊アリテ雌蕊雄花ハ六雄蕊雌花ハ
 三雌蕊アリ第二十二目雌木ハ軟實ヲ結フ。大櫻子ノ
綱第六目

如ソ繖ヲ爲ス初綠後紅終ニ黑色トナル。裏ニ核アリ
或云裏三室アリ根頭。拇指大ニノ塊節勁硬是
 ヲリ柔靱ノ細根叢生錯綜ノ土中ニ蔓延シ長一二
 尺許。太キ者ハ鶯管ノ如ク細鬚縱橫交錯シ外面皺
 糙褐色。裏白色。其質粉樣ニノ指間ニ摩スレハ碎テ
 落葉松耳ノ如シ較著ノ香臭ナク味淡微甘。嚼テ粘
 滑ナリ上品ハ太鶯管ノ如ク纖鬚少ク淨潔ニノ黑
 色ヲ帶ヒス裏實ノ白色。破碎シ易ク輕虚空疏ナラ
 ス李露伯西兒墨是可非爾入尼亞共ニ亞墨利等ニ
 産ス

試効 頭根ノ塊節ヲ去リ長條細根ヲ取用フ ○發汗
 清血ノ一良藥トス能ク粘液ヲ稀釋分利ス水煎若
 ハ浸劑トシ用テ黴毒經久痼滯ノ諸症ヲ治ス黴毒
 未タ久キヲ經サル症ハ水銀劑ヲ用テ治スレ氏經久
 頑固ノ症ハ峻効アル發汗排毒ノ煎劑ヲ長服スル
 ニ非レハ治シ難シ動スレハ効力劣弱ナル緩性ノ
 煎劑ヲ久服ノ無益ノ治療ヲ施スヲアリ ○黴毒水
 銀劑ヲ投ノ治セス或是ヲ誤用スル症ハ此根ヲ用
 テ効アリ大抵山牛蒡根 朴窟福烏篤 薩撒弗刺斯 瑞
 香 蜀羊泉 等ヲ加ヘ一二ヲ取テ水一升ニ投シ煎

服ス ○水銀劑ヲ用ヒ難キ症 喻ハ水銀劑ヲ久服ノ
 虛憊甚キ者或夜分頭痛若ハ骨痛劇キ症ハ此藥ヲ
 用テ殊効アリ ○此藥ハ水銀劑ノ胃腸ニ侵襲スル
 害ヲ防キ能ク水銀ノ効力ヲ皮表ニ布達ス ○尋常
 ノ黴毒諸症ハ此藥ニ水銀劑ヲ兼用ノ治ス殊ニ近
 來醫家升汞ヲ兼用ノ多ク治驗ヲ稱ス ○土茯苓 薩
 撒弗刺斯ノ如キモ薩爾沙根ニ比スレハ峻効ナシ此
 根及朴窟福烏篤ハ能ク黴毒ヲ根治ス或云此兩品
 中一品アレハ殆ト治功ヲ濟スニ足ル故ニ二品合
 劑トシ用フ喻ハ後方ノ如シ

薩朴排毒煎

薩爾沙根

二两

朴窟福烏篤

一两

薩撒弗刺斯

二錢

右剉ミ水四十两ヲ加テ慢火上ニ置キ藥氣ヲ出ス
一十二時ニメ二十两ヲ取り服用ス。○徽毒經久ニ
メ頑固潜結スル症ハ左ノ飲劑尤驗アリ

護薩薩朴煎

薩爾沙根

朴窟福烏篤

各二两

沸湯 四比

右二味沸湯ニ浸ス一十二時ニメ後藥ヲ加ヘ煮テ

半ヲ減シ服用ス

亞刺比亞護謨

四錢

薩撒弗刺斯

二錢

又右煎劑ノ滓ニ水適宜ヲ加ヘ煮テ日常ノ飲料
ス。每日午前ハ右ノ煎劑百六十錢ヲ服シ午後ハ再
煎ヲ飲料トシ適意ニ服ス。壯實多血ノ患者ハ刺絡
下劑及浴湯ヲ施スヘシ。但、体稟薄弱瘦削若ハ纖維
弛緩スル者ハ刺絡下劑等適應セス。飲食ハ緩和ス
ル者。消化シ易キ者。粉麩類ヲ與ヘ。保護溫暖ニメ能
ク蒸氣ヲ發スヘシ。朴窟福烏篤ノ辛味ヲ嫌フ者ハ
亞刺比亞護謨或魚膠四錢ヲ加テ緩和シ或沙糖ヲ

適意ニ加テ發汗舍利別トシ與ヘ。殊ニ著實ノ効ヲ
 取ント欲セハ升汞溶劑等ノ水銀劑ヲ兼用スヘシ。
 微毒輕重アレト右ノ煎劑大抵三月許モ連服セサ
 レハ特効ナシ。尚且居恒溫煖ニ保護ノ蒸氣ヲ驅散
 スルヲ肝要トス若冷氣ニ觸テ蒸氣ヲ抑遏スレハ
 多服スレト驗ナシ。○遷延頑固ノ痛風傷冷毒痛ニ
 是ヲ煎服ノ汗ヲ發シ血中ノ毒液ヲ排泄シ治ス。殊
 ニ水銀劑ヲ多服ノ功ナキ症ニ良。○水銀劑ヲ長服
 ノ發スル疼痛或硬結腫癩癰腺腫ノ諸症。子宮ノ硬
 腫。腐蝕ノ潰瘍。頑癬類。惡厲ノ膿瘍等經久ノ皮病ニ

効アリ左ノ煎劑モ亦排毒清血ノ殊効アリテ治驗
 多シ

薩朴瑞香煎

薩爾沙根 剉搗者 六弓

朴窟福烏篤 匏屑

甘草 各一弓 水 十斤

右水ニ浸ス一三時煮テ半ヲ減シ後藥ヲ加フ

薩撒弗刺斯 一弓 瑞香皮 鏡 三錢

右二味ヲ加テ火ヲ下シ蓋閉メ冷定シ濾過メ滓ヲ
 去リ四五弓宛服スル一日三四次

服量散劑ハ一月ヨリ一錢マテ日三四次服ス○煎

五勿考補遺 卷一

劑ハ一弓ヨリ一弓半マテ水十弓或十二弓ニ加ヘ煎服ス

薩爾沙根越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑名ト同

依叔華窓
布僕泊利

華尼利「エピデンドロムハニルラニル」ハニリイヌ

形狀一種ノ蔓草ニノ常春藤ノ如シ。蔓莖徑三四分許硬靱破折シ難ク綠色粘汁アリ每節數枝分テ蔓延シ節ニ卷鬚生ノ傍木ニ絡ヒ木皮ニ著テ津液ヲ吸收シ滋蔓ス葉橢圓末尖リ老利兒葉枸櫞葉多羅葉ノ如キヲ

云ノ如ク厚ク柔靱滑澤美綠色ニ葉節ヲ抱テ生ス花五瓣枝梢ニ生ス外面帶綠裏面清白中心白色ノ一瓣尾ノ如ク勾カクリ垂ル是蜜槽ナリ蜜槽園蜜ノ條ニ註ス搭按ニ花中ノ一瓣垂テ蜜槽ヲ爲ス者多シ蠟眉草風蘭石斛等ノ花ノ如シ萼ナク苞アリニ雄蕊ノ下端一雌蕊ニ著テ生ス第二十綱第一目花謝ノ莢ヲ結フ是ヲ藥用トス。太小指ノ如シ差勾屈ノ本末狭ク扁ニノ長四五寸許潤半拇指橫徑或云一分五釐許柔脆肉樣微粘著シ縱理アリ熟スレハ赭赤或黧赭光澤アリ裏沙粒ノ如キ幾多ノ細子充テ黑色光澤佳香亭露拔爾撒謨ノ如シ味香竄樣ニノ微酸ヲ帶ヒ

脂氣アリ。秋冬莢ヲ取り乾ス。半月若ハ二十日許。時々掌間ニ摩メ徐々ニ壓扁^{オシヒラ}ノ半乾ク。椰子油ヲ擦リ再乾シ貯フ。否サレハ濕氣ヲ含テ腐敗シ易シ。此莢五十個ヲ以テ一裹トシ販ク。熟スル頃採摘セサレハ自ラ拆裂シ。黑色佳香ノ拔爾撒謨^{バールサマ}様液流滴ス。是ヲ鉢ニ承テ取貯^{ツケ}レハ漸ク凝結ス。是ヲ拔爾撒謨^{バールサマ}トシ用フ。○上品ハ新鮮ニメ佳香竄透シ。太ク長クノ重ク肥實ノ皺紋少ナク。黑色ナラス。油氣粘著セス。微柔^{ヤカ}ニメ甚タ乾枯セス。莢ヲ破レハ拔爾撒謨^{バールサマ}ノ如キ液アリ。是ニ細仁充ツ。○此莢乾淨ノ處ニ貯


ヘシ濕氣ニ觸レハ黴生ノ損敗シ佳香脱ス。但外面鹹味ノ粉生スルヲアリ。是黴ニ非ス。莢ニ含メル揮發塩鬱蒸ノ溢泄スルナリ。夏月殊ニ多シ。○牙埋加^{ヤマイカ}加^カ麗^{レイ}涅^ネ等。南亞墨利加洲^{ナンアメリカ}ノ諸國及印度地方ノ樹陰水邊濕地ニ生ス。

○榕按ニ「エピデンドロム」ハ此草類ノ統名ニノ種屬三十餘種アリ。華尼利^{ハニリ}ハ其第一種ナリ。和産未タ詳ナラス。此種屬中。和産アル者ハ石斛。麥斛。蘭花。釵子股。白及等ナリ。然氏皆華尼利ニ代用シ難シ。但是ヲ以テ其花形等ヲ類推メ知ルヘシ。

試効 莢ヲ藥用トス。香竄揮發。拔爾撒謨性ノ油ヲ含
 之壯神溫補ノ一良藥トス。揮發衝動ノ壯神劑。的當
 ノ諸病ニ用テ精カヲ補充シ殊効ヲ稱ス。神經熱及
 虛冷ノ腦病。神經病。依剝昆垤兒（圖第六章第十九章）等ヲ治ス。○
 神經熱ハ神經感動ノ敏銳ト遲鈍ヲ論セス用テ峻
 効アリ一時毎ニ四氏ヨリ八氏マテ與フ。峻効ノ揮
 發衝動劑ヲ與テ捷功ナキ症ニ間奇驗ヲ得タリ。○
 胃ヲ健運シ飲食ヲ消化シ風氣ヲ驅散シ不化ノ惡
 液ヲ化熟シ總テ胃虛ノ諸症ニ効ヲ奏ス。○虛症ノ
 經閉ヲ通シ。催生分娩シ。胞衣ヲ下ス。叔格刺亞度（香竄）

ノ飲料ノ名（圖第五章）ニ加テ香竄料トス。○焮衝熱ニ過
 用スレハ焮熱増劇ス。○服量散劑ハ一錢マテ一服
 トス。或水。葡萄酒。其他適宜ノ飲液ニ浸シ二錢マテ
 用フ。
華叔 淑依 溼

遠西醫方名物考補遺卷一 終



Small rectangular stamp or mark at the bottom left of the left page.

